

بہ نام پروردگار مہربانی



هندرسون کنکور

دهم | یازدهم | دوازدهم

حامد شفیعی



تقدیم به همسرم عزیزم



مقدمه

کنکوری‌های عزیز سلام؛
خیلی از بچه‌ها بی خیال هندسه تو کنکور می‌شن، ولی تو سعی
کن که روی این درس اختصاصی وقت کافی رو بذاری، چون
باعث می‌شه که از رقیبات خیلی جلو بیفتد  بعداً نگی
که نگفتی 

درسته که این کتاب لقمهٔ ما که قربونش بشم خیلی کوچیک و
ریزه میزه است، اما وقتی که بازش من کنم، من بینی که نه!! انگار
یه خبرایی هست. از ویژگی‌های کتاب بگم براتون، که یه کتاب
خلاصه و جمع و جوره اما کامل و مرتبه که خیلی تند و سریع
من تونی کل هندسه رو باهاش مرور کنم و با خیال راحت همه
جا بیریش 

تشکر و سپاس

بر خود لازم من دانم که از همه کسانی که در به ثمر رساندن این کتاب
ضمیمانه تلاش کرده‌اند، قدردانی کنم:

- جناب آقای احمد اختیاری مدیر محترم و توانمند انتشارات
- جناب آقای عباس اشرفی مدیر محترم گروه ریاضی
- سرکار خانم دنیا سلیمانی مسئول ویراستاری گروه ریاضی
- سرکار خانم مهرنوش رضوی و آزاده فلاحزاده ویراستاران علمی
- سرکار خانم سمیرا سیاوشی مدیر تولید
- جناب آقای محسن فرهادی مدیر هنری
و همه عزیزانی که در تهیه این کتاب مارا همراهی کردند.

ارادتمند شما
حامد شفیعی

فهرست

- | | | |
|-----|---------------------------------|--------|
| ۷ | ترسیم‌های هندسی | فصل ۱ |
| ۱۹ | قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن | فصل ۲ |
| ۳۵ | چندضلعی‌ها | فصل ۳ |
| ۵۵ | تجسم فضایی | فصل ۴ |
| ۷۱ | دایره | فصل ۵ |
| ۱۰۹ | تبديل‌های هندسی و کاربردها | فصل ۶ |
| ۱۲۵ | روابط طولی در مثلث | فصل ۷ |
| ۱۳۹ | ماتریس‌ها و کاربردها | فصل ۸ |
| ۱۶۳ | آشنایی با مقاطع مخروطی | فصل ۹ |
| ۱۹۵ | بردارها | فصل ۱۰ |
| ۲۱۷ | پیوست: فرمول‌نامه | |

نسبت و تناوب در هندسه



تعريف: به تساوی $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ (د، ب ≠ ۰) یک تناوب می‌گویند.

چالش: (ویژگی‌های تناوب)

۱ طرفین وسطین کردن:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc \quad (b, d \neq ۰)$$

۲ معکوس کردن طرفین تناوب:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{b}{a} = \frac{d}{c} \quad (a, b, c, d \neq ۰)$$

۳ تعویض‌های طرفین یا وسطین:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{یا} \quad \frac{d}{b} = \frac{c}{a} \quad \text{یا} \quad \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \quad (a, b, c, d \neq ۰)$$

۴ ترکیب نسبت در صورت یا مخرج: (د، ب ≠ ۰)

الف $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$

ب $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a}{a+b} = \frac{c}{c+d}$

۵ تفضیل نسبت در صورت یا مخرج: (د، ب ≠ ۰)

الف $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$

ب $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a}{a-b} = \frac{c}{c-d}$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a+c}{b+d} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad (b, d \neq 0)$$


(تعمیم ۶) 

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} \quad (b_1, b_2, \dots, b_n \neq 0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} = \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$$

تعريف: اگر طرفین یا وسطین یک تناسب شامل دو عدد برابر باشند، یعنی $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ ، داریم $b^2 = ac$ ، در این صورت b را واسطه هندسی a و c می‌نامیم.

نکته: در هر مثلث نسبت اندازه‌های هر دو ضلع، با عکس نسبت اندازه‌های ارتفاعاتی وارد بر آن دو ضلع برابر است:




$$\frac{a}{b} = \frac{h_b}{h_a}, \frac{a}{c} = \frac{h_c}{h_a}, \frac{b}{c} = \frac{h_c}{h_b}$$

در هر مثلث قائم‌الزاویه به وتر a داریم:


$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow \frac{1}{h_a^2} = \frac{1}{h_b^2} + \frac{1}{h_c^2}$$

◀ فرض کنید اندازه ارتفاع‌های دو مثلث برابر باشند، در این صورت:



$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{BC}{CD}$$

◀ اگر دو مثلث، قاعده مشترک داشته باشند و رأس‌های رو به روی این قاعده روی یک خط و موازی این قاعده باشند، این مثلثها هم مساحت‌اند:




$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle DBC}$$

تست: در شکل زیر خط‌های d و d' موازی هستند، اگر

$DB = 3AB$ و $BC = \frac{4}{3} \text{ cm}$ و $\hat{B}CA = \hat{B}AC$

صورت ارتفاع وارد بر ضلع DB در مثلث DBA کدام است؟



$$\frac{2\sqrt{3}}{9} (4)$$


$$\frac{3\sqrt{3}}{9} (3)$$

$$\frac{9\sqrt{3}}{3} (2)$$

$$\frac{7\sqrt{3}}{3} (1)$$

پاسخ گزینه «۴»

چون $d' \parallel d$ و $BC = C_1 = 6^\circ$. از طرفی طبق فرض $\hat{A}_1 = \hat{C}_2 = 60^\circ$ پس مثلث ABC متساوی‌الاضلاع است:



از طرفی می‌دانیم که اندازه ارتفاع در مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a

برابر با $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ است، پس:

$$CH = \frac{\sqrt{3}}{2} \times BC = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

طبق نکته گفته شده داریم:

$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ABD}} = \frac{CH \times AB}{AH' \times DB} \Rightarrow \frac{CH \times AB}{AH' \times DB} = 1$$

$$\frac{DB = 3AB}{3} \Rightarrow \frac{2\sqrt{3}}{3} \times AB = AH' \times (3AB)$$

$$\Rightarrow AH' = \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

چند ضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آن




تعريف: n ضلعی یک شکل بسته‌ای است شامل n ($n \geq 3$)


پاره خط متواالی که در آن:

الف هر پاره خط دقیقاً دو نقطه را در نقاط انتهایی خودش (رأس‌ها) قطع کند.


ب هر دو پاره خط که در یک انتهای مشترک‌اند، روی یک خط نباشد.




چند ضلعی است.



چند ضلعی نیست.




چند ضلعی نیست.




چند ضلعی نیست.

چاشنی: (n ضلعی‌های محدب و مقعر)

n ضلعی را محدب گوییم، هرگاه با در نظر گرفتن خط شامل هر ضلع آن، بقیه نقاط چند ضلعی در یک طرف آن خط واقع شوند. چند ضلعی که محدب نباشد، مقعر می‌نامند.



چند ضلعی محدب



چند ضلعی مقعر

نکته: در چندضلعی محدب تمام زاویه‌های داخلی کمتر از 180° می‌باشند، اما در چندضلعی مقعر حداقل یک زاویه داخلی بزرگ‌تر از 180° وجود دارد.

در چندضلعی محدب هر پاره خطی که دو نقطه دلخواه درون چندضلعی را به هم وصل کند تمام آن درون چندضلعی قرار دارد، اما در چندضلعی مقعر چنین نیست.

تعریف: در هر چندضلعی، پاره خطی که دو رأس غیرمجاور را به هم وصل می‌کند، قطر می‌نامند.



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{تعداد قطرها} = \frac{n(n-3)}{2} \\ \text{مجموع زوایای داخلی} = (n-2) \times 180^\circ \\ \text{مجموع زوایای خارجی} = 360^\circ \end{array} \right.$$


چاشنی: در هر n ضلعی داریم:

نکته: هر n ضلعی محدب حداقل ۳ زاویه داخلی حاده دارد.

متوازی الاضلاع



تعريف: متوازی الاضلاع، چهارضلعی است که هر دو ضلع مقابل آن موازی هستند.



$ABCD \Leftrightarrow AB \parallel CD, AD \parallel BC$

چالش: (ویژگی‌های متوازی الاضلاع)

۱ یک چهارضلعی متوازی الاضلاع است اگر و تنها اگر هر دو ضلع مقابل هماندازه باشند:

$ABCD \Leftrightarrow (AB = DC, AD = BC)$ متوازی الاضلاع است


۲ یک چهارضلعی متوازی الاضلاع است اگر و تنها اگر هر دو زاویه مقابل آن هماندازه باشند.

$ABCD \Leftrightarrow (\hat{A} = \hat{C}, \hat{B} = \hat{D})$ متوازی الاضلاع است.

۳ یک چهارضلعی متوازی الاضلاع است اگر و تنها اگر هر دو زاویه مجاور، مکمل باشند.

$ABCD \Leftrightarrow \hat{A} + \hat{B} = \hat{B} + \hat{C} = \hat{C} + \hat{D}$

$$= \hat{D} + \hat{A} = 180^\circ$$



۴ یک چهارضلعی متوازی الاضلاع است اگر و تنها اگر قطرهای آن منصف یکدیگر باشند:

$$(OA = OC, OB = OD)$$


هندسه کنکور

وعدد ۳


تفکر تجسمی

در تفکر تجسمی از جملات و شیوه‌های زبانی برای تفکر استفاده نمی‌شود، بلکه این تصاویر هستند که در ذهن نقش می‌بندند و کمک می‌کنند درباره موضوع مورد نظر فکر کنیم.


☞ **تعریف:** به تصاویری که از سه نمای رو به رو، چپ و بالای یک جسم رسم می‌شود، تصاویر سه نمای آن جسم می‌گویند، به شکل زیر توجه کنید:




نشان دهنده نمای رو به رو



نمای رو به رو



نمای بالا




نمای رو به رو

وعدد ۴


برش

☞ **تعریف:** شکلی که از برخورد یک صفحه با یک جسم هندسی حاصل می‌شود، سطح مقطع آن نامیده می‌شود.


۱ برش کره: سطح مقطع حاصل از برخورد یک صفحه با یک کره، یک دایره است:




۲ برش استوانه: سطح مقطع حاصل از برخورد یک صفحه با یک استوانه، سه حالت زیر را دارد:



بیضی (برش مایل)




دایره (برش افقی)



مستطیل (برش عمودی)

تست: دو استوانه توپر به ارتفاعهای ۶ و ۸ روی هم قرار گرفته‌اند. اگر شعاع قاعده‌ها به ترتیب ۲ و ۳ باشد سطح حاصل از برش عمودی و گذر از مرکز دایره سطح مقطع چقدر است؟




- (۱) ۶۸
- (۲) ۷۴
- (۳) ۷۲
- (۴) ۶۶




پاسخ گزینه «۳»

سطح مقطع حاصل، دو مستطیل می‌باشد که روی هم قرار گرفته‌اند:


$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = 6 \times 8 + 6 \times 4 \\ &= 48 + 24 = 72 \end{aligned}$$




برش مکعب: سطح مقطع یک مکعب می‌تواند مربع، مستطیل، مثلث، ذوزنقه، پنج‌ضلعی یا شش‌ضلعی باشد.





ذوزنقه (برش مایل)




پنج ضلعی (برش مایل)



شش ضلعی (برش مایل)

مربع یا مستطیل
(برش مایل)

مثلث (برش مایل)

مربع یا مستطیل
(برش افقی)


تست: در یک مکعب به طول یال ۴ واحد، بر انتهای سه یال گذرا بر یک رأس، صفحه‌ای می‌گذرد. مساحت مقطع این صفحه با مکعب کدام است؟

(تجربی ۹۵)

 $8\sqrt{3}$ $12\sqrt{3}$ $4\sqrt{6}$

(۱)

پاسخ گزینه «۴»




سطح مقطع حاصل یک مثلث متساوی الاضلاع
به طول ضلع d است.

$$d^2 = 4^2 + 4^2 = 32$$


$$\Rightarrow d = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow S_{\triangle_{ABC}} = \frac{\sqrt{3}}{4} d^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} (4\sqrt{2})^2 = \frac{32\sqrt{3}}{4} = 8\sqrt{3}$$


برش منشور (مثلث القاعده): سطح مقطع یک منشور مثلث القاعده
می تواند مثلث، مستطيل یا ذوزنقه باشد:



مستطيل (برش عمودي)




مثلث (برش افقي)




مثلث (برش مايل)

برش مخروط: سطح مقطع یک مخروط می تواند دایره، بیضی یا
سهمی باشد:



مفاهیم اولیه در دایره




تعريف: دایره مجموعه نقاطی از صفحه است که از یک نقطه ثابت به نام مرکز (O) به فاصله ثابت r (شعاع) می‌باشد و آن را نماد $C(O, r)$ نمایش می‌دهیم.

► **وتر دایره:** پاره خطی که دو سر آن روی دایره باشد.

► **قطر دایره:** وتری از دایره که از مرکز دایره می‌گذرد.

► **کمان:** کمان دایره شامل دو نقطه روی دایره و تمام نقاط بین آن دو نقطه است. هر کمان دایره را به دو قسمت تقسیم می‌کند.

چاشنی: (وضعیت نقطه و دایره)



هر نقطه نسبت به دایره سه وضعیت زیر را دارد:

$$OA < r$$

۱ درون دایره:

$$OB = r$$

۲ روی دایره:

$$OC > r$$

۳ بیرون دایره:

(اوپرای نسبی خط و دایره)

۱ **مماض:** خط و دایره در یک نقطه

مشترک هستند ($OH = r$)


۲ **متقاطع:** خط و دایره در دو نقطه

مشترک هستند ($OH' < r < OH''$)


۳ **متخارج:** خط و دایره هیچ نقطه

مشترکی ندارند ($OH'' > r > OH'$)

- ◀ نکته: شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس عمود است.
- ◀ خط متقاطع با دایره را قاطع می‌نامیم که وتری از دایره جدا می‌کند.
- ◀ در شکل زیر اگر $MA = r$ باشد آن‌گاه $\beta = 3\alpha$ است.



تست: در شکل زیر AB قطر دایره، $C\hat{O}B = 15^\circ$ و $DC = r$ است. اندازه OH چه مضربی از شعاع دایره است؟



- $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۴) $\frac{2}{3}$ (۳) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۱)

پاسخ گزینه (۱)

چون $DC = OC = r$ ، پس مثلث OCD متساوی الساقین است.

همچنین چون که $O\hat{C}H$ برای این مثلث زاویه خارجی است، داریم، $O\hat{C}H = 30^\circ$ حال OH را محاسبه می‌کنیم:

$$\sin 30^\circ = \frac{OH}{OC} \Rightarrow OH = \frac{1}{2}OC = \frac{1}{2}r$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$


پیوست

فرمول نامه





ترسیم‌های هندسی و استدلال

- ۱ دایره مجموعه نقاطی از صفحه است که از یک نقطه ثابت (مرکز دایره) به فاصله ثابت (شعاع دایره) باشند.
- ۲ هر نقطه، روی نیمساز یک زاویه، از دو ضلع آن به یک فاصله است و برعکس.
- ۳ هر نقطه، روی عمود منصف یک پاره خط، از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است و برعکس.
- ۴ یک مثلث در صورتی قابل رسم است که:



$|b - c| < a < b + c$ یا در حالت کلی:

- ۵ ارتفاع، نیمساز زاویه‌ها و عمودمنصف اضلاع یک مثلث همرس‌اند.





سوالات کنکور سراسری ۹۸

۱. در یک ذوزنقه، خطی که وسط ساق‌هارا بهم وصل کند مساحت آن را به نسبت ۳ به ۵ تقسیم می‌کند، نسبت قاعده‌های ذوزنقه کدام است؟

$$\frac{3}{5} \quad (4)$$

$$\frac{2}{5} \quad (3)$$

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} \quad (1)$$

۲. در مثلث ABC نقطه M وسط BC است. نیمسازهای دو زاویه AMC و AMB دو ضلع مثلث را در P و Q قطع می‌کنند. نقطه O محل تلاقی AM و PQ است. OM برابر کدام است؟

$$OP \quad (4)$$

$$OA \quad (3)$$

$$AQ \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} BC \quad (1)$$

۳. در چهارضلعی $ABCD$ ، وسط دو ضلع غیرمجاور و وسط دو قطر آن، رأس‌های یک لوزی است. الزاماً کدام نتیجه‌گیری در مورد چهارضلعی مفروض، درست است؟

(۱) دو ضلع غیرمجاور دیگر، برابرند.

(۲) دو قطر عمود بر هم‌اند.

(۳) دو ضلع شامل رأس‌های لوزی، برابرند.

(۴) دو ضلع غیرمجاور، موازی‌اند.

۴. نقطه A و خط d و صفحه P مفروض‌اند. در رسم صفحه‌ای گذرا از نقطه A ، موازی خط d و عمود بر صفحه P ، در کدام حالت، تعداد جواب‌ها، بی‌شمار است؟

$$d \cap p \neq \emptyset \quad (2)$$

$$d \perp p \quad (4)$$

$$d \cap p = d \quad (1)$$


$$d \parallel p \quad (3)$$



پاسخ‌نامه


۱. گزینه «۲»

دو ذوزنقه هم ارتفاع هستند.



$$\left\{ \begin{array}{l} \triangle ADH \sim \triangle MH'D \Rightarrow MH' \parallel DH \Rightarrow \frac{AM}{MD} = \frac{h_1}{h_2} \Rightarrow h_1 = h_2 \\ \\ MN = \frac{a+b}{2}, \quad \frac{S_1}{S_2} = \frac{a+\frac{a+b}{2}}{b+\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{1}{3} \end{array} \right.$$

۲. گزینه «۴»



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{نیمساز MP} \Rightarrow \frac{AP}{PB} = \frac{AM}{BC} \\ \\ \text{نیمساز MQ} \Rightarrow \frac{AQ}{QC} = \frac{AM}{BC} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC} \Rightarrow PQ \parallel BC$$

$$PQ \parallel BC \Rightarrow \angle P = \alpha \Rightarrow OP = OM$$