

فهرست

شماره صفحه

۷

بخش ۱: آزمون‌های فصلی

شیمی دهم

فصل ۱: آزمون ۱ تا ۴

۸

فصل ۲: آزمون ۵ تا ۸

۱۴

فصل ۳: آزمون ۹ تا ۱۲

۲۲



۳۰

فصل ۱: آزمون ۱۳ تا ۱۶

۳۷

فصل ۲: آزمون ۱۷ تا ۲۰

۴۵

فصل ۳: آزمون ۲۱ تا ۲۴

شیمی یازدهم

فصل ۱: آزمون ۱۳ تا ۱۶

۵۲

فصل ۲: آزمون ۲۵ تا ۲۸

۵۹

فصل ۳: آزمون ۲۹ تا ۳۲

۶۷

فصل ۴: آزمون ۳۳ تا ۳۶

۷۴

فصل ۵: آزمون ۳۷ تا ۴۰

شیمی دوازدهم

۸۱

بخش ۲: آزمون‌های مبحثی



۸۲

آزمون ۴۱: آرایش الکترونی و جدول دوره‌ای

۸۴

آزمون ۴۲: نامگذاری، فرمول‌نویسی، ساختار لیوویس و شکل هندسی

۸۵

آزمون ۴۳: استوکیومتری واکنش‌ها

۸۸

آزمون ۴۴: شیمی آلی

۹۰

آزمون ۴۵: ترموشیمی

۹۲

آزمون ۴۶: اسیدها و بازها، ثابت یونش و pH

۹۴

آزمون ۴۷: سینتیک

۹۶

آزمون ۴۸: تعادل

۹۸

آزمون ۴۹: الکتروشیمی

۱۰۱

آزمون ۵۰: جامدات بلوری

۱۰۳

بخش ۳: آزمون‌های جامع



۱۰۴

آزمون ۵۱: آزمون جامع شیمی دهم

۱۰۶

آزمون ۵۲: آزمون جامع شیمی یازدهم

۱۰۹

آزمون ۵۳: آزمون جامع شیمی دوازدهم


۱۱۱

آزمون ۵۴ تا ۶۳: آزمون‌های جامع مشابه کنکور سراسری

۱۵۳

بخش ۴: پاسخ‌نامه تشریحی





آزمون‌های فصلی

کتاب‌های درسی شیمی شامل ۱۰ فصل است (شیمی ۱ شامل سه فصل، شیمی ۲ شامل سه فصل و شیمی ۳ شامل چهار فصل)

در این بخش از کتاب، از هر یک از فصول دهگانه شیمی، چهار آزمون ۱۵ تستی قراردادهایم تا با حل این آزمون‌ها، آماده دست و پنجه نرم کردن با آزمون‌های مبحثی و جامع بشوید. این آزمون‌ها شامل آزمون‌هایی از متن کتاب، آزمون‌های صرفاً مسئله و دو آزمون جامع از هر فصل می‌باشد. سطح این آزمون‌ها کمی بالاتر از حد نرمال است تا با حل آن‌ها، تعداد بیشتری از اشکالات‌تون برطرف شده و با آمادگی بیشتری به سراغ آزمون‌های کلی‌تر بعدی بروید.


۱

آزمون متنی فصل اول شیمی دهم

(۵) زمان پیشنهادی: ۵۰ تا ۶۰ دقیقه

-%

- ۱.** چه تعداد از عبارت‌های زیر، درست است؟
- (آ) سه عنصر از هشت عنصر فراوان‌تر سیاره زمین، جزو فلزهای واسطه هستند.
 (ب) پس از وقوع مهبانگ در سرآغاز کیهان، اتم‌های هیدروژن و هلیم اولین ذرات مادی بودند که پدید آمدند.
 (پ) نور خیره‌کننده خورشید به دلیل تبدیل هلیم به هیدروژن در واکنش‌های هسته‌ای است.
 (ت) سحابی‌ها مجموعه‌های گازی هستند که در نتیجه متراکم شدن گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده پس از وقوع مهبانگ به وجود آمدند.
- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)
- ۲.** چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟
- (آ) هر هسته‌ای که نسبت شمار توترون به پروتون در آن، کمتر از $1/5$ باشد، پایدار است.
 (ب) در حدود ۲۲٪ عنصرهای شناخته شده، ساختگی بوده و در طبیعت یافت نمی‌شوند.
 (پ) تکنسیم نخستین عنصری بود که در راکتور هسته‌ای ساخته شد.
 (ت) طی انجام فرایند هنری‌سازی ایزوتوبی، مقدار ایزوتوب $^{235}_{\text{U}}$ را در مخلوط ایزوتوب‌های اورانیم افزایش می‌دهند.
- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)
- ۳.** چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟
- (آ) عنصر هیدروژن دو ایزوتوب پایدار و سه ایزوتوب طبیعی دارد.
 (ب) تمام پروتون و توترون به ترتیب به صورت p^+ و n^- است.
 (پ) ایزوتوب‌ها اتم‌هایی هستند که در جدول تناوبی، هم‌مکان هستند، ولی جرم اتمی یکسانی ندارند.
 (ت) فلز اورانیم شناخته شده‌ترین فلز پرتوزا است و همه ایزوتوب‌های آن، به عنوان سوخت در راکتورهای هسته‌ای به کار می‌روند.
 (ث) یون حاوی Tc^{99} اندازه مشابهی با یون یدید داشته و همراه با آن، جذب قدرتیروند شده و امکان تصویربرداری از تیروئید را فراهم می‌کند.
- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)
- ۴.** چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟
- (آ) بار الکترونیکی توترون و الکترون، به ترتیب برابر صفر و (-۱) است.
 (ب) فراواتی ایزوتوب دارای شمار توترون بیشتر در هر یک از عنصرها، کمتر از ایزوتوب‌های سبک‌تر آن است.
 (پ) جرم تسبیب سبک‌ترین ذره زیراتومی برابر صفر در نظر گرفته می‌شود.
 (ت) جرم 1 amu معادل $1.67 \times 10^{-24}\text{ g}$ است.
 (ث) عدد جرمی هر اتم، جرم $1.67 \times 10^{-24}\text{ g}$ را در مقیاس گرم نشان می‌دهد.
- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)
- ۵.** چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟
- (آ) $^{11}_{\text{H}}$ شامل $^{11}_{\text{H}}$ نوترون است.
 (ب) جرم هر اتم $^{24}_{\text{Cr}}$ ، بیست و چهار برابر جرم $^{12}_{\text{C}}$ است.
 (پ) جرم اتم‌ها با دقت زیاد توسط طیف‌سنج توری اندازه‌گیری می‌شود.
- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)
- ۶.** اگر تعداد اتم موجود در $57/6$ گرم متان با تعداد توترون موجود در 32 گرم X_2 یکسان باشد، عدد جرمی X چقدر است؟ (عدد اتمی X برابر 25 است.) ($\text{CH}_4 = 16\text{ g.mol}^{-1}$)
- ۸۵ (۴) ۸۰ (۳) ۷۵ (۲) ۷۰ (۱)
- ۷.** چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟
- (آ) پرتوهای فرابنفش در مقایسه با پرتوهای فروسرخ، انرژی کمتری با خود حمل می‌کنند.
 (ب) لایه چهارم اتم‌ها شامل 3 زیرلایه است که در مجموع 18 الکترون را می‌توانند در خود جای دهند.
 (پ) هرچه فاصله الکترون از هسته اتم بیشتر باشد، انرژی بیشتری دارد.
 (ت) الکترونی که دارای عدد کوانتمی $2 = 1$ است، قطعاً انرژی کمتری نسبت به الکترون واقع در زیرلایه $4f$ دارد.
- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)



۸. با توجه به شکل رویدرو (طیف تشری خطي هیدروژن):

(۱) انتقال (۴) در مقایسه با سایر انتقال‌ها با گسیل طول موج کوتاه‌تری همراه است.

(۲) انتقال (۱) با نشر طیفی به رنگ بنفش همراه است.

(۳) انتقال (۳) با نشر طیفی به رنگ نیلی همراه است.

(۴) انتقال (۲) با نشر طول موج کوتاه‌تری نسبت به طول موج نشريافته ضمن انتقال الکترون از لایه چهارم به لایه اول همراه است.

۹. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

(آ) برای الکترون واقع در لایه چهارم، مقدار عدد کواتومی ۱ حداکثر برابر ۴ است.

(ب) تعداد الکترون ظرفیتی اتم منصرهای D_{۲۵} و B_{۲۵} در لایه ظرفیت یکسان است.

(پ) آخرین لایه الکترونی Sn_۵ شامل ۱۶ الکترون است.

(ت) لایه پنجم اتم‌ها گنجایش ۴۶ الکترون را دارد.

۴(۴)

۲(۳)

۲(۲)

۱(۱)

۱	۲																۱۸
۲																	
۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲								
۴	A		B	E						C							
۵					F						D						
۶																	
۷																	

۱۰. با توجه به منصرهای مشخص شده در جدول مقابل که بخشی از جدول دورهای است:

(۱) تعداد الکترون ظرفیتی D و B برابر هم است.

(۲) تعداد الکترون در بیرونی‌ترین زیرلایه اتم‌های A و E برابر هم است.

(۳) اتم دو عنصر دارای زیرلایه نیمه‌پر است.

(۴) میان C و F ۴۲ عنصر دیگر در جدول دورهای وجود دارد.

۴(۴)

۲(۳)

۲(۲)

۱(۱)

۱	۲																۱۸
۲																	
۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲								
۴	L	C		T	B					E							
۵	A									D	F						
۶																	
۷																	

۱۱. با توجه به منصرهای مشخص شده در جدول که به بخشی از جدول تناوبی مربوط است، چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

(آ) اولین عنصری است که لایه الکترونی سوم در اتم آن پر می‌شود.

(ب) در اتم‌های C، A و D لایه الکترونی پنجم پر شده است.

(پ) در اتم‌های A و B همه زیرلایه‌های اشغال شده، پر هستند.

(ت) تعداد الکترون‌های ظرفیتی L و D یکسان است.

(ث) در لایه ظرفیت اتم E، مجموع عدددهای کواتومی اصلی الکترون‌ها برابر ۲۴ است.

۲(۲)

۴(۴)

۱(۱)

۳(۳)

۱۲. اگر مجموع ذرات زیراتومی در اتم عنصر X برابر ۱۶۹ و اختلاف تعداد توترون و پروتون آن برابر ۱۹ باشد، شماره گروه عنصر X کدام است؟

۱۷(۴)

۱۶(۳)

۱۵(۲)

۱۴(۱)

۱۳. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

(آ) در آرایش الکترونی X_۵، تعداد ۲۶ الکترون با عدد کواتومی ۱ = ۱ وجود دارد.

(ب) بار یون‌های پایدار A_{۱۵}, C_{۱۵}, D_{۱۵}, E_{۱۶} به ترتیب (از راست به چپ) برابر -۳, +۲, +۱ و -۱ است.

(پ) هر ترکیب یونی از لحاظ بار الکتریکی، خنثی است.

(ت) در هر ترکیب یونی، تعداد کاتیون با تعداد آئیون برابر است.

(ث) شعاع اتمی Na بیشتر از Cl و شعاع یونی Na^+ کمتر از Cl^- است.

۳(۳)

۲(۲)

۱(۱)

۱۴. چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

(آ) در آلومنیم، اکسید نسبت تعداد آئیون به تعداد کاتیون برابر ۱/۵ است.

(ب) مدل فضا پرکن و همین‌طور، آرایش الکترون - نقطه‌ای مولکول‌های O_۲ و Cl_۲ مثل هم است.

(پ) از واکنش عنصرهای دارای عدد اتمی ۵۵ و ۳۴، یک ترکیب یونی حاصل می‌شود.

(ت) اتم گروه ۱۳ از دوره ۴ جدول دورهای، با از دست دادن تمام الکترون‌های ظرفیتی خود، به آرایش گاز تجیب دوره قبل می‌رسد.

(ث) تشکیل هر مول منیزیم تیترید از اتم‌های منیزیم و تیتروزن، با جایه‌جایی ۶ مول الکترون همراه است.

۴(۴)

۳(۳)

۲(۲)

۱(۱)



۱۵. چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟
- (آ) رنگ شعله سدیم‌نیترات و مس (II) نیترات، به ترتیب زرد و سبز است.
- (ب) از میان کل عنصرهای جهان، فقط در اتم دو عنصر، آخرین لایه الکترونی پر است.
- (پ) آرایش الکترونی ۴ عنصر از دوره چهارم جدول تناوبی، به یک زیرلایه پر ختم می‌شود.
- (ت) مدل فضاپرکن یک مولکول، تعداد پیووند موجود در مولکول را نشان می‌دهد.
- (ث) تعداد کاتیون با تعداد آئیون در هر ترکیب یونی برابر است.
- (ج) ضعن انجام واکنش میان اتم‌های کلر و سدیم، آئیون و کاتیون حاصل، در مقایسه با اتم‌های کلر و سدیم، به ترتیب بزرگ‌تر و کوچک‌ترند.

۵ (۴) ۴ (۳) ۳ (۲) ۲ (۱)

آزمون مسائل فصل اشیمی دهم

۲

۱. زمان پیشنهادی: ۲۵ تا ۳۰ دقیقه

-%

۱. اگر 2×10^{-2} مول از عنصر X دارای 10^{24} عدد پروتون بوده و ۲۴ گرم جرم داشته باشد، 8×10^{-2} مول از این عنصر شامل چند مول توترون است؟
- (۱) ۵۰ (۲) ۵۲ (۳) ۵۴ (۴) ۵۶
۲. تعداد توترون موجود در ۷۲ گرم Br^{+5} چند برابر تعداد الکترون موجود در 6×10^{-2} اتم C_0^{+7} است؟
- (۱) $1/5 \times 10^{21}$ (۲) 3×10^{22} (۳) $1/5 \times 10^{22}$ (۴) 3×10^{21}
۳. اختلاف تعداد توترون و الکترون در X_1^{+3} برابر ۷ است. اگر تعداد ذرات بدون بار موجود در هسته X_2^{+4} برابر ۳۰ باشد و بدانیم در صد فراوانی X_1 در نمونه طبیعی آن ۸۰٪ بیشتر از درصد فراوانی X_2 است، جرم مولی ترکیب XO چند گرم بر مول خواهد بود؟ ($\text{O} = 16 \text{ g/mol}^{-1}$) (در یک نمونه طبیعی از عنصر فرضی X، فقط دو ایزوتوپ X_1 و X_2 وجود دارد.)
- (۱) ۶۸/۲ (۲) ۶۸/۴ (۳) ۶۹/۸ (۴) ۶۹/۶
۴. مولکول فرضی AB_2 شامل ۸۶ پروتون بوده و عدد جرمی A دو برابر عدد اتمی آن و عدد جرمی B، واحد بیشتر از دو برابر عدد اتمی آن می‌باشد، در صورتی که عدد جرمی B، $2/5$ برابر عدد جرمی A باشد، تعداد ذرات زیراتمی موجود در مولکول AB_2 چقدر است؟
- (۱) ۱۱۲ (۲) ۱۶۳ (۳) ۱۹۲ (۴) ۲۷۸
۵. اگر تفاوت شمار الکترون‌ها و توترون‌ها در یون A^{2+} ۷، برابر تعداد توترون‌های سنگین‌ترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن باشد و همچنین مجموع تعداد پروتون‌ها و توترون‌های عنصر A، ۲۴، برابر تعداد توترون‌های ایزوتوپ ساختگی هیدروژن با بیشترین تیم‌عمر باشد، عدد اتمی عنصر A کدام است؟
- (۱) ۴۲ (۲) ۴۳ (۳) ۴۴ (۴) ۴۵
۶. عنصر D دارای دو ایزوتوپ D^{18} (پایدار) و D^{19} (نایپایدار) است. اگر جرم اتمی میانگین D برابر $180/9$ و تیم‌عمر ایزوتوپ D 179 برابر ۲۵ سال باشد، پس از گذشت ۲۵ سال، فراوانی ایزوتوپ D در مخلوط حدود چند درصد می‌شود؟
- (۱) ۷۶/۸ (۲) ۶۴/۴ (۳) ۵۵/۶ (۴) ۴۷/۵
۷. اگر مس دارای دو ایزوتوپ Cu^{63} و Cu^{65} با فراوانی به ترتیب $20/8$ و $69/2$ ٪ و $20/8$ ٪ و کلر دارای دو ایزوتوپ Cl^{35} و Cl^{37} باشد و جرم مولی CuCl_2 برابر $134/588$ گرم بر مول باشد، فراوانی ایزوتوپ Cl چقدر است؟
- (۱) ۷۱/۴ (۲) ۷۲/۴ (۳) ۷۳/۶ (۴) ۷۵/۵
۸. اگر رادیوایزوتوپ X پس از ۲۰ ساعت واپاشی، به میزان $25/6$ درصد باقی بماند و $87/5$ درصد از هسته‌های رادیوایزوتوپ Y پس از ۶ ساعت متلاشی شود، با در اختیار داشتن جرم‌های برابری از این دو رادیوایزوتوپ، پس از گذشت چند ساعت مقدار باقی مانده رادیوایزوتوپ با تیم‌عمر کمتر، برابر رادیوایزوتوپ دیگر است؟
- (۱) ۲/۵ (۲) ۵ (۳) ۷/۵ (۴) ۱۰
۹. اگر هیدروژن دارای ۳ ایزوتوپ H^1 , H^2 , H^3 و اکسیژن تیز دارای سه ایزوتوپ O^{16} , O^{17} و O^{18} باشد، چه تعداد مولکول آب با جرم متفاوت قابل تشکیل است؟
- (۱) ۹ (۲) ۷ (۳) ۱۰ (۴) ۶
۱۰. اگر جرم اتمی عنصر C $12/3$ ، برابر جرم اتمی عنصر A $16/10$ ، برابر جرم اتمی عنصر D باشد، جرم اتمی D برابر چند amu بوده و چند برابر جرم اتمی A است؟
- (۱) ۱/۸۷۵-۶۵ (۲) ۱/۸۷۵-۷۵ (۳) ۱/۸۷۵-۷۵ (۴) ۱/۶۲۵-۷۵
۱۱. اگر جرم اتمی عنصر A^{24} $10/1 \times 10^{24}$ عدد از اتم‌های A و B، به ترتیب ۷۰ و ۸۰ گرم باشد، ۳۸ گرم گاز A_2B_2 شامل چند اتم است؟
- (۱) $1/505 \times 10^{25}$ (۲) $3/01 \times 10^{24}$ (۳) $1/505 \times 10^{24}$ (۴) $3/01 \times 10^{25}$



۱۲. تعداد اتم‌های موجود در $\frac{1}{4} / ۲۸$ گرم ترکیب P_4O_x با تعداد اتم‌های اکسیژن موجود در ۴۲ گرم گلوكز ($C_{12}H_{22}O_6$) برابر است. مجموع اتم‌های موجود در هر مولکول P_4O_x اختلاف تعداد اتم‌های اکسیژن و فسفر موجود در $\frac{1}{4} / ۱۶$ گرم P_4O_x کدام است؟ ($P = ۳۱, O = ۱۶, C = ۱۲, H = ۱: g.mol^{-1}$)

$$(1) ۹ / ۰۳ \times ۱۰^{۲۲} - ۱۰^{۲۲} \quad (2) ۹ / ۰۳ \times ۱۰^{۲۲} - ۱۴^{۲۲} \quad (3) ۱ / ۸۰۶ \times ۱۰^{۲۲} - ۱۰^{۲۲} \quad (4) ۱ / ۸۰۶ \times ۱۰^{۲۲}$$

۱۳. اگر جرم ۰.۲×۱۰^{۲۲} مولکول از اکسیدی با فرمول عمومی Cl_mO_n برابر ۱۵ گرم باشد، نسبت شمار اتم‌های اکسیژن به شمار اتم‌های کلر در ساختار این مولکول برابر چند است؟ ($Cl = ۳۵ / ۵, O = ۱۶: g.mol^{-1}$)

$$(1) ۱ / ۵ \quad (2) ۲ / ۵ \quad (3) ۲ / ۵ \quad (4) ۳ / ۵$$

۱۴. اگر تعداد اتم‌های هیدروژن در مخلوطی گازی از CO_2 و H_2O به جرم ۵۳ گرم در یک ظرف درسته برابر ۰.۲×۱۰^{۲۲} باشد، چند گرم از مخلوط را گاز CO_2 تشکیل می‌دهد؟ ($C = ۱۲, O = ۱۶, H = ۱: g.mol^{-1}$)

$$(1) ۴۴ \quad (2) ۹ \quad (3) ۳۵ \quad (4) ۲۲$$

۱۵. درصد جرمی آلیازی از مس و نیکل را مس تشکیل می‌دهد. شمار اتم‌های نیکل در چند گرم از این آلیاز با شمار اتم‌های هیدروژن در $۱۲ / ۸$ گرم متان برابر است؟ ($H = ۱, C = ۱۲, Cu = ۶۴, Ni = ۵۹: g.mol^{-1}$)

$$(1) ۹۴۴ \quad (2) ۲۳۶ \quad (3) ۱۸۸ / ۸ \quad (4) ۲۵۶$$

آزمون جامع فصل اشیمی دهم

۳

زمان پیشنهادی: ۲۵ تا ۴۰ دقیقه

-%

۱. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

(آ) اولین عنصر ساخته دست بشر، عنصری پرتوزا بود.

(ب) اختلاف تعداد هناظر دو دوره اول جدول دوره‌ای برابر با ظرفیت الکترونی زیرلایه‌ای با $n = 1$ است.

(پ) در اتم هیدروژن از انتقال الکترون از لایه بالاتر به لایه $n = 1$ (حالت پایه)، طیف رنگی ایجاد می‌شود.


(ت) در تعداد ذره زیر اتمی X_a^b ، a و b به ترتیب نشان‌دهنده بار و جرم X است.

$$(1) ۱ \quad (2) ۳ \quad (3) ۳ \quad (4) ۴$$

۲. اتم عنصری در مجموعه دارای ۱۸ ذره زیر اتمی (پروتون، نوترون و الکترون) بوده و اختلاف شمار نوترون و پروتون آن، برابر ۲۴ است. اختلاف شمار الکترون اتم این عنصر در دو لایه الکترونی آخر آن کدام است؟

$$(1) ۱۰ \quad (2) ۱۲ \quad (3) ۱۴ \quad (4) ۱۵$$

۳. کدام گزینه فرایند فنی‌سازی ایزوتوپ Δ را در مخلوط رو به رو به درستی نشان می‌دهد؟ (هر دو ایزوتوپ پایدارند).




۴. طبق داده‌های عمر سنجی، تسبیت فراوانی ایزوتوپ X^{230} به ایزوتوپ X^{235} در ۱۰۰ میلیون سال قبل ۹ به ۴۱ بوده است. اگر $۹ / ۹۵$ گرم از مخلوط این دو ایزوتوپ در حال حاضر معادل $۲ / ۰$ مول باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر برداشت درستی در مورد دو ایزوتوپ بیان می‌کند؟ (هر دو ایزوتوپ نایدارند).

(۱) نیم عمر ایزوتوپ X^{230} کمتر از نیم عمر ایزوتوپ X^{235} است. (۲) نیم عمر ایزوتوپ X^{235} کمتر از نیم عمر ایزوتوپ X^{230} است.

(۳) فراوانی ایزوتوپ X^{235} در طی ۱۰۰ میلیون سال کاهش یافته است. (۴) جرم اتمی میانگین دو ایزوتوپ در طی ۱۰۰ میلیون سال کاهش پیدا کرده است.

۵. در نمودار دایره‌ای مقابله اختلاف شمار نوترون‌ها و پروتون‌ها در ایزوتوپ‌های عنصر X و همچنین فراوانی هر کدام از ایزوتوپ‌ها را مشاهده می‌کنید. جرم اتمی میانگین این عنصر کدام است؟



$$(1) ۱۲۱ / ۸ \quad (2) ۱۲۲ / ۶ \quad (3) ۱۱۹ / ۸ \quad (4) ۱۲۰ / ۶$$

۶. با توجه به عدد اتمی عنصرهای ارائه شده در جدول زیر، چه تعداد از عبارت‌ها در مورد آن‌ها درست است؟

۲۵ A	۲۹ B	۳۱ C	۳۷ D	۴۸ E	۵۱ F	۸۲ G
------	------	------	------	------	------	------

(آ) دو عنصر از دسته d وجود دارد که لایه الکترونی سوم اتم آن‌ها پر است. (ب) فقط در اتم یکی از عنصرها، لایه الکترونی چهارم پر است.

(ت) اتم چهار عنصر از زیرلایه تیمه پر، برخوردار است.

(ث) در اتم سه عنصر، زیرلایه تک الکترونی وجود دارد.

$$(1) ۲ \quad (2) ۳ \quad (3) ۴ \quad (4) ۵$$



$$(Na = 23, O = 16, N = 14, C = 12, H = 1 : g/mol^{-1})$$

(۳) سدیم هیدروژن کربنات (۴) سدیم نیترات

۷. شمار اتم‌ها در ۱ گرم از کدام ترکیب زیر بیشتر است؟

(۱) کربن دی‌اکسید (۲) اتان

۸. تعداد توترون موجود در ۲۱ گرم Fe^{56} ، با تعداد اتم موجود در چند گرم نفتالن یکسان است؟ ($C = 12, H = 1 : g/mol^{-1}$)

(۱) ۶۰ (۲) ۸۰ (۳) ۱۲۰ (۴) ۴۰

۹. نور سبزرنگ، نسبت به پرتوی A، طول موج کوتاه‌تر و نسبت به پرتوی B، دارای انرژی بیشتری است. اگر در هنگام عبور از منشور، پرتوی C از نور سبز بیشتر منحرف شود، B، A و C به ترتیب کدام امواج می‌توانند باشند؟ (کانون فرهنگ آموزش)

(۱) نور با رنگ بنفش - امواج رادیویی - نور با رنگ آبی (۲) نور با رنگ زرد - پرتو فروسرخ - پرتو X

(۳) امواج فرابنفش - نور با رنگ سرخ - نور با رنگ زرد (۴) نور با رنگ نارنجی - امواج رادیویی - ریزموچها

۱۰. با توجه به جدول زیر که طول موج انتقال الکترون بین لایه‌های مختلف اتم هیدروژن را نشان می‌دهد، چند مورد از مقایسه‌های زیر درست است؟

	۶ به ۲	۶ به ۳	۵ به ۳	۲ به ۱	۳ به ۲	۲ به ۱ ...
طول موج (λ)	b	g	e	d	a	انتقال از لایه...

● b > d

● d > a

● g > a

● e < g

● a > b > d

۲ (۴)

۳ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)

۱۱. چند مورد از مطالب زیر درست است؟

● مقدار معین و مجاز عدد کواتومی فرعی در هر لایه از ۰ تا ۱-n است.

● مجموع اعداد کواتومی فرعی زیرلایه‌های موجود در لایه چهارم برابر ۵ است.

● حداکثر گنجایش الکترون در یک لایه اصلی (a) را می‌توان از رابطه $2n^2$ بدست آورد.

● در یون A^{2+} ، مجموع اعداد کواتومی اصلی و فرعی الکترون‌های آخرین زیرلایه اشغال شده از الکترون برابر ۲۵ است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۲. طبق قاعده آفبا چه تعداد از موارد زیر در مورد عنصرهای دسته p تادرست است؟

(آ) دقیقاً در ۰.۵٪ از عناصر این دسته از جدول دوره‌ای، لایه الکترونی چهارم پر است.

ب) اکثر عنصرهای فلزی متعلق به این دسته، می‌توانند به کاتیوتی با آرایش هشت‌تایی تبدیل شوند.

پ) تعداد الکترون فلوفیتی هر اتم از این دسته، برابر تعداد الکترون در آخرین لایه اتم آن‌ها می‌باشد.

ت) لایه الکترونی پنجم فقط در اتم ۶ عنصر از این دسته، پر شده است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۳. اتم‌های موجود در گلوله‌ای کروی شکل به شعاع ۳ سانتی‌متر از فلز مس، به تقریب دارای چند مول الکترون در آخرین زیرلایه خود می‌باشند؟ (جرم

هر سانتی‌متر مکعب از فلز مس را برابر ۸ گرم در نظر بگیرید. $\pi = 3, Cu = 64 g/mol^{-1}$)

۱۴/۵ (۴)

۲۹ (۳)

۱۳/۵ (۲)

۲۷ (۱)

۱۴. اگر شمار الکترون‌ها با $n + 1 = 4$ در بیست‌عنای عنصر جدول تناوبی را با a و شمار الکترون‌های بیرونی ترین زیرلایه آن را با b و شمار الکترون‌های

دارای $n = 1$ آن را با c تماش دهیم، آنگاه حاصل $\frac{a+b}{c}$ چقدر خواهد بود؟

۲ (۴)

۱/۲۵ (۳)

۱/۲ (۲)

۰/۵ (۱)

۱۵. شمار الکترون‌ها در بیرونی ترین زیرلایه اتم X₃₁ با شمار الکترون‌ها در بیرونی ترین زیرلایه چه تعداد از عنصر زیر برابر است؟

۱۱A ، ۱۳B ، ۱۵C ، ۱۷D ، ۲۴E ، ۲۸F ، ۲۹G

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

آزمون جامع فصل اشیمی دهم

۲

زمان پیشنهادی: ۲۰ تا ۲۵ دقیقه

-%

۱. آرایش الکترونی گونه‌ای به ۲p^۶ ختم می‌شود. چند مورد از عبارت‌های زیر می‌تواند درست باشد؟

(آ) اتم آن مربوط به عنصری فلزی است که در دوره سوم و گروه دوم جدول تناوبی قرار دارد.

ب) این آرایش مربوط به کاتیون یکی از فلزهای واسطه است.

پ) هم‌زمان می‌تواند مربوط به آرایش الکترونی یک کاتیون، یک آنیون یا یک اتم خنثی باشد.

ت) این گونه کاتیوتی با بار +۱ است که طول موج رنگ شعله فلز آن کوتاه‌تر از رنگ شعله ترکیب‌های لیتیم است.

۱ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)



۲. نسبت شمار کاتیون به شمار آنیون در باریم تیترید، چند برابر نسبت شمار آنیون به شمار کاتیون در آلومینیم سولفید است؟

(۱) ۴

 $\frac{3}{2}$
 $\frac{9}{4}$
 $\frac{2}{3}$

۳. اتم X در مجموع ۱۸۷ ذره زیراتومی دارد. اگر شمار پروتون آن باشد، چه تعداد از عبارت‌های زیر در ارتباط با این عنصر درست است؟

(آ) با عنصر Y_{۴۴} توکیبی به فرمول X_۶Y تشکیل می‌دهد.

(ب) دارای ۲۰ الکترون با عدد کواترومی ۲ = ۱ است.

(پ) لایه الکترونی چهارم در یون پایدار آن پر است.

(ت) میان آن و عنصر گروه ۱۵ از دوره ششم جدول دوره‌ای، ۲۸ عنصر دیگر قرار دارد.

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱

۴. چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح هستند؟

(آ) از میان گازهای تجیب، فقط در اتم دو مورد از آن‌ها، آخرین لایه الکترونی پر است.

(ب) همه عنصر واسطه دوره چهارم که عدد اتمی آن‌ها زوج است، دارای زیرلایه ۳d با تعداد الکترون‌های زوج هستند.

(پ) نسبت تعداد عنصرهای متعلق به دسته p به تعداد عنصرهای دسته s در سه دوره نخست جدول تناوبی برابر ۶/۲ است.

(ت) اغلب اتم‌هایی که در آن‌ها، نسبت مجموع عدد جرمی و عدد اتمی به تعداد پروتون‌ها بزرگ‌تر یا مساوی ۵/۳ باشد، پرتوزا هستند.

(ث) حداقل تغییر الکترونی هر زیرلایه، از ۴ برابر عدد کواترومی فرعی آن ۲ واحد بیشتر است.

(۱) ۱

(۲) ۴

(۳) ۳

(۴) ۲

۵. جرم پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای ساختگی هیدروژن در حدود چند گرم است؟ ($1\text{amu} = 1/66 \times 10^{-24}\text{g}$)(۱) $11/62 \times 10^{-24}\text{g}$ (۲) $8/3 \times 10^{-24}\text{g}$ (۳) $9/96 \times 10^{-24}\text{g}$ (۴) $6/64 \times 10^{-24}\text{g}$

۶. کدام گزینه نادرست است؟

(۱) تعداد الکترون در لایه ظرفیت اتم X_{۲۸}، دو برابر این تعداد در لایه ظرفیت اتم Y_{۴۴} است.(۲) تعداد الکترون در آخرین لایه الکترونی یون Fe^{۲+}_{۲۶}، دو برابر الکترون‌های آخرین لایه اتم Br_{۳۵} است.

(۳) اختلاف عدد اتمی دو عنصر از دوره سوم جدول دوره‌ای که زیرلایه نیمه پر دارند، برابر ۴ است.

(۴) تعداد الکترون در آخرین زیرلایه اتم‌های A_{۲۴}, B_{۲۱}, D_{۳۷} و C_{۲۳} یکسان است.

۷. چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست هستند؟

(آ) تفاوت شمار دوره‌ها و گروههای جدول تناوبی عنصرها برابر عدد اتمی سبک‌ترین عنصر دوره سوم است.

(ب) در بین ۱۱۸ عنصر جدول دوره‌ای امروزی، تنها ۴ زیرلایه اشغال شده از الکترون وجود دارد که مجموع ۱ و ۱۱۸ آن‌ها برابر ۷ است.

(پ) با توجه به اتم X_{m+1}^m, از میان اتم‌های A_m, B_{m+1}^m, C_{m+1}^{m+1}, D_{m+1}^{m+1} و E_{m+1}^{m+1}, ۲ مورد با آن ایزوتوپ‌اند.(ت) آرایش الکترونی یون‌های پایدار دو عنصر Y_{۲۱} و T_{۱۵} یکسان است.

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴


۸. تמודار مقابل مربوط به تغییرات جرم رادیوایزوتوپ‌های X و Y در گذر زمان است. تیم عمر ایزوتوپ پایدارتر چند برابر تیم عمر ایزوتوپ دیگر است؟ (مقیاس واقعی در تמודار رعایت نشده است.)

(۱) ۱/۵

(۲) ۲

(۳) ۲/۵

(۴) ۵



۹. چه تعداد از عبارت‌های زیر به درستی بیان شده‌اند؟

(آ) در اتم عنصر Se_{۴۶} بیش از ۵۰ درصد الکترون‌های ظرفیتی دارای عدد کواترومی فرعی ۱ می‌باشند.(ب) مجموع جرم ذرات سازنده هسته پایدارترین رادیوایزوتوپ ساختگی هیدروژن برابر $\frac{4}{N_A}$ گرم است.

(پ) طبق ساختار لایه‌ای اتم، الکترون در هر لایه فقط در بخش‌های مشخصی حضور دارد.


(ت) جرم‌های برابر از CO و N_۲ دارای تعداد مول، تعداد مولکول و تعداد اتم‌های برابر نیز هستند. ($C = ۱۲$, $O = ۱۶$, $N = ۱۴$: g.mol^{-1})

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱



۱۰. با توجه به شکل مقابل، چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح است؟

- (آ) این موج نسبت به رنگ شعلهٔ ترکیب‌های لیتیم طول موج بلندتری دارد.
- (ب) طول موج این پرتو برابر 440 nm است و در گسترهٔ تور مرنی قرار دارد.
- (پ) میزان انحراف این موج در عبور از منشور از تور نارنجی بیشتر است.
- (ت) اگر فاصلهٔ 550 nm نانومتر برابر 1000 nm نانومتر بود، این موج می‌توانست متعلق به پرتوهای فروسرخ باشد.

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۱۱. تعداد اتم‌های موجود در 27 g گرم از ترکیبی دارای نیتروژن و اکسیژن، $\frac{1}{4}$ برابر تعداد اتم‌های موجود در هر گرم Br_2 است. نسبت تعداد اتم‌های نیتروژن به اکسیژن در این مولکول کدام است؟ ($1\text{ g.mol}^{-1} : \text{Br} = 80, \text{N} = 14, \text{O} = 16$)

(۱)

(۲)

(۳)

۱۲. با توجه به این که هیدروژن دارای ایزوتوپ‌های طبیعی H^1 ، H^2 و H^3 و اکسیژن دارای ایزوتوپ‌های O^{16} و O^{18} و کربن تیز دارای ایزوتوپ‌های C^{12} و C^{13} می‌باشد، پاسخ پرسش‌های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

- (آ) چه تعداد مولکول CH_3O با جرم مولی متفاوت قابل تشکیل است؟
- (ب) نسبت جرم مولی سنتگین‌ترین مولکول کربن دی‌اکسید به سبک‌ترین مولکول آب دارای دو اتم هیدروژن پرتوزا به تقریب کدام است؟
- (پ) با ایزوتوپ‌های موجود، چند نوع مولکول CO متفاوت قابل تشکیل است؟

(۱)

(۲)

(۳)

۱۳. عنصری در طبیعت دارای ۴ ایزوتوپ می‌باشد. در هستهٔ یکی از ایزوتوپ‌ها با فراوانی 10% درصد، 38% توترون وجود دارد، در ایزوتوپی دیگر با فراوانی 20% درصد و عدد جرمی 71 اختلاف توترون‌ها و الکترون‌ها برابر 7 است. اگر تعداد توترون‌های دو ایزوتوپ سنتگین‌تر برابر 40 و 41 باشد، جرم اتمی میانگین این عنصر چند amu است؟ (درصد فراوانی سنتگین‌ترین ایزوتوپ از ایزوتوپ سوم 10% بیشتر است.)

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۱۴. چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

- (آ) اختلاف عدد اتمی سبک‌ترین عنصر دورهٔ چهارم و تعداد خطوط طیف تشری خطي هیدروژن 3 برابر تعداد الکترون‌های فلرفیتی 33 As است.
- (ب) هر دو عنصر اکسیژن و گوگرد در زمین و مشتری مشترک می‌باشد.
- (پ) در فرایند تشکیل ترکیب یونی بین Ga^{+3} و F^{-1} ، فلز با از دست دادن تعامی الکترون‌های فلرفیتی به آرایش گاز تجیب قبل از خود می‌رسد.
- (ت) براساس داده‌های طیفسنجی، آرایش الکترونی اتم‌های کروم و مس از قاعده آفبا پیروی نمی‌کند.
- (ث) از واکنش گاز زردنگ کلر با گاز H_2 ، مولکول‌های HCl تشکیل می‌شود که در آن‌ها همه اتم‌ها از آرایش هشت‌تایی برخوردارند.

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۱۵. چه تعداد از عبارت‌های زیر می‌تواند جملهٔ مورد نظر را به درستی تکمیل کنند؟

«از _____ در _____ استفاده می‌شود و این عاده _____»

(آ) Tc^{99m} – درمان بیماری‌های قدرهٔ تیرولنید – نخستین عنصر ساخته دست بشر است.

(ب) U^{235} – راکتورهای اتمی به عنوان سوخت – در مخلوط طبیعی اش کمتر از 7% درصد وجود دارد.

(پ) گلوکز نشان‌دار – تشخیص توده سرطانی – دارای یون اتم پرتوزا است.

(ت) گاز کلر – فرایند رنگ‌بری و گندزدایی – در دمای اتاق به صورت گاز زردنگ دیده می‌شود.

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

_____ زمان پیشنهادی: ۵۰ دقیقه

آزمون متنی فصل ۲ شیمی دهم



۱. چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

- (آ) در اتمسفر زمین، مولکول و همین‌طور اتم وجود دارد، اما یونی در آن یافت نمی‌شود.
- (ب) تغییرات آبوهای زمین در دو لایهٔ پایینی آن رخ می‌دهد.
- (پ) در اتمسفر زمین، هرچه فشار هوا کمتر شود، دمای هوا تیز کاهش می‌یابد.
- (ت) جانداران ذره‌بینی، گاز نیتروژن هواکره را برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت می‌کنند.
- (ث) جرم هواکره در دو لایهٔ تروپوسفر و استراتوسفر، تقریباً یکسان است.

(۱)


(۲)

(۳)

(۴)

۲. کدام گزینه درست است؟

- (آ) اکسیژن به دست آمده از تقطیر جزء‌به‌جزء هوا مایع در صنعت، خالص‌تر از نیتروژن به دست آمده است.
- (ب) آرگون گازی بی‌رنگ و بی‌بو، اما سمی است که در ساخت لامپ‌های رشته‌ای کاربرد دارد.
- (پ) مهم‌ترین کاربرد گاز هلیم، استفاده از آن در کپسول‌های غواصی است.
- (ت) رطوبت هوا در قسمت‌های مختلف هواکره، متغیر بوده و میانگین بخار آب در هوا، حدود 1% است.



آزمون‌های مبحثی

فلسفه وجودی این آزمون‌ها، پخش بسیاری از مباحث شیمی در بیش از یک فصل یا حتی یک پایه از کتاب‌های درسی شیمی است. به عنوان نمونه، مبحث شیمی آگی در ۵ فصل از ۱۰ فصل کتاب‌های درسی ارائه شده است: فصل ۱ و ۳ شیمی یازدهم و فصل ۱ و ۴ شیمی دوازدهم. نمونه دیگر، مبحث استوکیومتری واکنش‌ها است که در ۷ فصل از کتاب درسی ارائه شده است: فصل ۲ و ۳ شیمی دهم، فصل ۱ و ۲ شیمی یازدهم و فصل ۱ و ۲ شیمی دوازدهم. این کتاب تنها کتاب آزمون شیمی است که علاوه بر آزمون‌های فصلی، آزمون مبحثی منحصر به فرد نیز در آن ارائه شده است که کل مباحث کتاب درسی را به صورت مبحثی پوشش داده است. بیش از ۲۸ سال تجربه مؤلف این کتاب، گواهی است برای این که آمادگی عموم دانش‌آموزان برای کنکور در درس شیمی، بدون «آزمون‌های مبحثی»، نمی‌تواند به حد مطلوب برسد.

آرایش الکترونی و جدول دوره‌ای

۴۱

(۵) زمان پیشنهادی: ۲۰ تا ۲۵ دقیقه

-%

- ۱) چهار لایه الکترونی در اتم آن پر شده و پنج لایه الکترونی اشغال شده دارد.
۲) تعداد الکترون در آخرین زیرلایه اتم آن و آخرین زیرلایه اتم D ۲۵ یکسان است.

- ۳) کدام عزیزینه در باره عنصر X ۵ درست است؟

(۱) دارای ۲۹ الکترون با عدد کواتموی فرعی ۱ = ۱ است.

(۲) با عنصر A ۸۵، هم‌گروه و با عنصر B ۳۸، هم‌دوره است.

- ۴) چه تعداد از هبارت‌های زیر در رابطه با عنصرهای A ۲۶ و B ۳۴ درست است؟

(آ) مجموع شماره گروه آن‌ها، برابر ۲۲ است.

(ب) تعداد الکترون فلسفیتی اتم آن‌ها، یکسان است.

(پ) مجموع تعداد الکترون در آخرین زیرلایه اتم آن‌ها، برابر ۵ است.

(ت) تعداد لایه الکترونی اشغال شده در اتم آن‌ها، یکسان است.

۴(۴)

۳(۳)

۲(۲)

۱(۱)

- ۵) مقایسه انجام شده در چه تعداد از موارد (آ) تا (ت) درست است؟

(آ) تعداد الکترون در آخرین لایه الکترونی A ۱۵ و B ۸۳، یکسان است.

(ب) تعداد لایه الکترونی پر شده در اتم‌های ۳۴Se و ۵۲Te، یکسان است.

(پ) تعداد الکترون با عدد کواتموی فرعی ۰ = ۱ در اتم‌های K ۱۹ و Cu ۲۹، یکسان است.

(ت) تعداد الکترون Fe ۲۶ و Ni ۲۸^{۲+} در آخرین لایه الکترونی یکسان است.

۴(۴)

۳(۳)

۲(۲)

۱(۱)

- ۶) اگر مجموع عدددهای کواتموی اصلی الکترون‌های ظرفیتی Fe ۲۶ را با حرف a و مجموع عدددهای کواتموی فرعی همان الکترون‌ها را با حرف b نشان دهیم، اختلاف دو عدد a و b چقدر است؟

۱۶(۴)

۱۴(۳)

۱۲(۲)

۱۰(۱)

- ۷) در مورد کدام عنصر (با توجه به عدد اتمی داده شده)، ویژگی ذکر شده نادرست است؟

(۱) A ۴۸: همه زیرلایه‌های اشغال شده در اتم آن، پر هستند.

(۲) B ۷۵: به عنصرهای دسته d تعلق دارد.

(۳) E ۶۸: دارای ۴ لایه الکترونی پر است.

(۴) D ۳۱: با از دست دادن تمام الکترون‌های ظرفیتی، به آرایش گاز تجیب دوره قبل می‌رسد.

- ۸) عنصر واقع در جدول دوره‌ای در مقایسه با عنصر واقع در ، واکنش پذیری بیشتر و شعاد اتمی دارد.

(۱) دوره چهارم و گروه ۱ - دوره چهارم و گروه ۲ - کوچک‌تری

(۲) دوره سوم و گروه ۱۷ - دوره سوم و گروه ۱۶ - بزرگ‌تری

۱	A	۲		۱۸	B
C	D		E F G H I J		
K	L		M N O P Q R		
S	T		U V W X Y Z		

- ۹) با توجه به شکل رویه‌رو که بخشی از جدول دوره‌ای را نشان می‌دهد، چه تعداد از هبارت‌های زیر درست است؟

(آ) در ۷ عنصر، همه زیرلایه‌های اشغال شده، پر هستند.

(ب) در ۷ عنصر، زیرلایه نیمه‌پر وجود دارد.

(پ) ۷ عنصر از دسته S وجود دارد.

- (ت) از عنصرهای فلزی مشخص شده، ۷ عنصر با از دست دادن تمام الکترون‌های ظرفیتی به آرایش هشت‌تایی می‌رسند.

۴(۴)

۳(۳)

۲(۲)

۱(۱)

- ۱۰) با توجه به عنصرهای مشخص شده در شکل رویه‌رو، از میان هبارت‌های زیر، کدام مورد نادرست است؟

(آ) T اولین عنصری است که لایه الکترونی سوم در اتم آن کامل می‌شود.

(ب) در اتم‌های C, A و D لایه الکترونی پنجم پر شده است.

(پ) در اتم‌های A و B همه زیرلایه‌های اشغال شده، پر هستند.

(ت) تعداد الکترون‌های ظرفیتی L و F یکسان است.

(ث) در لایه ظرفیت اتم E، مجموع عدددهای کواتموی اصلی الکترون‌ها برابر ۱۶ است.

۴(۴) پ - ت

۳(۳) فقط ث

۲(۲) ب - ت - ث

۱(۱) آ - ب - ت

۱		۲		۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۲									
۳		۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۴									
۵		L			T		E		
۶					B		F		
۷	A		C			D			



۹. اگر اختلاف شمار توترون و الکترون یون X^{3+} برابر ۴۶ باشد، شمار الکترون‌های بیرونی ترین لایه X و لایه قبل از آن، به ترتیب کدام است؟

(۱) ۱۸، ۵ (۲) ۳۲، ۳ (۳) ۲۲، ۵ (۴) ۴

۱۰. کدام عبارت‌ها در مورد لایه الکترونی چهارم اتم عنصرها درست است؟

آ) شامل ۴ زیرلایه است که مجموعاً ۳۲ الکtron را می‌توانند در خود جای دهند.

ب) همه زیرلایه‌های مربوط به این لایه، در عنصرهای دوره ۴ و ۵ جدول دوره‌ای پر می‌شوند.

پ) در اتم گاز نجیب دوره پنجم، تعداد الکترون موجود در این لایه $\frac{25}{56}$ از گنجایش آن است.

ت) در اتم گاز نجیب دوره چهارم، به اندازه ۲۰٪ گنجایش این لایه، الکترون وارد آن شده است.

(۱) آ، ب (۲) آ، پ (۳) پ، ت (۴) ب، ت

۱۱. با توجه به عنصرهای ارائه شده در کادر زیر، چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد آن‌ها صدق می‌کند؟

${}_{\text{۳}}\text{A}$ ، ${}_{\text{۱۳}}\text{B}$ ، ${}_{\text{۳۱}}\text{C}$ ، ${}_{\text{۲۴}}\text{D}$ ، ${}_{\text{۳۳}}\text{E}$ ، ${}_{\text{۴۸}}\text{F}$ ، ${}_{\text{۵۱}}\text{G}$ ، ${}_{\text{۸}}\text{H}$

آ) زیرلایه p در بیرونی ترین لایه اشغال شده اتم سه عنصر، الکترون ندارد.

ب) سه عنصر به دسته d تعلق دارند.

ت) در اتم سه عنصر، زیرلایه نیمه‌پر وجود دارد.

(۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۱

۱۲. عدد اتمی کدام عنصر، درست مشخص شده است؟

(۱) اولین عنصر دسته p از دوره چهارم جدول: ۳۱

(۴) عنصری از دسته p در دوره پنجم با یک زیرلایه نیمه‌پر: ۵۱

۱۳. اختلاف تعداد الکترون ${}_{\text{۳۱}}\text{A}^{3+}$ و ${}_{\text{۳۲}}\text{B}^{2-}$ در آخرین لایه الکترونی، برابر ————— و اختلاف تعداد الکترون این دو یون با عدد کواترومی ۱ = ۱ برابر ————— است.

(۱) ۱۲، ۱۰ (۲) ۱۰، ۸ (۳) ۶، ۱۰ (۴) ۱۰، ۸

۱۴. چه تعداد از عبارت‌های زیر در رابطه با جدول دوره‌ای عنصرها درست است؟

آ) شامل ۳۶ عنصر از دسته p و ۱۴ عنصر از دسته s است.

ب) آخرین لایه الکترونی هر یک از عنصرهای گروه ۱۷، دارای ۷ الکترون است.

پ) همه فلزهای متعلق به دسته s، با از دست دادن الکترون‌های ظرفیتی به آرایش هشت‌تایی می‌رسند.

ت) تعداد عنصرها با نماد تک حرفی در دوره سوم و چهارم برابر است.

(۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۴

۱۵. چه تعداد از موارد زیر در رابطه با دوره ۴ جدول دوره‌ای صادق است؟

آ) دارای ۳ عنصر که تمام زیرلایه‌های اشغال شده در اتم آن‌ها، پر هستند.

ب) دارای ۴ عنصر با زیرلایه نیمه‌پر

پ) شامل ۱۴ عنصر فلزی

ت) شامل ۷ عنصر که لایه الکترونی سوم در اتم آن‌ها، پر است.

ث) شامل ۹ عنصر که آرایش الکترونی اتم آن‌ها به ${}_{\text{۴}}\text{S}^2$ ختم می‌شود.

(۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۴

۱۶. شکل رویه‌رو بخشی از جدول دوره‌ای عنصرهای را نشان می‌دهد. در رابطه با عنصرهای مشخص شده، کدام

عبارت‌های درست‌اند؟ (در مورد عنصر کربن (C)، دگر شکل گرافیت این عنصر را در نظر بگیرید.)



آ) تعداد عنصرهایی که رسانایی الکتریکی بالایی دارند، سه برابر تعداد عنصرهای نیمه‌رسانا است.

ب) هفت عنصر دارای سطح برآق یا درخشان هستند.

پ) هفت عنصر در حالت جامد، شکننده بوده و قابلیت شکل‌پذیری ندارند.

ت) سه عنصر در دمای اتاق گازی شکل‌اند.

(۱) آ، ب (۲) آ، ت (۳) ب، ت (۴) فقط ت



۱۷. شکل رویه‌رو بخشی از جدول دوره‌ای عنصرها را نشان می‌دهد. از میان عنصرهای مشخص شده در این شکل،

عنصر با غرفتن الکترون، به آرایش الکترونی گاز نجیب تبدیل می‌شوند و اختلاف عدد اتمی

فعال ترین عنصر فلزی با فعال ترین عنصر نافلزی برابر ————— است.

(۱) ۳۲، ۶ (۲) ۲۲، ۴ (۳) ۲، ۶ (۴) ۲، ۴



۱۸. در مورد عنصرهای دسته p از دوره سوم جدول دوره‌ای، اختلاف مجموع اعداد کوانتومی اصلی الکترون‌های ظرفیتی با مجموع اعداد کوانتومی فرعی الکترون‌های ظرفیتی برابر چه عددی است؟

۷۸ (۴)

۷۳ (۳)

۶۸ (۲)

۶۲ (۱)

۱۹. با توجه به این که آرایش الکترونی یون X^{3+} به $3d^5$ ختم می‌شود، چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

(آ) عنصر دارای عدد اتمی ۴۴ با X هم‌گروه است.

ب) میان X و عنصر گروه ۱۶ از دوره پنجم جدول دوره‌ای، ۲۳ عنصر دیگر قرار دارد.

پ) واکنش پذیری X در مقایسه با فلز روی، کمتر است.

ت) یون X^{3+} دارای ۸ الکترون با عدد کوانتومی = ۱ است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲۰. آرایش الکترونی یون A^{2+} به زیرلایه ۵s ختم می‌شود. عنصر A با عنصر هم‌گروه بوده و دارای ۲ الکترون با عدد کوانتومی = ۱ است.

۱۲ X (۴)

۱۲ T (۳)

۲۰ Y (۲)

۲۰ X (۱)

۴۲

نامگذاری، فرمول نویسی، ساختار لوویس و شکل هندسی

زمان پیشنهادی: ۱۵ تا ۲۰ دقیقه

-%

۱. نام چه تعداد از ترکیب‌های زیر درست است؟

(آ) SO_2 : گوگرد دی‌اکسید(پ) MnO_4 : منگنز دی‌اکسید

۱ (۱)

ب) N_2O : دی‌نیتروژن اکسیدت) P_4O_6 : تترافسفر هگزا‌اکسید

۳ (۳)

۲ (۲)

۲. در کدام موارد زیر، نام ترکیب درست نوشته نشده است؟

(آ) NO : نیتروژن مونوکسید (پ) ZnF_2 : روی (II) فلوئورید (ت) PbI_2 : سرب یدید

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۳. نام درست چه تعداد از ترکیب‌های ارائه شده در کادر I را می‌توان در کادر II پیدا کرد؟

I	$Mg(NO_3)_2$, Ba_2P_2 , TiO_2 , $Sn(SO_4)_2$, $COCl_2$
II	منیزیم دی‌نیترات، منیزیم (II) نیترات، تری‌باریم دی‌فسفید، تیتانیم دی‌اکسید، قلع (IV) سولفات، کلسیم دی‌هیدروژن، کبالت (II) کلرید

۲ (۲)

۴ (۴)

۱ (۱)

۳ (۳)

۴. چه تعداد از فرمول‌ها و نام‌های ارائه شده در جدول زیر، درست و مربوط به هم هستند؟

فرمول	$MgPO_4$	$Cu(NO_3)_2$	NH_4SO_4	Ti_2P_2	$ZnMnO_4$
نام	منیزیم فسفات	مس نیترات	آمونیوم سولفات	تیتانیم (IV) فسفید	روی پرمنگنات
	۴ (۴)	۳ (۳)	۲ (۲)		۱ (۱)

۵. تسبیت شمار اتم‌های هیدروژن به شمار اتم‌های اکسیژن در آمونیوم هیدروژن فسفات در مقایسه با تسبیت شمار آنیون به شمار کاتیون در کدام ترکیب، کوچک‌تر است؟

(۴) آلومینیم نیترات

(۳) باریم پرمنگنات

(۲) آلومینیم کربنات

(۱) باریم فسفات

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۶. اختلاف تسبیت شمار کاتیون به شمار آنیون، میان کدام دو ترکیب کم‌تر است؟

(۱) ترکیب ردیف ۱ ستون II و ردیف ۲ ستون I

(۲) ترکیب ردیف ۲ ستون I و ردیف ۱ ستون I

(۳) ترکیب ردیف ۳ ستون II و ردیف ۱ ستون II

(۴) ترکیب ردیف ۳ ستون I و ردیف ۲ ستون II

۷. تعداد پیوند کووالانسی کدام دو گونه متفاوت است؟

(۱) یون کربنات و کربن دی‌اکسید

(۳) یون نیتریت و گوگرد تری‌اکسید


ستون ردیف	I	II
۱	آمونیوم سولفات	روی هیدروژن سولفات
۲	منیزیم پرمنگنات	لیتیم
۳	آلومینیم کربنات	پتاسیم تیترید

(۲) یون سولفات و هیدروژن سیانید

(۴) یون آمونیوم و کربونیل سولفید



۵. برای خنثی کردن $81 \text{ میلی لیتر محلول}$ / $0 \text{ مولار باریم هیدروکسید}$, چند میلی لیتر محلول 98 ppm فسفریک اسید با چگالی $8 \text{ گرم بر میلی لیتر}$ (H = 1, P = 31, O = 16 : g.mol⁻¹) لازم است؟ (معادله واکنش موازن شود)



۲۵۰ (۴)

۱۵۰ (۳)

۷۵ (۲)

۲۵ (۱)

انحلال پذیری (شیمی ۱ / فصل ۳)

۶. اگر انحلال پذیری NaOH در دمای معین، برابر 25 گرم در 100 آب باشد، با استفاده از 5 گرم محلول سیرشده سود در این دما، چند گرم محلول ($\text{H}_2\text{SO}_4 = 98$, $\text{NaOH} = 40$: g.mol⁻¹) 94% سولفوریک اسید را می‌توان خنثی کرد؟

۲۲۵ (۴)

۲۵۰ (۳)

۱۲۵ (۲)

۲۵ (۱)

درصد خلوص (شیمی ۲ / فصل ۱)

۷. با استفاده از 4 لیتر محلول / $0 \text{ مولار هیدروکلریک اسید}$, چند گرم آلومینیم با خلوص 96% را می‌توان حل کرد؟ (معادله واکنش موازن شده)

۹ (۴)

۵/۴ (۳)

۳/۶ (۲)

۱/۸ (۱)

۸. اگر با انر دادن 5 گرم فلز آلومینیم بر مقدار کافی هیدروکلریک اسید، $4/48 \text{ لیتر گاز هیدروژن}$ در شرایط STP حاصل شود، درصد خلوص Al در تموئی مصرف شده چقدر است؟ ($\text{Al} = 27 \text{ g.mol}^{-1}$)

۹۶ (۴)


۸۵ (۳)

۷۲ (۲)

۶۰ (۱)

بازده درصدی (شیمی ۲ / فصل ۱)

۹. در واکنش محلول $6 \text{ مولار کلسیم هیدروکسید}$ با محلول آهن (III) کلرید، اگر جرم رسوب تولید شده برابر $4/77 \text{ گرم}$ باشد، چند لیتر محلول ($\text{Fe} = 56$, O = 16, H = 1 : g.mol⁻¹) کلسیم هیدروکسید مصرف می‌شود؟ بازده واکنش را 80% فرض کنید.



۲۵ (۴)

۱۲/۵ (۳)

۱۱/۲۵ (۲)

۲۲/۵ (۱)

۱۰. اگر در واکنش $800 \text{ میلی لیتر محلول}$ / $1 \text{ مولار هیدروکلریک اسید}$ با فلز آلومینیم، $4 \text{ لیتر گاز هیدروژن}$ با چگالی 6 گرم بر لیتر تولید شده باشد، بازده واکنش انجام شده چند درصد است؟ ($\text{H} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$)

۲۴ (۴)

۱۸ (۳)

۴۰ (۲)

۸۰ (۱)

آناتالپی واکنش (شیمی ۲ / فصل ۲)

۱۱. اگر سوختن $9/2 \text{ گرم}$ بوتان با آزاد شدن 145 کیلوژول گرما همراه باشد، ΔH واکنش زیر چند کیلوژول است؟ ($\text{C}_4\text{H}_{10} = 58 \text{ g.mol}^{-1}$)




-۵۸۰۰ (۴)

+۵۸۰۰ (۳)

+۴۲۰۰ (۲)

-۴۲۰۰ (۱)

۱۲. با توجه به معادله واکنش زیر و ΔH آن، اگر 490 گرم محلول 8 درصد جرمی فسفریک اسید با مقدار کافی محلول کلسیم هیدروکسید وارد واکنش شود، چند کیلوژول گرما آزاد می‌شود؟ ($\text{H}_3\text{PO}_4 = 98 \text{ g.mol}^{-1}$)



۶۴ (۴)

۳۲ (۳)

۲۳ (۲)

۱۶ (۱)

شیمی آلی (شیمی ۲ / فصل ۱ و ۲)

۱۳. اگر سوختن کامل $11/6 \text{ گرم}$ از یک آلکان، با مصرف $40 \text{ لیتر گاز اکسیژن}$ با چگالی $1/0/4 \text{ گرم بر لیتر}$ همراه باشد، هر مولکول از این آلکان چند پیوند کووالانسی دارد؟ ($\text{C} = 12$, H = 1, O = 16 : g.mol⁻¹)

۱۹ (۴)

۱۶ (۳)

۱۳ (۲)

۱۰ (۱)

۱۴. در واکنش 92 گرم محلول 25% جرمی اتانول با ترکیبی از خاتواده کربوکسیلیک اسیدها، 65 گرم استر تشکیل می‌شود. تعداد پیوند کووالانسی در مولکول کربوکسیلیک اسید مورد استفاده چقدر است؟ (در زنجیر کربنی اسید مصرف شده واستر تولید شده، همه پیوندهای کربن-کربن، از نوع یگانه ($\text{C} = 12$, H = 1, O = 16 : g.mol⁻¹) هستند).

۲۲ (۴)

۲۰ (۳)

۱۷ (۲)

۱۴ (۱)

اسید چرب، چربی و صابون (شیمی ۳ / فصل ۱)

۱۵. ۷۱ گرم از یک اسید چرب ۱۸ کربنی باز تجزیه کردنی سیر شده را با مقدار کافی محلول سود وارد واکنش می‌کنیم تا صابون تشکیل شود. اگر صابون تشکیل شده را وارد محلولی با مقدار کافی یون منیزیم کنیم، چند گرم رسوب تشکیل می‌شود؟ $(C=12, H=1, O=16, Na=23, Mg=24: g/mol^{-1})$

۱۴۷/۵ (۴)

۷۲/۷۵ (۳)

۵۲/۲۵ (۲)

۳۶/۸ (۱)

۱۶. با استفاده از اثر دادن سود بر مقداری از یک چربی که مولکول‌های آن به صورت استر سنگین باز تجزیه‌های کربنی سیر شده است، صابون تهیه می‌کنیم. اگر با مصرف ۰ گرم محلول ۴۰٪ جرمی سود، ۱۳۹ گرم صابون تولید شده باشد، فرمول مولکولی چربی مورد استفاده چیست؟ $(C=12, H=1, O=16, Na=23: g/mol^{-1})$

 $C_{54}H_{108}O_6$ (۴) $C_{54}H_{104}O_6$ (۳) $C_{51}H_{104}O_6$ (۲) $C_{51}H_{98}O_6$ (۱)

درجة یونش و ثابت یونش (شیمی ۳ / فصل ۱)

۱۷. با استفاده از ۴ لیتر محلول هیدروفلونوریک اسید با درجه یونش $\alpha = 0.2$ و ثابت یونش $K_a = 8 \times 10^{-5}$ ، چند کیلوگرم محلول کلسیم هیدروکسید را می‌توان خنثی کرد؟ $(Ca(OH)_2 = 74 g/mol^{-1})$

۸۰ (۴)

۶۰ (۳)

۴۰ (۲)

۲۰ (۱)

۱۸. محلولی از آمونیاک با $K_b = 4 \times 10^{-5}$ موجود است. اگر ۴۰۰ میلی لیتر از این محلول بتواند با ۱۰۰ میلی لیتر محلول $2\% \text{ مolar}$ سولفوریک اسید $2NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$ به طور کامل واکنش دهد، درجه یونش آمونیاک در محلول اولیه آن چقدر است؟

۰/۰۵ (۴)

۰/۰۴ (۳)

۰/۰۲ (۲)

۰/۰ (۱)

pH

۱۹. در واکنش ۴ لیتر محلول هیدروفلونوریک اسید با درجه یونش $\alpha = 0.4$ و $pH = 3$ با محلول کلسیم هیدروکسید، چند گرم رسوب کلسیم فلورید حاصل می‌شود؟ با فرض این که بازده واکنش ۹۵٪ باشد. $(CaF_2 = 78 g/mol^{-1})$ $2HF(aq) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaF_2(s) + 2H_2O(l)$

۱/۸۵۳ (۴)

۳/۷۰۵ (۳)

۷/۴۱ (۲)

۱۴/۸۲ (۱)

۲۰. برای واکنش کامل با ۱۶۰۰ میلی لیتر محلول $4\% \text{ H}_2SO_4$ جرمی سولفوریک اسید با جگالی $25/1$ گرم بر میلی لیتر، ۸ لیتر محلول آمونیاک معرف می‌شود. $(H_2SO_4 = 98 g/mol^{-1})$ pH محلول آمونیاک چقدر است؟ درجه یونش $\alpha = NH_3$ در محلول آن را 0.4 در نظر بگیرید.

۱۲ (۴)

۱۱/۳ (۳)

۱۱ (۲)

۱۰/۷ (۱)

۲۱. برای خنثی کردن ۴ لیتر محلول هیدروفلونوریک اسید با $K_a = 3/2 \times 10^{-5}$ چند گرم $NaOH$ با خلوص 80% لازم است در آن وارد کنیم؟ $(NaOH = 4 g/mol^{-1})$ $HF + NaOH \rightarrow NaF + H_2O$

۱۸ (۴)

۹ (۳)

۶ (۲)

۴ (۱)

۲۲. ۵ mL محلولی از تیتریک اسید با $pH = 7$ موجود است. با افزودن آب، حجم محلول را به 200 میلی لیتر می‌رسانیم. با استفاده از 40% میلی لیتر از محلول به دست آمده، چند لیتر محلول آمونیاک با $pH = 11$ و $\alpha = 0.2$ را می‌توان خنثی کرد؟ $NH_3 + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3$

 10^{-2} (۴) 4×10^{-3} (۳) 2×10^{-3} (۲) 10^{-3} (۱)

۲۳. یک میلی لیتر محلول سود در اختیار داریم. با افزودن آب، حجم آن را به 50 میلی لیتر می‌رسانیم. برای خنثی شدن 10 میلی لیتر از محلول $25\% \text{ NaOH}$ کلرواتانویک اسید معرف می‌شود. pH محلول اولیه سود چقدر است؟ $CCl_3COOH + NaOH \rightarrow CCl_3COONa + H_2O$

۱۲/۷ (۴)

۱۲/۳ (۳)

۱۲/۷ (۲)

۱۲/۳ (۱)

۲۴. ۴ میلی لیتر محلول سود موجود است. با افزودن آب حجم آن را به 200 میلی لیتر می‌رسانیم. pH محلول به دست آمده، 5 برابر pH محلول 20% مولار اتانویک اسید با $\alpha = 0.2$ است. pH محلول اولیه سود چقدر است و با استفاده از یک میلی لیتر از آن، چند گرم محلول $6\% \text{ جرمی اتانویک اسید}$ را می‌توان خنثی کرد؟ $(C=12, H=1, O=16: g/mol^{-1})$ $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$

۰/۵، ۱۳/۳ (۴)

۲۰۳/۷ (۳)

۲۰۳/۳ (۲)

۰/۵، ۱۳/۳ (۱)

الکتروشیمی

۲۵. در سلول گالوانی روی - نقره، اگر جرم الکترود کاتدی $4/32$ گرم افزایش یافته باشد، میزان کاهش جرم الکترود آندی چند گرم است؟ $(Ag = 108, Zn = 65: g/mol^{-1})$

۲۸/۵ (۴)


۱۹/۵ (۳)

۱۴/۲۵ (۲)

۹/۷۵ (۱)



۲۶. اگر یک میله ۲۰۰ گرمی روی را داخل ۸۰۰ میلی لیتر محلول ۴٪ مولار تقره نیترات قرار دهیم، تا پایان واکنش چند گرم به جرم میله افزوده می شود؟ (فرض کنید تمام یون های Ag^+ که کاهش می بینند، به میله افزوده می شوند) ($\text{Ag} = ۱۰۸, \text{Zn} = ۶۵ : \text{g.mol}^{-1}$)



۱۲/۰۶ (۴)

۱۹/۱۲ (۳)

۲۴/۱۶ (۲)

۳۸/۲۴ (۱)

۲۷. اگر در سلول گالوانی روی - آلومینیم، جرم تیغه روی ۸٪ ۷ گرم بیشتر شده باشد، چند گرم از جرم تیغه آلومینیم کاسته شده است؟ ($\text{Zn} = ۶۵, \text{Al} = ۲۷ : \text{g.mol}^{-1}$)

۶/۴۸ (۴)

۴/۳۲ (۳)

۳/۲۴ (۲)

۲/۱۶ (۱)

۲۸. در فرایند خوردگی آهن در هوای مرطوب، اگر ۱۱٪ ۱ گرم فلز آهن به زنگ آهن تبدیل شده باشد، جرم گاز اکسیژن مصرف شده چند گرم است؟ ($\text{Fe} = ۵۶, \text{O} = ۱۶ : \text{g.mol}^{-1}$)

۹/۶ (۴)

۷/۲ (۳)

۴/۸ (۲)

۲/۴ (۱)

۲۹. در سلول سوختی هیدروژن، به ازای مصرف ۰.۱ لیتر گاز اکسیژن با چگالی ۱/۲ گرم بر لیتر، ۱۲/۵ لیتر گاز هیدروژن مصرف شده باشد، چگالی گاز هیدروژن مصرف شده، چند گرم بر لیتر است؟ ($\text{O} = ۱۶, \text{H} = ۱ : \text{g.mol}^{-1}$)

۰/۹۶ (۴)

۰/۸۰ (۳)

۰/۶۴ (۲)

۰/۴۰ (۱)

۳۰. در سلول برقکافت سدیم کلرید مذاب، ضمن تولید ۱۲۰ لیتر گاز کلر با چگالی ۱/۷۷۵ ۱ گرم بر لیتر در آند، چند گرم فلز سدیم در کاتد تولید شده و چند مول الکترون جابه جا می شود؟ ($\text{Na} = ۲۳, \text{Cl} = ۳۵/۵ : \text{g.mol}^{-1}$)

۱۲۰,۱۳۸ (۴)

۶,۱۳۸ (۳)

۶,۶۹ (۲)


۳,۶۹ (۱)

شیمی آلی

۴۴

زمان پیشنهادی: ۰٪ تا ۰٪ ۲۵ دقیقه

-%



۱. نام درست ترکیب رو به رو کدام است؟

(۱) ۴ - اتیل - ۲،۳ - تری متیل اوکتان

(۲) ۵ - اتیل - ۶،۶ - تری متیل اوکتان

(۳) ۳،۲ - دی اتیل - ۶ - دی متیل هپتان

(۴) ۶،۵ - دی اتیل - ۲،۶ - دی متیل هپتان

۲. کدام نام می تواند نام درست یک آلкан باشد؟

(۱) ۲ - اتیل - ۳ - متیل هگزان

(۳) ۵ - اتیل - ۲ - متیل هگزان

۳. با توجه به ترکیب های ارائه شده در کادر زیر، چه تعداد از عبارت های (آ) تا (ت) درست است؟

(آ) ۳ - اتیل - ۲ - متیل هپتان (ب) ۴،۳ - دی اتیل - ۱ - هگزان

ب) تعداد پیوند اشتراکی یکسانی دارد.

(آ) فرمول مولکولی یکسانی دارد.

ت) ترکیب (II) برخلاف ترکیب (I)، آب برم را بی رنگ می کند.

پ) تعداد هیدروژن یکسانی دارد.

(۱) ۴ (۴) (۲) ۳

(۱) ۱ (۱)

۴. در رابطه با ترکیب های (آ) هگزان و (ب) اوکتان، چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

(آ) تعداد پیوند اشتراکی در مولکول (آ)، ۷۶ / ۰ برابر تعداد پیوند اشتراکی در مولکول (ب) است.

ب) تعداد گروه متیل در دو مولکول، یکسان است.

پ) تعداد پیوند H-C در مولکول (آ)، $\frac{7}{9}$ تعداد این پیوند در مولکول (ب) است.ت) جرم مولی (آ)، $\frac{7}{9}$ جرم مولی (ب) است.

ث) گرانزوی (آ) در مقایسه با (ب)، کمتر است.

(۱) ۴ (۴) (۲) ۳

(۱) ۱ (۱)



آزمون‌های جامع

در این بخش از کتاب، ۳ آزمون جامع از شیمی دهم، شیمی یازدهم، شیمی دوازدهم و ۱۰ آزمون جامع از کل شیمی (مطابق با کنکور و با همان بودجه‌بندی) ارائه شده است.

حقیقت این است که سطح دشواری سؤال‌های کنکور در سال‌های مختلف، یکی نبوده و به صورت دقیق قابل پیش‌بینی هم نیست. کنکور ۹۸ نسبتاً ساده بود، کنکور ۹۹ بسیار دشوار، کنکور ۱۴۰ دشوار و کنکور ۱۴۱ نسبتاً دشوار و البته از نظر دوپهلو بودن تعدادی از تست‌ها، بفرنجی خاصی برای دانش‌آموزان داشت. برای همین بهتر است با آزمون‌هایی که همه‌شون استاندارد، اما از نظر سطح دشواری قدری متفاوت‌اند، برای کنکور ۱۴۳ آماده شوید.

آزمون جامع شیمی دهم

۵۱

زمان پیشنهادی: ۲۵ تا ۳۰ دقیقه

-%

۱. جرم اتمی میانگین عنصری با ایزوتوپ‌های X^{30} و X^{31} برابر $4/5$ است. در صورتی که در ایزوتوپ X^P شمار توترن‌ها $= 10$ درصد از شمار الکترون‌ها بیشتر باشد و به ازای هر اتم ایزوتوپ سنگین‌تر (X^P)، اتم ایزوتوپ دیگر در نمونه طبیعی این عنصر موجود باشد. تسبیت تعداد ذرات باردار به تعداد ذرات خنثی در ایزوتوپ X^P چند است؟

۳) ۴

۲/۵

۲/۲

۱)

۲. با توجه به موقعیت نسبی عنصرها در جدول مقابل (دسته p جدول دوره‌ای)، چه تعداد از موارد زیر درست است؟
- | | | |
|---|---|---|
| | C | |
| A | | |
| D | | B |
| E | | |
- (آ) هر واحد فرمولی ترکیب یونی حاصل از A و C شامل ۵ یون است.
- (ب) عنصر E آخرين عنصر شناخته شده موجود در جدول می‌باشد.
- (پ) تعداد الکترون‌های با ۱ متفاوت، در لایه ظرفیت اتم D برابرند.
- (ت) تسبیت جفت الکترون‌های پیوتدی به جفت الکترون‌های تاپیوتدی در ترکیب D با B برابر ۳ است.
- (ث) تسبیت مجموع عدددهای کواتومی اصلی الکترون‌های ظرفیتی عنصر C به عنصر E برابر $4/5$ است.

۳) ۴

۲/۳

۵

۱)

۳. اگر جرم اتم C^{12} در حدود $15/0$ جرم اتم X و شمار توترن اتم C^{12} برابر شمار توترن اتم X^{12} باشد، چند الکtron با عدد کواتومی ۱ در اتم X وجود دارد؟

۲۳) ۴

۲۲) ۳

۱۶) ۲

۱)

۴. در ساختار کدام یک از عنصر زیر تسبیت تعداد الکترون‌های لایه سوم به لایه دوم برابر $625/0$ می‌باشد؟

۱۵) D

۷) C

۱۲) B

۱۴) A

۵. در کدام گزینه، تسبیت تعداد الکترون‌های دارای عدد کواتومی ۲ = ۱ در کاتیون گونه اول، به تعداد الکترون‌های دارای عدد کواتومی ۱ = ۱ در گونه دوم، بزرگ‌تر است؟

۲۹) Cu^{+}

۲۱) ScF_3

۲۶) Fe_2O_3

۱۹) K^+

۲۷) CoCl_3

۶. چند گرم متابول شامل $10/0 \times 10/0$ اتم هیدروژن است و جرم این مقدار متقابل با جرم چه تعداد از نمونه‌های زیر، یکسان است؟ ($C=12$, $H=1$, $O=16$, $\text{Cu}=64$, $S=32$: g.mol⁻¹)

۶) $10/0 \times 10/0 / 3$ مولکول گوگرد تری اکسید

۱۰/۴) ۴

۱۰/۲) ۳

۲۰/۲) ۲

۲۰/۴) ۱

۷. چه تعداد از موارد زیر درست است؟

(آ) برای تشکیل 28Ni^{3+} از عنصر فلزی آن، مجموع $1 + n$ الکترون‌های جداسده برابر ۹ است.

(ب) آخرین لایه اشغال شده در اتم گازهای تجیب پر است.

- (پ) اگر در آرایش الکترونی یون فلزی با اختلاف پروتون و الکترون برابر با ۳، تسبیت تعداد الکترون‌های دارای $= 1/6$ برابر تعداد الکترون‌های دارای $= 1$ باشد، اتم آن 13 الکtron دارای $= 1$ دارد.

(ت) داده‌های طیف‌سنجی پیشرفتی نشان می‌دهد که اتم‌های Cr^{24} و Cu^{29} از قاعده آفبا پیروی نمی‌کنند.

۱) ۴

۲) ۳

۳)

۴)

۸. کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟
- (۱) تغییرات کلی فشار هوا را به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع می‌توان به صورت معادله: $p = 15h + 10/0$ نشان داد. (h ارتفاع است).

(۲) در لایه استراتوسفر درصد حجمی گاز نیتروژن تقریباً برابر $78/0$ است.

(۳) در لایه تروپوسفر دما و فشار به ترتیب افزایش و کاهش می‌یابد.

(۴) در لایه‌های بالایی هواکره، ترکیبات گازی اغلب به صورت یون‌های مثبت و منفی یافت می‌شود.

۹. چه تعداد از موارد زیر درست است؟

(آ) گاز نیتروژن به جویی اثر شهرت یافته است و ساختار لوویس آن مشابه کربن مونوکسید است.

(ب) برای توصیف یک نمونه گاز، افزون بر مقدار، باید دما و فشار آن نیز مشخص باشد.

(پ) گاز شهری به طور عمده از متان تشکیل شده است و در محیطی که اکسیژن کم است، به صورت ناقص می‌سوزد.

(ت) در برخی کشورها از آتانول به هنوان سوخت سبز به جای سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شود.



۱) ۴

۴) ۳

۳)

۲)

۱۰. تسبیت مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده‌ها به مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌ها بعد از موازنه، در کدام گزینه بیشتر است؟



۱۱. اگر اتم X با گوگرد ترکیب یوتی به فرمول XS و اتم Y با آلومینیم ترکیب یوتی به فرمول AlY تشکیل دهنند، کدام گزینه زیر حتماً درست است؟

(۱) اتم X در جدول دوره‌ای هم‌گروه منیزیم و کلسیم است.

(۲) اتم‌های Y و S می‌توانند با یکدیگر گونه YS_2^+ تشکیل دهنند که ساختار الکترون- نقطه‌ای آن مشابه CO_2 است.

(۳) بر اثر تشکیل ترکیب یونی توسط X و Y با یکدیگر، ۳ مول الکترون به ازای تشکیل هر مول ترکیب خنثی مبادله می‌شود.

(۴) نسبت شمار کاتیون‌ها به آنیون‌ها در ترکیب یونی حاصل از X و Y به شمار آنیون‌ها به کاتیون‌ها به ترکیب یونی حاصل از Al و S برابر ۲ است.

۱۲. با توجه به نام یون‌های ارائه شده در کادر زیر، چه تعداد از عبارت‌های ارائه شده در مورد آن‌ها درست است؟

تیترات - سولفات - آمونیوم - فسفات - کربنات - تیتریت

(آ) جمع جبری بار آن‌ها برابر (-8) است.

ب) فقط در ساختار لوویس یکی از این یون‌ها، اتم مرکزی الکترون ناپیوندی دارد.

پ) در ساختار لوویس سه یون، همه پیوندها یگانه است.

ت) در ساختار لوویس آن‌ها، در مجموع ۱۶ اتم اکسیژن مشاهده می‌شود.

۱) ۱۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۳. چند گرم پروپان باید به طور کامل بسوزد تا حجم گاز کربن دی‌اکسید تولید شده، در فشار ۸ / ۱۱۰۰°C اتصاف‌فرودمای ۵۴۶ برابر ۲۸ لیتر باشد؟ ($\text{C}_3\text{H}_8 = 44 \text{ g/mol}^{-1}$)

۱) ۱/۵ (۲) ۸/۵ (۳) ۱۱ (۴) ۲۲

۱۴. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

(آ) هوای پاک مخلوطی تاهمگن از چندین گاز است.

ب) در سرتاسر مخلوط‌های همگن، حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی یکسان است.

پ) حل‌شونده، جزئی از محلول است که درصد جرمی کمتری دارد.

ت) از سدیم کلرید برای تولید گاز هیدروژن در صنعت استفاده می‌شود.

۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۱۵. کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

(۱) بین مولکول‌های استون و آب همانند مولکول‌های اتانول، پیوند هیدروژنی برقرار می‌شود.

(۲) در محلول آمونیوم سولفات، جاذبه یون - دوقطبی میان مولکول‌های آب و یون‌ها، در مجموع قوی‌تر از میانگین جاذبه‌هایی است که در آب خالص و در آمونیوم سولفات خالص وجود دارد.

(۳) نمودار تغییرات انحلال پذیری گازها با تغییر فشار بصورت خطی است.

(۴) اگر محلولی رسانایی الکتریکی خوبی دارد، حل‌شونده آن قطعاً یک ترکیب یونی است.

۱۶. اگر معادله انحلال پذیری نمک فرضی A به صورت $S_A = 1/20 + 12$ و معادله انحلال پذیری نمک فرضی B به صورت $S_B = 0/80 + 72$ باشد.

چه تعداد از گزاره‌های زیر در رابطه با آن‌ها به درستی بیان شده است؟ (S = انحلال پذیری و θ = دما بر حسب °C)

(آ) تأثیر دما بر انحلال پذیری نمک A بیشتر است.

(ب) در شرایط STP انحلال پذیری نمک B بیشتر است.

(پ) در محلول سیرشده هر دو نمک در دمای اتاق، درصد جرمی نمک B بیشتر است.

(ت) اگر ۲ محلول سیرشده از این دو نمک را در ۱۰۰ گرم آب 7°C تا 3°C سود کنیم، جرم رسوب تشکیل شده در محلول نمک A بیشتر است.

۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۷. غلظت کربن دی‌اکسید در یک تموهه از مخلوط گازهای متان، کلر، پروپان و بخار آب برابر 20 ppm است. اگر تعداد مولکول‌های هر یک از گازهای

موجود در این مخلوط با هم برابر باشد، غلظت کدام گاز بر حسب ppm با غلظت کربن دی‌اکسید برابر خواهد بود؟

(H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35/5: g/mol^{-1})

۱) CH_4 (۲) Cl_2 (۳) C_2H_6 (۴) H_2O

۱۸. مولاریتۀ محلول سیرشده منیزیم سولفات با انحلال پذیری 50 g در 100 mL $1/\text{Ag.mL}^{-1}$ کدام است؟

(S = 32, Mg = 24, O = 16: g/mol^{-1})

۱) ۲ (۲) ۵ (۳) ۴ (۴) ۳



۱۹. با توجه به شکل‌های داده شده چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟
- (آ) رفتار مولکول‌های CO_2 , O_2 , N_2 در میدان الکتریکی شبیه مولکول‌های شکل (۱) است.
- (ب) شکل (۱) مولکول‌های متان را نشان می‌دهد که گشتاور دوقطبی آنها برابر صفر است.
- (پ) به مولکول‌هایی مانند مولکول‌های شکل (۲) که در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کنند، مولکول‌های قطبی می‌گویند.
- (ت) تحویله جهت‌گیری مولکول‌های آب در شکل (۲) نشان می‌دهد که اتم اکسیژن، قطب منفی و اتم‌های هیدروژن، قطب مثبت مولکول را تشکیل می‌دهند.
- (ث) مولکول‌های آمونیاک در میدان الکتریکی، رفتاری شبیه به مولکول‌های شکل (۲) دارند.
- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۵ (۵) ۱

۲۰. در فرایند تصفیه آب، با استفاده از روش —— می‌توان ترکیب‌های آلی فرار را حذف کرد و با استفاده از —— می‌توان میکروب‌ها را از بین برد.
- (۱) اسمز معکوس، نقطیر
- (۲) نقطیر، کلرزنی
- (۳) صافی کربن، کلرزنی
- (۴) اسمز معکوس، صافی کربن

آزمون جامع شیمی یازدهم

۵۲

زمان پیشنهادی: ۲۵ تا ۳۰ دقیقه

-%

۱. چند مورد از مطالب زیر در رابطه با هناظر موجود در جدول تناوبی تادرست است؟
- (آ) منیزیم در مقایسه با سدیم خاصیت فلزی کمتری داشته و با شدت کمتری با کلر واکنش می‌دهد.
- (ب) کروم، تنها عنصری از تناوب چهارم است که در آرایش الکترونی خود دو زیرلایه نیمه‌پر دارد.
- (پ) همه هناظر موجود در گروه چهاردهم، از نظر رسانایی الکتریکی و گرمایی مشابه هم هستند.
- (ت) گاز کلر در دمای اتاق به آرامی با گاز H_2 واکنش داده و خاصیت نافلزی آن کمتر از فللونور است.
- (ث) دو مورد از هناظر تناوب دوم، تسبیت به هناظر قبل و بعد از خود واکنش پذیری کمتری دارند.
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ (۵) ۱

۲. در چه تعداد از موارد زیر، ویژگی ارائه شده در مورد عنصر موردنظر، صادق است؟
- (آ) A_{۲۵}: فعال‌ترین نافلز دوره چهارم جدول است.

- (ب) B_{۱۹}: دارای بزرگ‌ترین شاعع اتمی در میان عنصرهای دوره چهارم جدول است.
- (پ) D_{۲۹}: آرایش الکترونی آن به یک زیرلایه پر ختم می‌شود.
- (ت) E_۵: به گروه ۱۴ تعلق داشته و براق و چکش خوار است.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ (۵) ۱

۳. چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

- (آ) تعداد الکترون در آخرین لایه الکترونی X^{3+} برابر با تعداد الکترون Y^{31-} با عدد کواتومی ۱ = ۱ است.
- (ب) واکنش هر یک از دو عنصر کربن (گرافیت) و تیتانیم با $\text{Fe}_2\text{O}_۳$ انجام پذیر است.
- (پ) گاز اتن سنگ بنای صنایع پتروشیمی است و از آن در تولید مواد گوناگون استفاده می‌شود.
- (ت) همه آلکن‌ها می‌توانند در واکنش با آب برم، آن را بنگ کنند.
- (ث) در نفت خام علاوه بر هیدروکربن‌های مختلف، برخی تmek‌ها، اسیدها و آب تیز وجود دارد.

- (۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵ (۵) ۲

۴. اگر برای استخراج آهن موجود در ۴۰ گرم ۲۴ لیتر گاز کربن مونوکسید با چگالی ۱/۲۵ g/l معرف شده باشد، بازده واکنش چند درصد است و جرم آهن حاصل چند گرم است؟ (معادله واکنش موازن نشده. $\text{Fe}_2\text{O}_۳ + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$ (Fe = ۵۶, O = ۱۶: g.mol^{-۱})
- (۱) ۱۹/۶، ۵۰ (۲) ۲۸، ۷۰ (۳) ۱۹/۶، ۷۰ (۴) ۲۸، ۷۰ (۵) ۱۹/۶، ۴۰

۵. یون سولفات موجود در ۲/۴ گرم از نمونه‌ای کود شیمیایی را با استفاده از یون باریم، جداسازی کرده و ۲/۳۳ گرم باریم سولفات به دست آمده است. درصد خلوص کود شیمیایی بر حسب یون سولفات و درصد جرمی گوگرد در نمونه به ترتیب از راست به چپ به تقریب کدام است؟ (Ba = ۱۳۷, S = ۳۲, O = ۱۶: g.mol^{-۱})
- (۱) ۱۳/۲۳، ۲۶/۷ (۲) ۱۲/۲۳، ۴۰ (۳) ۱۶/۶۶، ۴۰ (۴) ۱۶/۶۶، ۴۰ (۵)



۲۲. اگر اختلاف سطح انرژی فراورده‌ها با قله نمودار در یک واکنش برابر ۱۰۰ کیلوژول باشد و مقدار عددی ΔH برابر ۵۰ کیلوژول باشد، کدام یک از مطالب زیر درست است؟

- (آ) انرژی فعال‌سازی واکنش رفت می‌تواند $1/5$ برابر انرژی فعال‌سازی واکنش بروگشت باشد.
- (ب) انرژی فعال‌سازی واکنش رفت می‌تواند با $|\Delta H|$ واکنش برابر باشد.
- (پ) این واکنش می‌تواند گرمایشی یا گرماده باشد.
- (ت) سرعت واکنش گرماده بیشتر از سرعت واکنش گرمایش است.

(۴) آ، ب، پ، ت

(۳) پ، ت

(۲) ب، پ

(۱) آ، ب

۲۳. با توجه به واکنش تعادلی $K = ۲۷$ و $Fe_۲O_۳(s) + ۳CO(g) \rightleftharpoons ۲Fe(l) + ۳CO_۲(g)$ ، کدام گزینه رابطه بین فلکندهای تعادلی را به درستی نشان می‌دهد؟

$$[CO_۲] = ۲۷[CO] \quad (۲)$$

$$[CO] = [CO_۲]^۳ \quad (۱)$$

$$[CO] = ۳[CO_۲] \quad (۴)$$

$$[CO_۲] = ۳[CO] \quad (۳)$$

۲۴. کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

- (۱) کاهش حجم در سامانه تعادلی $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ، موجب افزایش غلظت مواد شرکت‌کننده در تعادل می‌شود.
- (۲) حضور $CaCO_۳$ در تعادل $CaCO_۳(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_۲(g)$ بی‌تأثیر است.
- (۳) اثر دما بر سرعت و ثابت تعادل واکنش‌های گرمایشی و گرماده متفاوت است.
- (۴) افزودن کاتالیزگر، تعادل را جابه‌جا می‌کند ولی تأثیری بر مقدار عددی ثابت تعادل ندارد.

۲۵. کدام گزینه درست است؟

- (۱) براساس اصول شیمی سبز و از دیدگاه اتمی، تولید مستقیم متانول از متان، صرفه اقتصادی دارد.
- (۲) ترتالیک اسید همانند بنزن به طور مستقیم از نفت خام استخراج می‌شود.
- (۳) PET برخلاف سایر پلیمرهای سنتزی، ماندگاری زیادی دارد.
- (۴) هنگام تبدیل اتن به اتیلن گلیکول، عدد اکسایش اتم‌های کربن کاهش می‌یابد.

آزمون جامع مطابق با کنکور سراسری

۶۳

زمان پیشنهادی: ۴۰ تا ۵۵ دقیقه

۱. میان موقعیت دو عنصر مشخص در جدول دوره‌ای ۱۰ عنصر دیگر قرار دارد. اگر اختلاف تعداد ذرات زیراتمی بدون بار در اتم این دو عنصر برابر ۱۵ باشد، اختلاف عدد جرمی آن‌ها کدام است؟

(۴) ۲۸

(۳) ۲۷

(۲) ۲۶

(۱) ۲۵

۲. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

- (آ) تولید میزان بسیار بالای انرژی بهمازی مصرف هیدروژن در خورشید می‌تواند دلیلی بر تجدیدناپذیر بودن انرژی خورشید باشد.
- (ب) در نمونه طبیعی برخی از عنصرها، هیچ ایزوتوپی وجود ندارد.
- (پ) ذرات زیراتمی باردار را می‌توان با تعدادهای E^- و P^+ نشان داد.
- (ت) هلیم همانند سایر گازهای تجیب تمايلی برای انجام واکنش با اتم‌های دیگر ندارد.
- (ث) $n=1$ فقط در اتم عنصرهای هیدروژن و هلیم به عنوان حالت پایه در نظر گرفته می‌شود.


(۴) پنج

(۳) چهار

(۲) سه

(۱) دو

۳. ساختار لوویس ترکیب اتم X (از دوره سوم جدول دوره‌ای) با اتم‌های اکسیژن و کلر به صورت شکل زیر است. اگر $2/۰$ مول از این ترکیب شامل ۱۲ مول توترون باشد، جرم مولی آن به تقریب چند g/mol است؟



(۴) ۱۲۰

(۳) ۱۱۸

(۲) ۱۱۷

(۱) ۱۱۶

۴. پرسش مطرح شده در کدام موارد زیر به درستی پاسخ داده شده است؟

- (آ) اولین عنصری که لایه الکترونی سوم در اتم آن نیمه پر می‌شود، چند پروتون در هسته دارد؟
- (ب) عدد اتمی چهارمین عنصر از دسته d در دوره هفتم جدول تناوبی چیست؟
- (پ) در آرایش الکترونی یون پایدار چه تعداد از عنصرهای دوره‌های سوم و چهارم جدول، همه لایه‌های الکترونی اشغال شده پر شده است؟
- (ت) آ و پ

(۳) ب و پ

(۲) آ و پ

(۴) آ و پ

II	I
COCl ₂ کلرید: (II)	سیانو اتن
کربونیل سولفید: CSO	جوش شیرین
ZnS روی: (II)	کولار
(NH ₄) ₂ SiO ₄ آمونیوم سیلیکات:	کلروفرم
	اوره



۵. با توجه به جدول مقابل، به ترتیب در ساختار چه تعداد از ترکیب‌های ستون I، عنصر تیترزن وجود دارد و نام یا فرمول شیمیایی چه تعداد از ترکیب‌های ستون II، به درستی توشته شده است؟




(۱) ۴، ۵

(۲) ۳، ۳

(۳) ۱، ۲

(۴) ۱، ۳

۶. بعد از موازنۀ معادله واکنش‌های زیر، در معادله کدام واکنش‌ها فراورده‌ای با ضریب استوکیومتری یکسان وجود دارد؟



III و II, I (۴)

III و II (۳)

III و I (۲)

I و II (۱)

۷. مخلوطی به جرم ۲۰۰ گرم از دو گاز پروپان و اتن در ظرفی وجود دارد. با افزودن ۸۰ گرم بخار قرمز رنگ برم به این ظرف (قبل از شروع واکنش) درصد جرمی اتن به میزان ۱۶ واحد کاهش می‌یابد. پس از بی‌رنگ شدن کامل مخلوط گازی، درصد جرمی اتن کدام است؟ ($\text{Br} = ۸۰, \text{C} = ۱۲, \text{H} = ۱ : \text{g.mol}^{-1}$)

۲۵ (۴)

۴۰ (۳)

۵۶ (۲)

صفر

۸. مخلوطی از دو گاز NO_2 و NO_x به جرم ۵۸ گرم درون محفظه دربسته‌ای وجود دارد. در اثر افزودن مقداری گاز اوزون به ظرف، NO_x به طور کامل مصرف شده و جرم گاز NO_2 به ۶۲ گرم می‌رسد. با توجه به واکنش انجام شده، پاسخ درست سؤالات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ (فراورده دیگر واکنش گاز NO_2 با اوزون، گاز اکسیژن است و $\text{O} = ۱۶, \text{N} = ۱۴ : \text{g.mol}^{-1}$)

(آ) جرم گاز اوزون اضافه شده برابر چند گرم است؟

ب) نسبت مولی گاز NO_2 به گاز NO_x در مخلوط اولیه چند است؟

پ) اختلاف جرم دو گاز در مخلوط اولیه چند گرم است؟

۴۶/۵ - ۱۲ (۴)

۴۶/۵ - ۴ - ۴ (۳)

۳۵ - ۱۲ (۲)

۳۵ - ۳ - ۴ (۱)

۹. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

(آ) آب یکی از موادی است که در هر سه حالت جامد، مایع و گاز در طبیعت یافت می‌شود.

ب) مقایسه نقطۀ جوش ترکیب‌های هیدروژن دار عنصرهای اول گروه‌های ۱۴ تا ۱۷ به صورت: $\text{H}_2\text{O} > \text{HF} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4$ است.

پ) برهم‌کنش مولکول‌ها در مواد جامد، بیشترین مقدار و در حالت گازی برابر صفر است.

ت) میان هر دو ماده مولکولی در شرایط مشابه، آن که پیوند هیدروژنی دارد، نقطه جوش بالاتری دارد.

۴) یک

۳) دو

۲) سه

۱) چهار


۱۰. درصد جرمی نک فرقی A در محلولی از آن در دمای 90°C برابر $5/5 = ۳۷$ و معادله اتحال پذیری آن به صورت $S = ۰/۲۲\theta + ۲۵$ است. این محلول در دمای 90°C بوده و ۱۶۰ گرم از این محلول، به تقریب با _____ به صورت سیر شده در می‌آید.

(۱) سیر نشده، افزودن ۵ گرم نمک A

(۴) فراسیر شده، افزودن ۱۱ گرم آب با دمای 90°C

(۲) فراسیر شده، رسوب کردن ۵ گرم از نمک A

۱۱. فسفر تری کلرید به عنوان ماده اولیه بسیاری از آفت‌کش‌ها، در صنعت طی واکنش مستقیم گاز کلر با فسفر (P₄) تهیه می‌شود. گاز کلر مورد تیاز را از اثر دادن کدام گاز (X₂) بر سدیم کلرید مطابق معادله زیر، می‌توان به دست آورد؟ و برای تبدیل ۴۹۶ گرم از فسفر جامد به فسفر تری کلرید (با بازده ۸۰ درصد)، چند گرم گاز X₂ باید با سدیم کلرید واکنش دهد تا گاز کلر مورد تیاز تأمین شود؟ ($\text{Br} = ۸۰, \text{Cl} = ۳۵/۵, \text{P} = ۳۱, \text{F} = ۱۶ : \text{g.mol}^{-1}$)



۱۹۶ (۴)

۱۱۴۰ (۳)

۱۱۴۰, F_۲ (۲)۱۹۶, F_۲ (۱)

۱۲. با توجه به این که آرایش الکترونی یون‌های X^{2+} , Y^{2-} , Z^{2+} و Z^{2-} به ترتیب به زیر لایه‌های ۳d^۶, ۳d^۶, ۳p^۶ و ۳d^{۱۰} ختم می‌شود، چند مورد از عبارت‌های زیر تادرست است؟

(آ) تعداد الکترون در آخرین لایه الکترونی اشغال شده اتم X، برابر با یک است.

ب) تعداد پروتون در هستۀ یون Y^{2+} با شمارۀ گروه Y در جدول دوره‌ای برابر است.پ) Z آخرين عنصر دستۀ ۱ دورۀ چهارم جدول دوره‌ای بوده و در ترکیب‌های پایدار خود، اغلب به شکل Z^{2+} یافت می‌شود.

ت) مجموع بالاترین عدد اكسایش اتم‌های X, Y و Z برابر +۱۳ است.

۴) چهار


۳) سه

۲) دو

۱) یک



۱۳. اوره به عنوان کود شیمیایی نیتروژن دار از واکنش آموتیاک و کربن دی اکسید در صنعت تهیه می شود. اگر آموتیاک از واکنش ۱۲۸ مول نیتروژن و ۳۸۴ مول هیدروژن طی شرایط بهینه هابر تولید شود، حداقل چند کیلوگرم اوره را با خلوص ۸۷/۵ درصد می توان تهیه کرد؟ اگر در شرایطی دیگر بازده واکنش دوم ۶۴ درصد باشد، بازده کل فرایند تولید و مصرف آموتیاک چند درصد است؟ ($O = 16, N = 14, C = 12, H = 1: g/mol^{-1}$)




۹۲، ۱/۹۲ (۴)




۲۸، ۱/۹۲ (۳)

۹۲، ۳/۸۴ (۲)

۲۸، ۳/۸۴ (۱)



۱۴. تعمدار تغییرات انرژی کدام واکنش از الگوی مقابله پیروی نمی کند؟



۱۵. اگر اتحال ۱/۱ گرم از کلسیم کلرید خالص و خشک، دمای ۱۹۷ گرم آب را یک درجه سلسیوس افزایش دهد، آنتالپی اتحال کلسیم کلرید در آب، به تقریب چند کیلوژول بر مول است؟ ظرفیت گرمایی ویژه آب را ۴/۲ ژول بر گرم بر درجه سلسیوس در نظر بگیرید. ($Ca = 40, Cl = 35/5: g/mol^{-1}$)

-۸۳ (۴)

-۴۱/۵ (۳)

+۴۱/۵ (۲)

۱۶. با توجه به واکنش: $C_7H_6(g) + H_2(g) \rightarrow C_7H_8(g)$ که در دمای $25^\circ C$ انجام می شود، چند مورد از عبارت های زیر درست است؟ (آنتالپی سوختن

ا) اتن، هیدروژن و اتان با واحد کیلوژول بر مول، به ترتیب برابر -a، -b و -c است.

آ) با افزایش فشار در دمای ثابت، سرعت واکنش افزایش می یابد.

ب) اگر واکنش در حضور ورق نیکلی انجام شود، مقدار اتان تولید شده در واحد زمان بیشتر می شود.

پ) مقایسه آنتالپی سوختن مواد شرکت کننده در واکنش به صورت: $b > a > c$ است.

ت) مطابق قانون هس، آنتالپی واکنش برابر است با: $-a - b + c$

۴) چهار

۳) سه

۲) دو

۱۷. با توجه به ساختار ترکیب مقابله، کدام گزینه درست است؟

۱) اختلاف تعداد اتم های کربن و هیدروژن در ساختار آن برابر ۳ است.

۲) ترکیبی سیر شده بوده و با برقراری پیوند هیدروژنی در آب حل می شود.


۳) نسبت شمار گروه های عاملی کربوکسیل به هیدروکسیل برابر $\frac{2}{3}$ است.

۴) ساختار حلقه در این ترکیب مشابه ساختار حلقه در ویتامین C است.

۱۸. تعمدار رو به رو، تغییرات جرم مخلوط واکنش در تجزیه حرارتی آموتونیوم دی کرومات را تا پایان واکنش نشان می دهد.

اگر سرعت متوسط واکنش از لحظه شروع تا پایان آن، $125/0$ مول بر دقیقه باشد، مقدار اولیه واکنش دهنده چند

گرم بوده و جرم جامد باقی مانده در پایان واکنش چند گرم است؟ ($Cr = 52, O = 16, N = 14, H = 1: g/mol^{-1}$)



۲۸، ۶۳ (۲)

۵۷، ۶۳ (۴)

۱۴، ۶۳ (۱)

۳۸، ۹۴/۵ (۳)


چند مورد از عبارت های زیر درست است؟

آ) از تیتانیم می توان در واکنش بسیارش اتن به عنوان کاتالیزگر در استفاده کرد.

ب) کاهش مصرف غذای فراوری شده به منظور کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط زیست، بیانی از اصول شیمی سبز است.

پ) لیکوپن هیدروکربنی است که در فرمول ساختاری آن، تنها پیوندهای یگانه و دوگانه وجود دارد.

ت) شبیب منحنی تغییرات غلظت کلسیم کربنات در تعمدار «غلظت - زمان» واکنش زیر، قرینه شبیب منحنی تغییرات غلظت کربن دی اکسید است.



۴) چهار

۳) سه

۲) دو

۱) یک

۲۰. چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟ ($Br = 80, C = 12, H = 1: g/mol^{-1}$)

آ) تعداد اتم H در چهارمین عضو خاتواده آلکان ها و ششمین عضو خاتواده آلکین ها (از نظر تعداد کربن) یکسان است.

ب) در صنعت از اثودادن گاز اتن بر مخلوط آب و سولفوریک اسید، اتانول تولید می شود.

پ) ۱۵/۶ گرم بنزن با جذب $6/0$ مول گاز هیدروژن به سیکلوهگزان تبدیل می شود.

ت) جرم مولی فراورده واکنش پروپین با برم، پنج برابر جرم مولی پروپین است.

۴) ۴

۳) سه

۲) دو

۱) ۱



۲۹. با توجه به E° سلول‌های زیر، E° سلول نیکل-منیزیم چند ولت است؟

سلول	منیزیم - روی	روی - نقره	نیکل - نقره	منیزیم - نیکل
$E^\circ(V)$	۱/۶۲	۱/۵۶	۱/۰۵	؟

۱/۸۴ (۴) ۲/۱۳ (۳) ۱/۲۸ (۲) ۲/۳۲ (۱)

۳۰. چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟



- (آ) به دلیل واکنش پذیری بسیار کم فلز آلومینیم، این فلز در هوای مرطوب اکسید شده و خورده نمی‌شود.
- (ب) گونه اکسیده در واکنش اکسایش - کاهش انجام شده در حلبی و آهن سفید یکسان است.
- (پ) در سلول آبکاری یک قاشق آهنی با نیکل، قاشق آهنی را به قطب مثبت باتری اتصال می‌دهند.
- (ت) در سلول سوختی همانند سلول آبکاری فلز، نیم واکنش کاهش در قطب منفی انجام می‌گیرد.
- (ث) در سلول الکتروولیتی مربوط به فرایند هال، جنس هر دو الکtrode کاتدی و آندی از گرافیت است.

۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۳۱. در چند مورد زیر، مقایسه انجام شده درست نیست؟



۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)



۳۴. واکنش فرضی: $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$ در یک ظرف ۳ لیتری در حال تعادل قرار دارد. با کاهش فشار و کاهش دما، تعادل به ترتیب در


جهت رفت و در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود. کدام گزینه در مورد سامانه تعادلی مطرح شده درست است؟


(۱) واکنش گرماییر و سطح انرژی A از سطح انرژی C کمتر است.

(۲) در دمای ثابت با افزایش فشار شمار مول‌های گازی موجود در سامانه کاهش می‌یابد.

(۳) در دما و حجم ثابت با افزودن گاز He به ظرف، تعادل جابه‌جا نشده و سرعت واکنش رفت و برگشت تغییر نمی‌کند.

(۴) در دمای ثابت اگر حجم ظرف به ۱ لیتر کاهش یابد، تعادل در جهت برگشت جابه‌جا شده و غلظت D و C نسبت به تعادل اول کاهش می‌یابد.





پاسخنامه

پاسخ‌های تشریحی تست‌ها در عین کامل بودن، به دور از زیاده‌گویی نوشته شده‌اند.
در صورت نیاز به مطالب بنیادی و کامل‌تر، توصیه می‌کنیم درسنامه‌های مربوطه را که
می‌توانید از طریق این QR-code به آن‌ها دسترسی پیدا کنید، مطالعه کنید.





ت) الکترون دارای عدد کوانتومی $2 = 1$ در زیرلایه‌ای از نوع d قرار دارد. الکترون‌های واقع در زیرلایه‌های $3d$ و $4d$ از تری کمتری نسبت به $4f$ دارند، اما الکترون‌های مربوط به زیرلایه‌های $5d$ و $6d$ در مقایسه با $4f$ ، از تری بیشتری دارند.

۸. گزینه ۲ انتقال (۱) یعنی انتقال الکترون از لایه $n = 6$ به لایه $n = 2$ ، با نشر طیقی به رنگ بنفش همراه است.

شماره انتقال	(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
انتقال	$6 \rightarrow 2$	$5 \rightarrow 2$	$4 \rightarrow 2$	$3 \rightarrow 2$
رنگ خط طیقی	بنفش	نیلی	آبی	قرمز

انتقال (۲) یعنی انتقال الکترون از لایه $n = 5$ به $n = 2$ در مقایسه با انتقال از $n = 11$ به $n = 1$ ، با نشر خط طیقی بالاتری کمتر و طول موج بزرگ‌تری همراه است.

نکته: اختلاف اتری هر دو لایه متواالی الکترونی در یک اتم، هنگامی بیشتر است که شماره آن لایه‌ها، کوچک‌تر بوده و به هسته نزدیک‌تر باشد.

۹. گزینه ۱ عبارت (ب) درست است.

بررسی همه عبارت‌ها ۱) الکترون واقع در لایه چهارم دارای عدد کوانتومی $n = 11$ است، مقدار عدد کوانتومی برای این الکترون، می‌تواند $1, 2, 3$ یا 4 حداکثر 3 باشد. $4f, 4d, 4p, 4s$: زیرلایه‌های متعلق به لایه چهارم

نکته: مقدار عدد کوانتومی فرعی (۱) هر الکترون با عدد کوانتومی اصلی (n)، حداکثر برابر $(n - 1)$ است.

۱۰. گزینه ۲ D_{25} در لایه ظرفیت، تعداد الکترون یکسانی دارند. B_{25} در گروه 17 و B_{25} در گروه 7 جدول قرار داشته و لذا هر دو عنصر، از 7 الکترون ظرفیتی برخوردارند.

پ) آخرین لایه الکترونی Sn_{5} (متعلق به گروه 14) دارای 4 الکترون است.

نکته: آخرین لایه الکترونی اتم هیچ عنصری، بیشتر از 8 الکترون ندارد.

شماره گروه	۱	۲	$3-12$	$13-18$
تعداد الکترون در آخرین لایه	۱	۲	$1 \text{ یا } 2$	$3-8$

گروههای 6 و 11 بقیه عنصرهای واسطه

ت) لایه پنجم گنجایش 5 الکترون را دارد.

۱۱. گزینه ۲ در بیرونی ترین زیرلایه هر یک از دو اتم A و E، ۲ الکترون وجود دارد در گروه 2 و E در گروه 7 قرار دارند و بیرونی ترین زیرلایه هر دوی آن‌ها به صورت S^2 است.

بررسی سایر گزینه‌ها ۱) B به گروه 6 و D به گروه 17 تعلق داشته و در لایه ظرفیت، به ترتیب دارای 6 و 7 الکترون هستند.

۱۲. گزینه ۳ اتم 3 عنصر B (گروه 6), E (گروه 7) و C (گروه 15) دارای زیرلایه نیمه‌پر است.

۱۳. گزینه ۴ عبارت (ب) نادرست و بقیه عبارت‌ها، درست است.

بررسی همه عبارت‌ها ۲) با آرایش لایه ظرفیت $^{4s}1^{2d}1^{10}$ ، اولین عنصری است که لایه الکترونی سوم در اتم آن پر می‌شود. در تمام عنصرهای بعد از این عنصر نیز لایه سوم پر است.

ب) لایه پنجم در هیچ‌یک از عنصرهای واقع در جدول دوره‌ای امروزی پر نیست، زیرا زیرلایه پنجم این لایه ($5g$) در هیچ‌یک از عنصرهای شناخته شده الکترون ندارد.

پ) در اتم A (گروه 2) و B (گروه 12) همه زیرلایه‌های اشغال شده پر است.

۱۴. گزینه ۵ L (گروه 5) و D (گروه 15)، هر کدام 5 الکترون ظرفیتی دارند.

آزمون شماره ۱

۱. گزینه ۱ تنها عبارت درست، عبارت (ت) است.

بررسی عبارت‌های نادرست ۱) دو عنصر از هشت عنصر فراوان‌تر سیاره زمین، فلز واسطه‌اند: Fe و Ni .

۲. گزینه ۲ اولین ذرات مادی که پدید آمدند، ذرات زیراتمی مانند الکترون، پروتون و نوترون بودند و پس از آن، H و He پا به عرصه وجود گذاشتند.

پ) نور خیره‌گذنده خورشید به دلیل تبدیل هیدروژن به هلیوم است.

۳. گزینه ۳ فقط عبارت (آ) نادرست است.

بررسی عبارت نادرست ۱) اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون به پروتون در آن‌ها، بیشتر از $1/5$ باشد، ناپایدارند.

۴. گزینه ۴ عبارت‌های (آ)، (پ) و (ت) درست است.

بررسی عبارت‌های نادرست ۲) نماد پروتون به صورت p^1 و نماد نوترون به صورت n^1 نوشته می‌شود.

۵. گزینه ۵ یکی از ایزوتوپ‌های عنصر اورانیم (^{235}U) به عنوان سوخت در راکتورهای هسته‌ای به کار برده می‌شود.

۶. گزینه ۶ تنها عبارت درست عبارت (ب) است.

بررسی همه عبارت‌ها ۱) بار نسبی نوترون والکترون، برابر صفر و -1 در نظر گرفته می‌شود.

ب) نخیر! گاهی اتم دارای شمار نوترون بیشتر، فراوان‌تر است. به عنوان مثال، فراوانی Li^7 در مقایسه با Li^6 بیشتر است.

پ) جرم الکترون (سبک‌ترین ذره زیراتمی) معادل 0.0005 amu است که در مقایسه با جرم پروتون و نوترون، خیلی کمتر است. جرم نسبی الکترون صفر در نظر گرفته می‌شود.

ت) جرم یک اتم C^{12} برابر 12 amu فرض می‌شود. از طرفی، جرم 6×10^{23} اتم C^{12} برابر 12 g در نظر گرفته می‌شود پس:

$$\frac{\text{تعداد اتم کربن}}{6 \times 10^{23}} = \frac{\text{جرم}}{12 \text{ g}} = \frac{1}{N_A} \text{ g} \sim 12 \text{ amu}$$

پس جرم هر 1 amu برابر است با $\frac{1}{N_A} \text{ g}$.

$$1 \text{ amu} = \frac{1}{6 \times 10^{23}} \text{ g} \approx 1.66 \times 10^{-23} \text{ g}$$

۷. گزینه ۷ عدد جرمی هر اتم برابر مجموع تعداد پروتون و نوترون آن است. جرم A عدد از یک اتم در مقایسه با $\frac{1}{12}$ جرم اتم C^{12} ، جرم اتمی آن را نشان می‌دهد.

۸. گزینه ۸ عبارت‌های (آ) و (ت) نادرست است.

بررسی عبارت‌های نادرست ۱) هر اتم کروم، 24 پروتون دارد و جرم اتمی آن، قطعاً بیش از دو برابر این است. پس جرم هر اتم کروم، بیشتر از 24 برابر جرم C^{12} است.

پ) جرم اتم‌ها با دقت زیاد توسط طیف‌ستج جرمی اندازه‌گیری می‌شود. طیف‌ستج نوری برای مطالعه نور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ت) اگر تعداد نوترون هر اتم Br^{25} را n در نظر بگیریم، عدد جرمی آن برابر $n + 35$ است. بتایراین می‌توان نوشت:

$$\frac{57/6}{16} \times 5 = \frac{32}{70+2n} \Rightarrow n = 45$$

۹. گزینه ۹ عبارت (ب) درست است.

بررسی عبارت‌های نادرست ۱) پرتوهای فرابنفش پرانرژی تر از پرتوهای فروسخ هستند.

پ) لایه چهارم اتم‌ها دارای 4 زیرلایه ($4s, 4p, 4d$ و $4f$) است که در مجموع گنجایش 32 الکترون را دارد.

پس عدد اتمی عنصر X برابر ۵ است.
حالا جرم یک مول عنصر X را حساب می‌کنیم تا عدد جرمی آن مشخص شود:

$$1 \text{ mol X} \times \frac{24 \text{ g X}}{6/2 \text{ mol X}} = 120 \text{ g X}$$

پس عدد جرمی عنصر X برابر ۱۲۰ است.
تعداد مول نوترون در هر مول از X:

$$X = 120 - 50 = 70$$

$$(نوترون) = 56 \text{ mol} \times \frac{70 \text{ mol}}{1 \text{ mol X}}$$

گزینه ۱ هر اتم Br^{35} دارای ۴۵ (۸۰ - ۳۵) نوترون است. از طرفی:

$$1 \text{ mol Br} = 80 \text{ g}, 1 \text{ mol Br} = 6/0.2 \times 10^{22} \text{ Br}$$

$$\begin{aligned} \text{تعداد نوترون در } 72 \text{ گرم} &= \frac{1 \text{ mol Br}}{80 \text{ g Br}} \times \frac{6/0.2 \times 10^{22} \text{ Br}}{1 \text{ mol}} \times \frac{45}{1 \text{ Br}} \\ &= 81 \times 3 / 1 \times 10^{22} \text{ (نوترون)} \\ \text{تعداد نوترون موجود در } 60.2 \text{ اتم} &= 60.2 \text{ atom Co} \times \frac{27}{1 \text{ atom Co}} \\ &= \frac{81 \times 3 / 1 \times 10^{22}}{60.2 \times 27} = 1/5 \times 10^{21} \end{aligned}$$

گزینه ۲ از آنجایی که در X_2 ۳۰ ذره بدون بار (نوترون) وجود دارد، عدد جرمی X_2 برابر ۵۴ می‌باشد.

$$\left. \begin{array}{l} X_1^{2+} : n - e = 7 \\ e = p - 3 \xrightarrow{p=24} e = 21 \end{array} \right\} \Rightarrow n - 21 = 7 \Rightarrow n = 28$$

در نتیجه عدد جرمی X_1 برابر ۵۲ می‌باشد.
در صد فراوانی X_1 را با F_1 و در صد فراوانی X_2 را با F_2 نشان می‌دهیم:

$$\left. \begin{array}{l} F_1 + F_2 = 100 \\ F_1 - F_2 = 80 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} F_1 = 90 \\ F_2 = 10 \end{array} \right.$$

$$X_1 F_1 + X_2 F_2 = \frac{52(90) + 54(10)}{100} = 52.2 \text{ g}$$

پس جرم مولی XO برابر ۶۸/۲ گرم بر مول خواهد بود.

گزینه ۴ اگر عدد اتمی A و B را به ترتیب x و y فرض کنیم، با توجه به داده‌های ارائه شده در صورت سؤال:

$$\begin{aligned} xA, yB \Rightarrow x + 2y = 86 &\Rightarrow y = \frac{86 - x}{2} \\ \Rightarrow B &= 2(\frac{86 - x}{2}) + 10 = 96 - x \end{aligned}$$

پس نماد دو عنصر A و B را می‌توان به این صورت نوشت:

$$\frac{2x}{2} A, \frac{96-x}{2} B$$

عدد جرمی $B/5$ برابر عدد جرمی A است. بنابراین:

$$96 - x = 2/5(2x) \Rightarrow x = 16 \Rightarrow \frac{22}{16} A, \frac{80}{16} B$$

$\Rightarrow AB_2 = 278$ = مجموع تعداد ذرات زیراتومی

گزینه ۱ سنتگین‌ترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن H^1 است که تعداد نوترون‌های آن برابر ۰ است.

$$n - e = 14 \xrightarrow{e=p=2} n - p = 12$$

ایزوتوپ ساختگی هیدروژن با بیشترین نیم عمر H^5 است که تعداد نوترون‌های آن برابر ۴ است.

$$\left. \begin{array}{l} n + p = 96 \\ n - p = 12 \end{array} \right\} \Rightarrow n = 54, p = 42$$

ث لایهٔ ظرفیت E به صورت $4s^2 4p^4$ است. عدد کواتومی اصلی هر ۶ الکترون ظرفیتی این عنصر برابر ۴ است. بنابراین:

گزینه ۱ اگر عدد اتمی عنصر X را با Z و تعداد نوترون آن را با n نشان دهیم، در این صورت:

$$\left. \begin{array}{l} 2Z + n = 169 \\ n - Z = 19 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} 3Z &= 150 \Rightarrow Z = 50 \Rightarrow Xe^{54} \\ \text{پس عنصر X در گروه ۱۴ قرار دارد.} \end{aligned}$$

گزینه ۳ عبارت‌های (آ)، (ب) و (ث) درست‌اند.

بررسی عبارت‌های نادرست

آ آرایش الکترونی X_{10} به $5p^2$ ختم می‌شود. عدد کواتومی ۱ یعنی زیرلایه p.

ت در یک ترکیب یونی، فقط در صورتی تعداد کاتیون با تعداد آئیون برابر است که مقدار بار کاتیون و آئیون، یکسان باشد، مثل $\text{Ca}^{2+}\text{S}^{2-}$ و Na^+F^- .

گزینه ۲ عبارت‌های (آ)، (ب) و (ث) درست‌اند.

بررسی همهٔ عبارت‌ها


آ در گروه ۱۴ Al_2O_3 نسبت تعداد آئیون (O^{2-}) به تعداد کاتیون (Al^{3+}) برابر $\frac{3}{2}$ یا 1.5 است.



اما آرایش الکترون- نقطه‌ای این دو مولکول، متفاوت‌اند:

ب عنصر دارای عدد اتمی ۵۵ در گروه ۱۶ جدول قرار داشته و به ترتیب، فلز و نافلزند. پس از واکنش آن‌ها با یکدیگر ترکیب یونی پدید می‌آید.

ت اتم گروه ۱۳ از دوره ۴ جدول تناوبی دارای عدد اتمی ۳۱ است و ۳ الکترون ظرفیتی دارد. اگر این اتم هر سه الکترون ظرفیتی را از دهد، تعداد الکترون آن به ۲۸ می‌رسد. خب! گاز نجیبی با ۲۸ الکترون نداریم که!



ث برای تشکیل متیزیم نیترید (Mg_2N_2 ، ۶ الکترون از سه اتم Mg به دو اتم N منتقل می‌شود:

$${}_{12}\text{Mg} + {}_{7}\text{N}_2 \longrightarrow {}_{12}\text{Mg}^{2+} + {}_{7}\text{N}^{3-} \xrightarrow{\quad} \text{Mg}_2\text{N}_2$$

گزینه ۲ عبارت‌های (آ)، (ب) و (ث) درست‌اند.

بررسی برخی از عبارت‌ها

ب He_2 و Ne_2 تنها عنصرهایی هستند که آخرین لایهٔ الکترونی اتم آن‌ها پر است.

پ آرایش الکترونی عنصرهای گروه‌های ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ از تناوب چهارم جدول، به یک زیرلایه پر ختم می‌شود.

ث اگر زیروند کاتیون و آئیون در فرمول شیمیابی ترکیب یونی، یکسان نباشد، تعداد کاتیون و آئیون در شبکه یونی آن متفاوت است. مانند AlF_4^- و CaCl_4^- .

ت تعداد پیوند بین اتم‌ها در مدل فضای پرکن مشخص نیست.

ج از نظر شعاع (اندازه):



آزمون شماره ۲

۱ **گزینه ۴** ابتدا محاسبه می‌کنیم که هر مول عنصر X شامل چند مول پروتون است تا عدد اتمی آن مشخص شود:

$$1 \text{ mol X} \times \frac{6/0.2 \times 10^{24}}{6/0.2 \times 10^{22}} \times \frac{1 \text{ mol}}{(پروتون)} = 5.0 \text{ p}$$



۹. **گزینه ۲** در حالتی که عدد جرمی ایزوتوپ‌ها فاصله ۱ واحدی داشته باشد، می‌توان از رابطه زیر برای محاسبه تعداد مولکول‌هایی با جرم مولی متفاوت استفاده کرد:

$$+ (\text{جرم سبک‌ترین مولکول} - \text{جرم سنگین‌ترین مولکول})$$

$$+ (\text{جرم سبک‌ترین مولکول آب} - \text{جرم سنگین‌ترین مولکول آب}) \Rightarrow$$



$$= 24 - 18 + 1 = 7$$

$$10. \quad \text{جرم اتمی } {}^{12}\text{C} \text{ برابر } 12 \text{ amu} \text{ است. بنابراین:}$$

$$\frac{12}{D \text{ جرم اتمی}} = \frac{12 \times 100}{16} \Rightarrow D \text{ جرم اتمی} = \frac{12 \times 100}{16} = 75$$

$$\frac{12}{A \text{ جرم اتمی}} = \frac{12}{3} = 40$$

$$\Rightarrow \frac{D \text{ جرم اتمی}}{A \text{ جرم اتمی}} = \frac{75}{40} = 1.875$$

: B جرم مولی (یعنی جرم یک مول) عنصرهای A و

$$6 / 0.2 \times 1.0^{22} \text{ A} \times \frac{70 \text{ g A}}{3 / 0.1 \times 1.0^{24} \text{ A}} = 14 \text{ g} \quad \text{A مولی}$$

$$6 / 0.2 \times 1.0^{22} \text{ B} \times \frac{80 \text{ g B}}{3 / 0.1 \times 1.0^{24} \text{ B}} = 16 \text{ g} \quad \text{B مولی}$$

$$\text{A}_2\text{B}_3 \text{ جرم مولی} = (2 \times 14) + (3 \times 16) = 76 \text{ g.mol}^{-1}$$

هر مول A₂B₃ شامل ۵ مول اتم بوده و جرمی معادل ۷۶ گرم دارد.

$$38 \text{ g A}_2\text{B}_3 \times \frac{1 \text{ mol A}_2\text{B}_3}{76 \text{ g A}_2\text{B}_3} \times \frac{5 \text{ mol (atom)}}{1 \text{ mol A}_2\text{B}_3} \times \frac{6 / 0.2 \times 1.0^{22} \text{ (atom)}}{1 \text{ mol (atom)}}$$

$$= 1 / 5 \times 5 \times 1.0^{24}$$

$$11. \quad \text{گزینه ۱}$$

$$28 / 4 \text{ g P}_4\text{O}_x \times \frac{1 \text{ mol P}_4\text{O}_x}{(4 \times 31) + (x \times 16) \text{ g P}_4\text{O}_x} \times \frac{(4+x) \text{ mol atom}}{1 \text{ mol P}_4\text{O}_x}$$

$$\times \frac{\text{N}_A \text{ atom}}{1 \text{ mol}} = 42 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{180 \text{ g}} \times \frac{6 \text{ mol O}}{1 \text{ mol}}$$

$$\times \frac{\text{N}_A \text{ atom O}}{1 \text{ mol O}} \Rightarrow x = 10$$

بنابراین P₄O_x همان مولکول P₄O₁₀ است که هر مولکول از آن ۱۴ اتم دارد.

$$14 / 2 \text{ g P}_4\text{O}_{10} \times \frac{1 \text{ mol P}_4\text{O}_{10}}{(4 \times 31) + (10 \times 16) \text{ g P}_4\text{O}_{10}} \times \frac{4 \text{ mol P}}{1 \text{ mol P}_4\text{O}_{10}}$$

$$\times \frac{\text{N}_A \text{ atom P}}{1 \text{ mol P}} = 0.2 \text{ N}_A \text{ P}$$

$$14 / 2 \text{ g P}_4\text{O}_{10} \times \frac{1 \text{ mol P}_4\text{O}_{10}}{(4 \times 31) + (10 \times 16) \text{ g P}_4\text{O}_{10}} \times \frac{10 \text{ mol O}}{1 \text{ mol P}_4\text{O}_{10}}$$

$$\times \frac{\text{N}_A \text{ atom O}}{1 \text{ mol O}} = 0.5 \text{ N}_A \text{ O}$$

پس اختلاف شمار اتم‌های اکسیژن و فسفر موجود در ۱۴/۲ گرم P₄O₁₀ برابر است بد
۰ = ۰/۵N_A - ۰/۲N_A

$$\frac{N_A = 6 / 0.2 \times 1.0^{22}}{= 1 / 8.0 \times 1.0^{22}} = 0.2 \times 6 / 0.2 \times 1.0^{22} = 1 / 8.0 \times 1.0^{22} = \text{اختلاف}$$

۱۱. **گزینه ۲** اگر فراوانی ایزوتوپ‌های D¹⁷⁹ و D¹⁸³ را در آغاز، به ترتیب F_۲ و F_۱ در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$180 / 9 = 179 + \frac{F_2}{100} (183 - 179) \Rightarrow F_2 = \% 47 / 5 \Rightarrow F_1 = \% 52 / 5$$

بعد از گذشت ۲۵ سال، تعداد اتم‌های ایزوتوپ پایدار، ثابت مانده و تعداد اتم‌های ایزوتوپ ناپایدار به نصف کاهش می‌باشد.

$$\frac{47 / 5}{47 / 5 + 26 / 25} \times 100 \approx 64 / 4 = \text{درصد فراوانی ایزوتوپ D}^{183}$$

ترفند ریاضی، با توجه به اختلاف نسبی قابل توجه گزینه‌ها با یکدیگر، در محاسبات قسمت آخر مسئله، از ترفند رنداسیون استفاده می‌کنیم:

$$\frac{47 / 5}{47 / 5 + 26 / 25} \times 100 = \frac{47 / 5}{73 / 75} \times 100 \rightarrow \frac{48 / 5}{75} \times 100$$

$$= \frac{48 / 5 \times 4}{3} = \frac{192}{3} \approx \frac{195}{3} = 65 \Rightarrow$$

$$12. \quad \text{گزینه ۲}$$

جرم اتمی میانگین مس را حساب می‌کنیم:

$$M = M_1 + \frac{F_2}{100} (M_2 - M_1) = 63 + \frac{30 / 8}{100} (65 - 63) = 63 / 616$$

حالا با توجه به جرم مولی CuCl₂، می‌توان جرم اتمی میانگین اتم کلر را حساب کرد:

$$134 / 588 = 63 / 616 + 2M_{\text{Cl}} \Rightarrow M_{\text{Cl}} = 35 / 486$$

حالا اگر فراوانی ایزوتوپ ³⁷Cl را X٪ فرض کنیم، فراوانی ایزوتوپ ³⁵Cl برابر (100-X)٪ خواهد بود.

$$35 / 486 = 35 + \frac{X}{100} (2) \Rightarrow X = 24 / 3$$

ترفند ریاضی، طراح تست به عدم اختلاف نسبی میان گزینه‌ها را قابل توجه گرفته تا راه تقریب بر ما باز باشد. اگر در مورد عده‌های ناهنجار از تقریب بهره می‌گرفتیم:

$$63 + \frac{30}{100} (2) = 63 / 6$$

$$134 / 6 = 63 / 6 + 2M_{\text{Cl}} \Rightarrow M_{\text{Cl}} = 35 / 5$$

$$\text{به همان گزینه ۲ می‌رسیم.}$$

$$\Rightarrow 35 / 5 = 35 + \frac{X}{100} (2) \Rightarrow X = 25$$

$$13. \quad \text{گزینه ۲}$$

$$7.100 \rightarrow 7.50 \rightarrow 7.25 \rightarrow 7.12 / 5 \rightarrow 7.6 / 25$$

۴ نیم عمر معادل ۲۰ ساعت \leftarrow نیم عمر X = ۵ ساعت

$$Y : 7.100 \rightarrow 7.50 \rightarrow 7.25 \rightarrow 7.12 / 5$$

۵ درصد متلاشی شود، یعنی ۱۲/۵ درصد باقی بماند.

۳ نیم عمر معادل ۶ ساعت \leftarrow نیم عمر Y = ۲ ساعت

رابطه ریاضی میان جرم اولیه ماده پرتوزا m و جرم باقی مانده آن (m)

به صورت زیر است:

$$m = \frac{m_*}{2^n} \text{ و } n = \frac{\text{زمان کل}}{\text{نیم عمر}}$$

از این رو خواهیم داشت:

$$m_y = \frac{125}{1000} m_x \Rightarrow \frac{100}{2^n} = \frac{125}{1000} \times \frac{100}{2^m} \Rightarrow \frac{40}{2^n} = \frac{5}{2^m}$$

$$\Rightarrow \frac{40}{2^n} = \frac{5 \times 8}{2^m \times 2^2} \Rightarrow n = m + 3 \Rightarrow \begin{cases} n = \frac{t}{2} \\ m = \frac{t}{5} \Rightarrow t = 10 \text{ h} \end{cases}$$