




پاسخ



درس ۲: تابع درجه سوچ، تابع یکنوا، بخش‌پذیری و تقسیم

■ تابع چند جمله‌ای

هر تابع به شکل $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ را یک چندجمله‌ای از درجه n گوییم، که در آن $a_n \neq 0$ است. ($a_i \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$) برای نمونه، توابع زیر چندجمله‌ای هستند:

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2, \quad g(x) = \sqrt{3}x^7 - \frac{1}{\sqrt{5}}x^2 - 1$$

اما توابع زیر چندجمله‌ای نیستند:

$$f(x) = \frac{1}{3}\sqrt{x} + x - 1, \quad g(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$


$$h(x) = x^{\frac{2}{3}} - \frac{1}{x}$$

مثال: دامنه توابع چندجمله‌ای، اعداد حقیقی یعنی \mathbb{R} است.

در سال گذشته با تعدادی از توابع چندجمله‌ای آشنا شدید:
۱ تابع ثابت، چندجمله‌ای از درجه صفر می‌باشد و دارای فرم کلی $f(x) = k$ ($k \in \mathbb{R}$) است.

۲ تابع خطی، چندجمله‌ای از درجه یک می‌باشد که دارای فرم کلی $f(x) = ax + b$ است.

۳ سه‌می، چندجمله‌ای از درجه دو است که دارای فرم کلی $f(x) = ax^2 + bx + c$ می‌باشد. در صورت کلی نمودار آن به صورت‌های مقابل است:




۴ چندجمله‌ای درجه سه، هر چندجمله‌ای به فرم $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ را یک چندجمله‌ای درجه سه گویند.

مثال: دامنه و برد یک چندجمله‌ای از درجه سه، همواره \mathbb{R} است.

مثال: با استفاده از نقطه‌یابی، نمودار $f(x) = x^3$ را رسم کنید. (کتاب درس)


پاسخ



x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	2
$f(x)$	-8	-1	$-\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	1	8

مثال: با استفاده از انتقال توابع، نمودار تابع زیر را رسم کنید.

$$(الف) f(x) = -x^3, (ب) g(x) = (x-1)^3 + 2, (ج) h(x) = -(x+1)^3 + 2$$





مثال حدود زیر را باید:

(الف) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^4 - x^3 + x - 1$

(ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x^4 - 2x^3 + 7x + 2$

(ت) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - x + 2}{-x^4 + x - 1}$

(ب) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^4 - x^3 + x - 4}{2x - 5x^3 - 1}$

(ت) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x - x^3 + 1}{3 - x^4 + x}$

پاسخ

(الف) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^4 - x^3 + x - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^4 = +\infty$

(ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^4 - 2x^3 + 7x + 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^4 = -\infty$

(ب) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^4 - x^3 + x - 4}{2x - 5x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(2x^4 - x^3 + x - 4)}{(2x - 5x^3 - 1)}$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-x^4)}{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-5x^3)} = \frac{1}{5}$$

(ت) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - x + 2}{-x^4 + x - 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 - x + 2)}{\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^4 + x - 1)}$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4)}{\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^4)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^4) = +\infty$$

(ت) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x - x^3 + 1}{3 - x^4 + x} = \frac{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (2x - x^3 + 1)}{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (3 - x^4 + x)}$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-x^3)}{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (-x^4)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^4} = 0$$

مثال فرض کنید $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ یک چندجمله‌ای از درجه n

و $g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$ یک چندجمله‌ای از درجه m باشد. در این صورت:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m} & ; n = m \\ \text{صفر} & ; m > n \\ \infty & ; m < n \end{cases}$$

در حقیقت نکته فوق به ما می‌گوید برای محاسبه حد توابع کسری در بی‌نهایت، اگر درجه صورت از مخرج بزرگ‌تر باشد، حاصل حد، بی‌نهایت و اگر درجه مخرج از صورت بزرگ‌تر باشد، حاصل حد، برابر صفر می‌باشد.

مثال اگر $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^4 + 3x^3 + 1}{2x^4 + x^3 + 1} = 1$ باشد، $a+b$ کدام است؟

پاسخ با توجه به نکته گفته شده حاصل این حد زمانی عددی غیرصفر می‌شود که درجه صورت و مخرج با هم برابر باشد. بنابراین باید $b = 4$ باشد. لذا داریم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^4 + 3x^3 + 1}{2x^4 + x^3 + 1} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^4}{2x^4} = 1 \Rightarrow \frac{a}{2} = 1 \Rightarrow a = 2$$


در نتیجه $a + b = 6$

تعريف فرض کنیم تابع f در بازه‌ای مثل $(a, +\infty)$ تعریف شده باشد. رابطه $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ به این معناست که مقدارهای $f(x)$ را می‌توان از هر عدد منفی دلخواهی کوچک‌تر کرد، مشروط بر آن که x به قدر کافی بزرگ اختیار شود.


تعريف فرض کنیم تابع f در بازه‌ای مثل $(-\infty, b)$ تعریف شده باشد. رابطه $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ به این معناست که مقدارهای $f(x)$ را می‌توان از هر عدد منفی دلخواهی کوچک‌تر کرد، مشروط بر آن که x به قدر کافی بزرگ و منفی اختیار شود.

تعريف فرض کنیم تابع f در بازه‌ای مثل $(-\infty, b)$ تعریف شده باشد. رابطه $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ به این معناست که مقدارهای $f(x)$ را می‌توان از هر عدد مثبت دلخواهی بزرگ‌تر کرد، مشروط بر آن که x به قدر کافی بزرگ و منفی اختیار شود.

مثال‌های زیر در درک بهتر تعاریف فوق می‌تواند بسیار مفید باشد:



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$$

مثال: همواره داریم:

• فرض کنیم n عددی طبیعی باشد. در این صورت:

(الف) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$

(ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$

• فرض کنیم f و g تابعی از درجه n باشند. در این صورت:

(الف) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = L \pm m$

(ب) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \times \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = L \cdot m$

(ب) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x)} = \frac{1}{m} \quad (m \neq 0)$

• فرض کنیم n عددی طبیعی و a یک عدد حقیقی غیرصفر باشد. آن گام:

(الف) $\lim_{x \rightarrow +\infty} ax^n = \begin{cases} +\infty & \text{ا} \\ \text{مثبت} & \end{cases}$

(ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} ax^n = \begin{cases} +\infty & \text{زوج و } a \text{ مثبت} \\ -\infty & \text{زوج و } a \text{ منفی} \\ -\infty & \text{فرد و } a \text{ مثبت} \\ +\infty & \text{فرد و } a \text{ منفی} \end{cases}$



مثال: فرض کنیم f یک تابع چندجمله‌ای از درجه n به صورت


$f(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + k$ باشد که در آن n عددی طبیعی و

a یک عدد حقیقی غیرصفر است. در این صورت:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (ax^n + bx^{n-1} + \dots + k) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax^n$$

ردیف	سوالات	نمره
فصل اول		
۱	درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید. اگر $k > 1$ باشد، تابع $y = kf(x)$ از انبساط عمودی تابع $y = f(x)$ حاصل می‌شود. پرتابار	۰/۲۵
۲	جای خالی را کامل کنید. اگر $A = (-2, 5)$ نقطه‌ای روی تابع $y = f(x)$ باشد، آن‌گاه نقطه متناظر آن روی تابع $y = f(x+2) - 3$ به صورت _____ است.	۰/۵
۳	درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. الف) برای تابع $f(x) = -x$ درجه تعریف نمی‌شود. ب) عبارت $x^n + a^n$ بر $x - a$ بخش‌پذیر است. پرتابار	۱/۵
۴	جای خالی را کامل کنید. تابع $f(x) = x^2 - 2x$ روی بازه _____ اکیداً نزولی است.	۰/۲۵
۵	تابع $f(x) = x^3 + 3x^2$ را در نظر بگیرید. الف) تابع $f(x)$ را در رسم کنید. ب) این تابع در چه بازه‌ای صعودی و در چه بازه‌ای نزولی است؟	۰/۲۵
۶	نعادل تابعی رسم کنید که در بازه $(-\infty, 2)$ صعودی و در بازه $(2, +\infty)$ صعودی باشد (اکیداً صعودی تباشد).	۱
۷	الف) چند جمله‌ای $x^4 - x^3$ را با هامل $(1-x)$ تجزیه کنید. ب) مقادیر a و b را طوری به دست آورید که باقی مانده تقسیم عبارت $p(x) = x^4 - ax^3 + bx^2 + 2x + 1$ بر $(x-1)$ به ترتیب ۴ و ۳ باشد. پرتابار	۰/۵
فصل دوم		
۹	درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید. تابع $y = \tan \theta$ در $(-\pi, \pi)$ صعودی است. پرتابار	۰/۲۵
۱۰	جای خالی را کامل کنید. الف) دامنه تابع $y = \tan \frac{x}{2}$ برابر _____ است. ب) قابله تابع کسینوسی که $\min = -5$ و $\max = 4$ ، $T = 4\pi$ برابر با _____ است.	۰/۵
۱۱	الف) نعادل یک تابع رسم کنید که دوره تناوب آن برابر π باشد. ب) در تابع $y = \frac{1}{2} \sin 3x$ ، دوره تناوب، بیشترین مقدار و کمترین مقدار را به دست آورید.	۰/۷۵
۱۲	معادله‌های زیر را حل کنید و جواب عمومی آن‌ها را بنویسید. پرتابار	۱
۱) $2 \sin 3x - \sqrt{2} = 0$ (الف) ۲) $2 \cos^2 x - 4 \cos x = 0$ (ب) ۳) $\tan x + \tan 2x = 0$ (ج)		

ردیف	سوالات	نمره
۱	<p>جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید.</p> <p>(الف) به تابعی که در یک بازه فقط صعودی یا نزولی باشد، می‌گوییم.</p> <p>(ب) برد تابع تانژانت ($y = \tan x$) برابر است.</p> <p>(پ) با توجه به شکل مقابل، حد تابع $\frac{1}{ x } f(x)$ در نقطه $x = 0$ برابر است با .</p> <p>(ت) اگر تابع f در $x = a$ مشتق‌پذیر باشد، آن‌گاه f' در a است.</p> 	۱
۲	<p>درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را تعیین کنید.</p> <p>(الف) اگر تابع f در هر نقطه اکسترمم تسبی مشتق‌پذیر باشد، آن‌گاه مشتق تابع f در این نقاط صفر می‌شود.</p> <p>(ب) تابع صعودی اکید، نقطه عطف ندارد.</p> <p>(پ) اگر علامت f' بر بازه‌ای منفی باشد، آن‌گاه تابع f بر آن بازه اکیداً نزولی است.</p> <p>(ت) در نقطه عطف، علامت $(x)^m$ تغییر می‌کند.</p>	۱
۳	نمودار تابع $y = \cos(x - \frac{\pi}{3})$ را به کمک تعمودار $y = \cos x$ در بازه $[0, 2\pi]$ رسم کنید.	۰/۷۵
۴	با رسم تعمودار تابع $f(x) = \begin{cases} x^4 & x \geq 0 \\ -3x & -1 < x < 0 \end{cases}$ ، تعیین کنید تابع در چه بازه‌ای اکیداً صعودی و در چه بازه‌ای اکیداً نزولی است.	۰/۷۵
۵	باقي‌مانده تقسیم عبارت‌های 1 و $q(x) = 2x^4 - x + 1$ بر $p(x) = x^4 + ax + 1$ یکسان است. مقدار a را بایابید.	۰/۷۵
۶	ضابطه تابع مثلثاتی سینوس با دوره تناوب 3 و مقادیر ماکزیمم 5 و مینیمم 3 را بنویسید.	۰/۷۵
۷	معادله مثلثاتی $\sin x - 2\cos^2 x = 1$ را حل کنید. پرتوکار	۱
۸	حدهای زیر را محاسبه کنید.	۱
	(الف) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+1}{ x-2 }$	
	(ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x}{x^3 - 2}$	
۹	مجاذب‌های قائم و افقی تعمودار تابع $f(x) = \frac{1-2x^3}{x^3-1}$ را در صورت وجود بیابید.	۱/۲۵
۱۰	معادله خط معاس بر منحنی تابع $f(x) = x^4 - 2x^2$ را در نقطه $A(1, f(1))$ به دست آورید.	۱/۵
۱۱	<p>با توجه به تعمودار f به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) طول نقطه‌ای که مشتق در آن صفر است را بنویسید.</p> <p>(ب) طول نقطه «گوشه‌ای» را بنویسید.</p> <p>(پ) طول نقطه‌ای که در آن مقدار تابع و شیب خط، هر دو منفی است را بنویسید.</p> 	۰/۷۵
۱۲	<p>جسمی را از سطح زمین به طور عمودی پرتاب می‌کنیم. جهت حرکت به طرف بالا مثبت در نظر می‌گیریم. فرض کنید ارتفاع این جسم از سطح زمین در هر لحظه از معادله $h(t) = -5t^2 + 40t$ به دست می‌آید. مطلوب است:</p> <p>(الف) سرعت متوسط در بازه $[1, 2]$.</p> <p>(ب) سرعت لحظه‌ای در زمان $t = 3$.</p>	۱



(فصل ۱ / توابع یکنوا و اکیداً یکنوا)

$$(x^n - 1) = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + x^{n-3} + \dots + x^1 + 1) \quad (\text{الف})$$

$$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3 \Rightarrow p(-3) = (-3)^r - a(-3)^r + b(-3) = 4 \quad (\text{ب})$$

$$\Rightarrow -9a - 3b = 27 + 4 = 31 \Rightarrow -9a - 3b = 31 \quad (\text{د})$$

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow p(1) = 1^r - a(1)^r + b(1) = -3 \Rightarrow -a + b = -4 \quad (\text{ه})$$

$$\begin{cases} 9a + 3b = -31 \\ -a + b = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 9a + 3b = -31 \\ -9a + 9b = -36 \end{cases} \Rightarrow b = \frac{-67}{12} \quad (\text{و})$$

$$-a + b = -a - \frac{67}{12} = -4$$

$$a = 4 - \frac{67}{12} = \frac{48 - 67}{12} = \frac{-19}{12} \quad (\text{ز})$$

(فصل ۱ / بخش پذیری و تقسیم)

درست (فصل ۲ / تابع تانژانت) (د)

(الف) ۹

$$\frac{x}{\pi} \neq k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x \neq 2k\pi + \pi, k \in \mathbb{Z}$$

(الف) ۱۰

$$D_y = \mathbb{R} - \{2k\pi + \pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

(د) ۱۱

(فصل ۲ / دامنه تابع تانژانت)

$$T = \sqrt[3]{\pi} = \frac{\sqrt[3]{\pi}}{|b|} \Rightarrow |b| = \frac{1}{\sqrt[3]{\pi}} \Rightarrow b = \pm \frac{1}{\sqrt[3]{\pi}} \quad (\text{ب})$$


$$\left\{ c = \frac{\max + \min}{2} = \frac{-5 + 4}{2} = \frac{-1}{2} \right. \quad (\text{د})$$

$$\left\{ \max = |a| + c = |a| + \left(\frac{-1}{2}\right) = 4 \Rightarrow |a| = \frac{9}{2} \right. \quad (\text{ه})$$

$$\Rightarrow y = \frac{9}{2} \cos\left(\frac{1}{2}x\right) - \frac{1}{2} \quad (\text{و})$$

(فصل ۲ / دوره تناوب)

(الف) (د) ۱۱



$$T = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{|\frac{1}{3}|} = \frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi \quad (\text{ب})$$

$$\max = |a| + c = \left|\frac{-1}{2}\right| + 3 = \frac{5}{2} \quad (\text{د})$$

$$\min = -|a| + c = -\left|\frac{-1}{2}\right| + 3 = \frac{5}{2} \quad (\text{ه})$$

(فصل ۲ / دوره تناوب)

امتحان ۲ - نوبت اول



درست (فصل ۱ / ابساط و انتباخت عمودی). (د) ۱

(د) ۲

$$B(-4, 2) \quad (\text{د})$$

$$y = f(x+2) - 3 \Rightarrow x+2 = -2 \Rightarrow x = -4 \quad (\text{د})$$

$$\Rightarrow f(-4+2) - 3 = f(-2) - 3 = 5 - 3 = 2 \quad (\text{د}) \Rightarrow A'(-4, 2)$$

(فصل ۱ / انتقال توابع)

(د) ۳

$$-2 \leq -\frac{1}{2}x < 1 \Rightarrow -2 < x \leq 4 \Rightarrow D_g = (-2, 4]$$

(د) ۴

$$f(x) < -1 \Rightarrow g(x) = f\left(-\frac{1}{2}x\right) - 3 < -1 - 3 = -4 \quad (\text{د})$$

(د) ۵

$$\Rightarrow R_f = (-\infty, -4) \quad (\text{د})$$

(فصل ۱ / تبدیل نمودار توابع)

نادرست. درجه تابع ثابت برابر صفر است. (د)


ب) نادرست (د) زیرا:

$$x - a = 0 \Rightarrow x = a \Rightarrow x^n + a^n = a^n + a^n \neq 0.$$

(فصل ۱ / تقسیم و بخش پذیری)

(د) ۶

$$f(x) = 2x - x^r = -(x^r - 2x) = -[(x-1)^r - 1]$$





(فصل ۱ / توابع یکنوا و اکیداً یکنوا)

(الف) ۶

$$f(x) = x^r + 2x^r + 3x = x^r + 3x^r + 3x + 1 - 1$$

$$\Rightarrow (x+1)^r - 1 \quad (\text{د})$$

(فصل ۱ / تابع درجه ۳)



ب) مطابق نمودار، تابع در \mathbb{R} صعودی است. (د)

(فصل ۱ / توابع یکنوا)



$$D_g = [-1, 2] \quad (0/2)$$

$$R_g = [-2, 4] \quad (0/2)$$

$$f(-1) = 0 \quad (0/2) \Rightarrow 1 - a - 3 = 0 \Rightarrow a = -2 \quad (0/2)$$

$$f(2) = 4 - 4 - 3 = -3 \quad (0/2)$$

(فصل ۱ / انتقال توابع)

$$x^6 - 1 = (x+1)(x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1) \quad (0/1)$$

(فصل ۱ / تقسیم چندجمله‌ای‌ها)

$$\text{الف) } 8 \quad (\text{فصل ۲ / دوره تناوب}) \quad \text{ب) } 3 \quad (\text{فصل ۳ / حدینهایت})$$

$$\text{A) } f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 - x^4}{x-1} \quad (\text{فصل ۴ / شیب خط مماس}) \quad \text{ت) بحرانی (فصل ۵ / تعریف نقطه بحرانی)} \quad (0/2)$$

$$2\cos^2 x - 1 + \cos x + 1 = 0 \quad (0/2)$$

$$\Rightarrow \cos x(2\cos x + 1) = 0 \quad (0/2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \quad (0/2) \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (0/2) \\ \cos x = -\frac{1}{2} \quad (0/2) \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \quad (0/2) \end{cases}$$

(فصل ۲ / معادلات مثلثاتی)

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 - 4x + 3}{x^4 - 2x - 3} = \infty \quad (0/2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 4x + 3}{x^4 - 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-1)}{(x-2)(x+1)} = \frac{1}{2} \quad (0/2)$$

بنابراین خط $x = -1$ مجانب قائم منحنی f است (0/2) ولی

مجانب قائم منحنی تابع f نیست. (0/2) (فصل ۳ / مجانب قائم و افقی)

(فصل ۳ / مجانب قائم و افقی) $y = 1$ و $y = -2$

تابع f در $x = -1$ پیوسته است. (0/2) \blacksquare

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{|x^2 + x|}{x + 1} \quad (0/2)$$

$$= \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{-x(x+1)}{x+1} = 1 \quad (0/2)$$

$$f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x(x+1)}{x+1} = -1 \quad (0/2)$$

مشتق‌های راست و چپ تابع هر دو متناهی ولی ناپایبرند. پس $x = -1$ نقطه گوشده‌ای تابع است. (0/2) (فصل ۴ / مشتق چپ و راست - نقاط مشتق‌نایابی)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ کافی است نشان دهیم: \blacksquare ۱۰

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) \quad (0/2)$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \times \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) = 0 \times f'(a) = 0 \quad (0/2)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = 0 \quad (0/2) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad (0/2)$$

(فصل ۵ / مشتق‌نایابی و پیوستگی)

$$\text{الف) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan(x + \frac{\pi}{3}) = \tan(\frac{\pi}{3})^+ = \infty \quad (0/2)$$

$$\text{ب) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2+x-1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{(x-1)^2} = \frac{2}{0^+} = +\infty \quad (0/2)$$

$$\text{ب) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(-3x^2 + 3x^3 - x^4) - 1 + x^4}{(x-1)^2} \quad (0/2)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{(x-1)^2} = 3 \quad (0/2)$$

(فصل ۳ / حدینهایت و حد درینهایت)

$$|x| - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \quad (0/2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x-1)}{x-1} = 3$$

(خط ۱ $x = 1$ مجانب قائم نیست.)

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3(x-1)}{-x-1} = \infty$$

(خط ۱ $x = -1$ مجانب قائم است.)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-3}{x-1} = 3 \quad (0/2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x-3}{-x-1} = -3 \quad (0/2)$$

(خطوط $y = 3$ و $y = -3$ مجانب‌های افقی تابع هستند.)

(فصل ۳ / مجانب قائم و افقی)

۱۲ باید مخرج صفر شود و چون فقط یک مجانب داریم، پس مخرج یک ریشه دارد، یعنی Δ مخرج صفر است (مخرج ریشه مضاعف ۲ دارد). (0/2)

$$x^2 + ax + b = (x-2)^2 \quad (0/2)$$

$$\Rightarrow x^2 + ax + b = x^2 - 4x + 4 \quad (0/2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = -4 \quad (0/2) \\ b = 4 \quad (0/2) \end{cases}$$

(فصل ۳ / مجانب قائم)

۱۳ اگر $k = 5$ باشد، جواب حد برابر $\frac{1}{2}$ است. (0/2)

اگر $k > 5$ باشد، جواب حد $+\infty$ یا $-\infty$ می‌شود. (0/2)

اگر $k < 5$ باشد، جواب حد صفر خواهد بود. (0/2)

امتحان ۵ - خرداد ماه ۱۳۹۸ (نوبت دوم)

۱ الف) نادرست. زیرا اگر $k > 1$ باشد، نمودار $y = f(kx)$ از انقباض افقی نمودار $y = f(x)$ در راستای محور x هابدست می‌آید. (فصل ۱ / انقباض و ابساط افقی) (0/2) ب) درست (فصل ۲ / تابع تازیان) (0/2)

ب) درست (فصل ۳ / حدینهایت) (0/2) ت) نادرست. شیب خط مماس در نقطه B مثبت و در نقطه A منفی است. (فصل ۴ / خط مماس بر منحنی) (0/2)

