

به نام خردی همراهان

مجموعه کتاب های
لیست پیک

رشته تجربی و ریاضی

پسرخواه

زمین شناسی

لیلی نظیف

مطابق با
جدیدترین
رویکرد
امتحانات
نهایی



مقدمه

«به نام خدای بلندآسمان خداوند خاک و خدای جهان»

علم زمین‌شناسی در نیم قرن اخیر، هم‌زمان با اثراتی که زندگی بشر بر کره زمین گذاشت، پیشرفت زیادی کرده است. زمین، این زیبایی بی‌همتا، با صبوری و گذشت، از حدود دو میلیون سال قبل هر آنچه انسان با منابع آبی، خاکی و ماورائی اش انجام داده را تاب آورده است؛ تا این‌که در سال‌های اخیر با فرونشست‌های پی‌درپی، استفاده نادرست از منابع آبی را فریاد زده، با گرمایش جهانی‌اش گازهای گلخانه‌ای را پس زده و با از بین بردن شکوفه‌های بهاری زیر برف‌های نابهنه‌نگام، تغییرات اقلیمی را تاب نیاورده ...

در سال‌های اخیر، بهره‌برداری بیش از اندازه از منابع و معادن، فرسایش روزافزون پسماندها و صدها مشکل زیست‌محیطی دیگر که با عدم درایت بشر روی کره زمین ایجاد شده، دلیلی بر گسترش علم زمین‌شناسی بوده است. امید است نه فقط متخصصان زمین بلکه همه‌ما در هر جایگاه و موقعیتی، از سکونتگاه اول و آخر خود، زمین، مراقبت کنیم.

ساختار بیست‌پنجم

این مجموعه شامل ۱ کتاب پرس‌و‌پرس و ۲ خلاصه کپسولی است.

۱ کتاب پرس‌و‌پرس

در نگارش این کتاب سعی کرده‌ایم فصل‌های پرحجم با موضوعات متفاوت را به بسته‌های کوچک آموزشی تقسیم کنیم تا شما سریع‌تر و راحت‌تر مطالب را یاد بگیرید. هر بسته دارای درسنامه‌ای کامل و طبقه‌بندی‌شده با وفاداری کامل به متن کتاب درسی و کاملاً منطبق با کتاب درسی جدید است.

در انتهای درسنامه هر بسته، انواع **تیپ‌های سوالات تشریحی** را آورده‌ایم. همچنین برخی از سوالات کنکورهای سراسری اخیر را هم گردآوری کرده‌ایم تا برای کنکور به شما دید مناسبی بدهد.

تعدادی از سوالات که با آیکون **+۲۰** آمده‌اند، ویژه دانش‌آموzan **سخت‌کوش** هستند، یعنی کسانی که برای گرفتن بالاترین نمره در امتحان نهایی تلاش می‌کنند.

در انتهای هر فصل، **خلاصه نموداری** آن را در حد یکی دو صفحه آورده‌ایم که برای مرور و جمع‌بندی مطالب هر فصل بسیار راه‌گشای شما خواهد بود.

۲ کاربرگ امتحانی

امتحان‌های فصل به فصل، نوبت اول و شبیه‌ساز نهایی و نهایی‌های برگزارشده اخیر، همه با فرمت برگه‌های امتحانی برایتان گردآوری شده به صورتی که می‌توانید به راحتی آن‌ها را جدا کنید و از خودتان امتحان بگیرید.

۳ خلاصه کپسولی

گزیده‌ای از محتوای بسیار مهم کتاب درسی را به صورت **آکاردئون** برایتان گردآوری کرده‌ایم تا قبل از امتحان با خیال راحت مطالب مهم را مرور کنید.

یادتون باشه خیلی‌ها فقط کتاب را آغاز می‌کنند... اما تو یک خواننده حرفه‌ای باش.

موفق و سریلنگ باشید.

فهرست

فصل اول:

آفرینش کیهان و تکوین زمین



فصل دوم:

منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه



پاسخنامه	سوالات امتحانی	درسنامه
۱۵۴	۸	۶
۱۵۴	۱۲	۱۰
۱۵۵	۱۶	۱۲
۱۵۶	۲۱	۱۹

فصل سوم:

منابع آب و خاک



پاسخنامه	سوالات امتحانی	درسنامه
۱۶۰	۵۰	۴۸
۱۶۱	۶۱	۵۲
۱۶۲	۵۹	۶۶

فصل ششم:

زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی



فصل پنجم:

زمین‌شناسی و سلامت

پاسخنامه	سوالات امتحانی	درسنامه
۱۶۸	۱۰۴	۱۰۱
۱۶۹	۱۱۱	۱۰۶

فصل هفتم:

زمین‌شناسی ایران



پاسخنامه	سوالات امتحانی	درسنامه
۱۷۳	۱۴۶	۱۳۸



فصل دو

منابع معدنی و ذخایرانرژی، زیربنای تمدن و توسعه

مشاوره: خب دوستان فصل دوم کتاب شاید کمی طولانی باشه؛ اما دوست داشتنی و قابل درکه، از مدل تمرکز عناصر روی زمین شروع میشه، چگونگی و ترتیب تبلور کانی های مختلف (سری واکنشی بیوون) رو بهمون توضیح میده، بعد یاد می گیریم معادن چطور تشکیل میشن؟ یعنی چطوری چند میلیون تن طلا متلاً یکجا تمرکز میشه و ما با حفاری و معدن کاری اون رو استخراج می کنیم (متلاً معدن طلا زرشوران تکاب حدود ۱۰۰ میلیون تن ذخیره طلا داره). مراحل استخراج معدن رو یاد می گیریم و... راستی این قسمت یه مسئله خیلی ساده داره، عیار ماده معدنی (همون ppm که در شیمی هم خوندید).

در بخش آخر هم ذخایر سوخت فسیلی (نفت و زغال سنگ) و مراحل پیدایش اونها رو یاد می‌گیریم. لازمه بگم تمام تصاویر بسیار مهمه؟ اما لازمه بگم سری واکنشی بیوون رو خوووب و با دقیقت در حد جویدن مطالعه کن خب! به توضیحات اضافی که برات گذاشت قشنگ توجه کن!

بارم سؤالات	تعداد سؤالات خرداد ۱۴۰۳	آدرس در کتاب درسی	مباحثی که می‌خوانید	
۰/۵	۱	صفحة ۲۲ تا ۲۸	منابع معدنی در زندگی ما / غلظت عناصر در پوسته زمین / کانی‌های سیلیکاتی / سری واکنشی بروون	بسته ۱
۰/۲۵	۱	صفحة ۲۸ تا ۳۷	کانه / کانسنگ / طبقه‌بندی کانسنگ‌ها / اکتشاف معدن / استخراج معدن و فراوری ماده معدنی	بسته ۲
۰/۲۵	۱	صفحة ۳۷ تا ۴۵	گوهرها، زیبایی شکفت‌انگیز دنیای کانی‌ها	بسته ۳
۰/۵	۱	صفحة ۴۵ تا ۵۹	سوخت‌های فسیلی (نفت و گاز و زغال سنگ) / علم، زندگی، کارآفرینی	بسته ۴

منابع معدنی

پستہ ۱



مقدمه: زیرینای اقتصادی کشورهای مختلف متنوع است. مبنای اقتصادی برخی کشورها، صنعت، کشاورزی، گردشگری و برخی دیگر منابع و ذخایر معدنی است.

رقت‌کنیه: مبنای اقتصادی در کشور عزیز ما ایران بر پایه ۱- خدمات (۴۵ درصد) ۲- نفت (۲۵ درصد) ۳- صنعت (۲۰ درصد) و ۴- کشاورزی (۱۰ درصد) است.

- منابع فلزی: آهن، مس، طلا و...
 - منابع غیرفلزی: زغال‌سنگ، رسن و...
 - مواد نفتی
 - فراورده‌های پتروشیمیایی: پلاستیک، چسب و ...

منابع معدنی، بس، از شناسایی، توسط زمین‌شناسان، از معادن استخراج و بس، از فراوری به کالاهای مورد نیاز تبدیل، می‌شوند.

● مثال‌های از کاربرد مواد معدنی در زندگی روزمره:

فلوئور	گرافیت	پلاتین	آهن	مس	ماده معدنی
خمیردندان	نوك مداد	گوشی تلفن همراه	ریل راه آهن	کابل برق	کاربرد



غلظت عناصر در پوسته زمین

پوسته زمین دارای ۲ نوع سنگ آذرین 1 دگرگونی و 2 رسوبی است؛ اما ترکیب میانگین پوسته همان ترکیب میانگین سنگ‌های آذرین است.

توضیح: زیرا مقدار کل سنگ‌های رسوبی و دگرگونی نسبت به سنگ‌های آذرین ناچیز است.

تعریف: غلظت کلارک: میانگین درصد وزنی عناصر سازنده پوسته زمین

غلظت کلارک توسط دو زمین‌شناس به نام‌های کلارک و واشنگتن در سال ۱۹۲۴ تعیین شد.

این دو دانشمند بر مبنای تجزیه نمونه‌های فراوانی که از سراسر دنیا جمع شده بود، غلظت کلارک را ارائه کردند.

عنصر	میانگین درصد وزنی در پوسته	عنصر	میانگین درصد وزنی در پوسته
منیزیم	۴۵/۲۰	اکسیژن	۱/۶۸
تیتانیم	۲۷/۲۰	سیلیسیم	۰/۴۴
فسفر	۸/۰۰	آلومینیم	۰/۱۲
منگنز	۵/۸۰	آهن	۰/۱۰
روی	۳/۶۳	کلسیم	۰/۰۰۷
مس	۲/۷۷	سدیم	۰/۰۰۶
سرب	۲/۳۲	پتاسیم	۰/۰۰۱۶

تعریف: نسبت تمرکز یک عنصر در یک کانی یا سنگ به فراوانی آن در پوسته زمین را کلارک تمرکز می‌گوییم.

روش محاسبه کلارک تمرکز:

$$\text{مقدار تمرکز یک عنصر در منطقه} = \frac{\text{غلظت کلارک عنصر}}{\text{کلارک تمرکز}}$$

سؤال مقدار آهن در منطقه‌ای ۱۲ درصد وزنی سنگ‌های یک منطقه است، غلظت کلارک آهن نیز $۸/۵$ درصد است، کلارک تمرکز در سنگ‌های منطقه را محاسبه کنید.

$$\text{کلارک تمرکز آهن در منطقه} \Rightarrow \frac{۱۲}{۵/۸} \simeq ۰/۰۷ = \frac{\text{مقدار تمرکز یک عنصر در منطقه}}{\text{غلظت کلارک عنصر}} = \text{کلارک تمرکز}$$

پاسخ

بی‌亨جاري

اگر در منطقه‌ای، تمرکز عنصری در سنگ، خاک، آب و گیاهان بالاتر یا پایین‌تر از میانگین آن در پوسته زمین باشد، به آن بی‌亨جاري می‌گوییم.

بی‌亨جاري مثبت: در صورتی که تمرکز عنصری در یک منطقه بالاتر از غلظت کلارک باشد، آن عنصر بی‌亨جاري مثبت دارد.

بی‌亨جاري منفی: در صورتی که تمرکز عنصری در یک منطقه پایین‌تر از غلظت کلارک باشد، آن عنصر بی‌亨جاري منفی دارد.

نکته: زمین‌شناسان در پی جویی‌های اکتشافی عناصر به دنبال یافتن مناطقی با بی‌亨جاري مثبت هستند.

صفحة ۲۵ کتاب درسی

نتایج حاصل از تجزیه سنگ‌های یک منطقه در جدول ارائه شده است، در کدام عنصر بی‌亨جاري مثبت و در کدام بی‌亨جاري منفی دیده می‌شود؟

فعالیت
تکمیلی

پاسخ

عنصر	درصد بر اساس جرم	غلظت کلارک	کلارک تمرکز	بی‌亨جاري
Fe	۱۲	۵/۸	$۱۲ \div ۵/۸ \simeq ۲/۰۷$	مثبت
Cu	۰/۰۰۰۷	۰/۰۰۶	$۰/۰۰۷ \div ۰/۰۰۶ \simeq ۰/۱۱$	منفی
Pb	۰/۰۱	۰/۰۰۱۶	$۰/۰۱ \div ۰/۰۰۱۶ = ۶/۲۵$	مثبت
Zn	۰/۰۰۰۹	۰/۰۰۷	$۰/۰۰۷ \div ۰/۰۰۰۹ \simeq ۰/۱۲$	منفی

نکته: در صورتی که کلارک تمرکز عنصری بیشتر از یک باشد، بی‌亨جاري مثبت و در غیر این صورت بی‌亨جاري، منفی خواهد بود.



کانی‌های سیلیکاتی

کانی‌ها بر اساس ترکیب شیمیایی به دو گروه سیلیکات و غیرسیلیکات رده‌بندی می‌شوند.

غیرسیلیکات‌ها	سیلیکات‌ها
درصد خیلی کمتری نسبت به سیلیکات‌ها در پوسته هستند.	بیش از ۹۰ درصد حجم پوسته را تشکیل می‌دهند.
فاقد بنیان (SiO_4^{4-}) هستند.	در ترکیب خود بنیان (SiO_4^{4-}) دارند.
در انواع سنگ‌های آذرین، رسوبی، دگرگونی یافت می‌شوند.	در انواع سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی یافت می‌شوند.
مانند: اکسیدها، سولفیدها، سولفات‌ها، کلریدها، فسفات‌ها و عناصر آزاد	مانند: الیوین، پیروکسن، آمفیبول، بیوتیت، فلدسپار پتاسیم، مسکوویت، کوارتز و فلدسپار پلازیوکلاز

نکته: سیلیکات‌ها دارای بنیان سیلیکاتی (SiO_4^{4-}) هستند، در واقع از اتصال این هرم‌ها در آشكال مختلف سیلیکات‌ها تشکیل می‌شوند.

رقت‌کننده: کانی‌ها در طبیعت به صورت خنثی یافت می‌شوند، در واقع بنیان سیلیکات‌ها با چهار بار منفی با چهار بار مثبت خنثی خواهند شد.



پاسخ گزینه «۴»

از آن جا که سیلیکات‌ها در نهایت باز خنثی دارند، باید جمع بار تمام عناصر در نهایت صفر شود.

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Al}_x & \text{Si}_2 & \text{O}_5 & \text{x} & & & \\ (+3 \times 2) + (+4 \times 2) + (-2 \times 5) + x = 0 & \Rightarrow 6 + 8 - 10 + x = 0 & \Rightarrow 4 + x = 0 & \Rightarrow x = -4 & & & \end{array}$$

سری واکنشی بوون

نورمن لوی بوون کانادایی (۱۸۸۷-۱۹۵۶) بزرگ‌ترین سنگ‌شناس قرن بیستم از مهم‌ترین پیشگامان علم پترولوزی بوده است. بوون با ارائه سری واکنشی بوون ترتیب تبلور کانی‌های رایج در سنگ‌های آذرین را نشان داد.

نکات سری واکنشی بوون

- در اعمق زمین ترکیب شیمیایی مagmaها متفاوت است زیرا هر کانی دمای ذوب و تبلور مخصوص خود را دارد، وقتی سنگی ذوب می‌شود با توجه به دما و درجه ذوب شدگی، برخی کانی‌ها زودتر و برخی دیرتر به وجود می‌آیند.
- هنگام سردشدن magma و تشکیل کانی‌ها اتفاق ممکن است برای کانی‌ها بیفتد: کانی متبلور شده از magma جدا و وارد ترکیب سنگ شود.
- کانی با magma در تعادل بماند و ضمن واکنش با magma بلورهای جدید بسازد.
- به عقیده بوون بیشتر magmaها ترکیب بازالتی دارند، یعنی Fe و Mg بالا؛ ولی SiO_2 کم دارند.

ترتیب تبلور کانی‌ها در magma‌ای بازالتی (طبق سری واکنشی بوون)

۱ در سری ناپیوسته: ۱ الیوین ۲ پیروکسن ۳ آمفیبول ۴ بیوتیت ۵ فلدسپار پتاسیم ۶ مسکوویت ۷ کوارتز

دما بالا حدود 1300°C دما پایین حدود 700°C

۲ در سری پیوسته: ۱ فلدسپار پلازیوکلاز کلسیم دار ۲ فلدسپار پلازیوکلاز کلسیم و سدیم دار ۳ فلدسپار پلازیوکلاز سدیم دار

دما بالا حدود 1300°C دما پایین حدود 700°C



نکته: اگر اولین بلورهای تشکیل شده در مagma باقی بمانند و با مذاب باقی مانده واکنش بدهند، کانی دمای پایین تر خود را به وجود می آورند.

تعریف: توالی تشکیل کانی ها را سری واکنشی بوون می گوییم.

پیروکسن → مایع مذاب باقی مانده + الیوین

آمفیبول → مایع مذاب باقی مانده + پیروکسن

بیوتیت → مایع مذاب باقی مانده + آمفیبول

■ در روند سردشدن magma ترکیب magma از آهن، منیزیم و کلسیم بالا به ماده مذاب غنی از سدیم، پتاسیم و مقدار سیلیس بالاتغییر می یابد.

در صورتی که بلورهای اولیه از magma جدا شوند (مثلثه اتفاق magma تهشیش شوند) و با مذاب باقی مانده واکنش ندهند، سنگ های مختلف شکل می گیرند و طبق جدول زیر ۴ سری سنگ به وجود می آید.

دما	سری های واکنشی بوون	نوع سنگ آذرین		کانی های تشکیل دهنده
		دروونی	بیرونی	
بالاترین دما ۱۳۰۰°C	الیوین Fe, Mg پیروکسن آمفیبول بیوتیت فلدسبار پتاسیم (Si,Ca,Na,K,Al) مسکوویت کوارتز	کلسیم زیاد فلدسبار های پلازیو کلاز سدیم زیاد	پریدوتیت بازالت آندریت دیوریت ریولیت	الیوین + کمی پیروکسن + فلدسبار پلازیو کلاز کلسیم زیاد الیوین + پیروکسن + کمی آمفیبول + فلدسبار پلازیو کلاز کلسیم زیاد کمی پیروکسن + آمفیبول + بیوتیت + فلدسبار پلازیو کلاز کلسیم و سدیم دار کمی بیوتیت + فلدسبار پتاسیم + مسکوویت + کوارتز + فلدسبار پلازیو کلاز سدیم زیاد
پایین ترین دما 700°C				(Bowen)

تصویر شماتیک سری های واکنشی بوون (Bowen)

نکته: ۱ طبق نظر بوون، نخستین کانی های حاصل از سردشدن magma، پلازیو کلاز کلسیم دار و الیوین هستند که از تجمع این دو کانی همراه با مقداری پیروکسن، سنگ بازالت یا معادل درونی آن، گابریو به وجود می آید.

۲ آخرین کانی های حاصل از سردشدن magma مسکویت، کوارتز و فلدسبات پلازیو کلاز سدیم زیاد است.

توجه: قبل از این که وارد سوالات تستی، تشریحی و... بشیم، من یه سری سوال با پاسخ کوتاه برات می ذارم؛ اما سعی کن جواب سوالات رو حتماً خودت از جدول بالا پیدا کنی تا دستت راه بیفته.

تمرین: به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- کدام سنگ آذرین درون زمین و در بالاترین دما تشکیل می شود؟
- ۲- فلدسبار پلازیو کلاز گرانیت از چه نوع است؟
- ۳- معادل بیرونی سنگ آذرین دیوریت کدام است؟
- ۴- ترکیب کانی شناسی سنگ گرانیت کدام است؟
- ۵- کانی دما پایین تر از پیروکسن و دما بالاتر از بیوتیت کدام است؟
- ۶- به ترتیب کدام سیلیکات ها در بالاترین دما و کدام در پایین ترین دما متبلور می شوند؟
- ۷- کانی های سازنده دیوریت را نام ببرید.
- ۸- وجود کانی (آمفیبول - بیوتیت) در ریولیت ها تقریباً غیرممکن است.
- ۹- کدام سنگ آذرین بیرونی بالاترین مقدار فلدسبار پلازیو کلاز سدیم دار را دارد؟
- ۱۰- سنگ گرانیت را به آرامی ذوب می کنیم، کدام کانی، اول از همه ذوب می شود؟
- ۱۱- سنگ گرانیت را به آرامی ذوب می کنیم، کدام کانی دیرتر از همه ذوب می شود.



پاسخ ۱- پریدوتیت

۲- سدیم‌دار

۳- آندزیت

۴- کمی بیوتیت + فلدسپار پاتاسیم + مسکوویت + کوارتز + فلدسپار پلازیوکلاز سدیم‌دار

۵- آمفیبول

۶- بالاترین دما ← الیوین

۷- کمی پیروکسن + آمفیبول + بیوتیت + فلدسپار پلازیوکلاز سدیم و کلسیم‌دار

۸- آمفیبول

۹- ریولیت

۱۰- کوارتز و فلدسپار پلازیوکلاز سدیم‌دار


۱۱- بیوتیت

توضیح: وقتی گرانیت رو آروم آروم گرم کنیم، در دمای ۷۰۰ درجه بهتریب ۱- کوارتز ۲- مسکوویت ۳- فلدسپار پاتاسیم و در آخر هم بیوتیت ذوب میشے، چون بیوتیت به دمای بیشتری نیاز داره تا ذوب بشه.

سوالات امتحان

سوالات درست و نادرست

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.



۱۳۴. ترکیب میانگین پوسته زمین در اصل میانگینی از ترکیب سه دسته سنگ رسوبی، آذرین و دگرگونی است.

۱۳۵. سیلیسیم فراون‌ترین عنصر غیرگازی روی پوسته زمین است. +۲۰

۱۳۶. غیرسیلیکات‌ها کمتر از ۱۰ درصد کانی‌های پوسته زمین را شامل می‌شوند.

۱۳۷. ماقماهایی با ترکیب بازالتی، سیلیسیم نسبتاً کمی دارند. +۲۰

۱۳۸. مسکوویت در دمای کمتری نسبت به کوارتز متبلور می‌شود.

۱۳۹. معادل درونی سنگ آذرین دیوریت، ریولیت است که پلازیوکلاز آن از نوع سدیم‌دار است.

۱۴۰. در صورتی که آمفیبول با مایع مذاب باقی‌مانده در آتافک ماقماهی واکنش دهد، بیوتیت تشکیل می‌شود.

۱۴۱. کماتیت نوعی سنگ آذرین بیرونی دارای الیوین و پلازیوکلاز کلسیم‌دار است. +۲۰

۱۴۲. طی تبلور کانی‌های سیلیکات‌های ابتدای کانی‌های حاوی آهن و منیزیم در دمای بالاتر متبلور می‌شوند.

۱۴۳. اکسیژن فراوان‌ترین عنصر در ترکیب شیمیایی کره زمین است.

سوالات جای خالی

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱۴۴. از _____ در ساخت گوشی تلفن همراه استفاده می‌شود.

۱۴۵. در صورت واکنش الیوین با مایع مذاب باقی‌مانده، کانی _____ به وجود می‌آید.

۱۴۶. معادل درونی سنگ آندزیت، _____ نام دارد.

۱۴۷. فلدسپار پلازیوکلاز در گابرو از نوع _____ است. +۲۰

۱۴۸. آخرین کانی در سری واکنشی بروون که در دمای حدود ۷۰۰ درجه متبلور می‌شود _____ نام دارد.



سؤالات انتخاب کلمه

کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

۱۴۹. (پریدوتیت / آندزیت) نوعی سنگ آذرین درونی با محتوای کانی‌های آهن و منیزیم‌دار بالا است.

۱۵۰+۲۰. در سری واکنشی بونه دمای تشکیل (پیروکسن / بیوتیت) از آمفیبول پایین تر است.

۱۵۱. در سنگ (دیوریت / گرانیت) مقدار عنصر کلسیم و سدیم در پلازیوکلاز تقریباً برابر است.

سؤالات چهارگزینه‌ای

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱۵۲. براساس نظریه بونه آخرین سنگی که از یک ماغما بازالتی تشکیل می‌شود، کدام است؟

- (۱) پریدوتیت (۲) آندزیت (۳) گرانیت (۴) دیوریت

۱۵۳. کدام سنگ حاصل تجمع نخستین کانی‌هایی است که از سردشدن ماده مذاب درون زمین به وجود می‌آید؟

- (۱) گابریو (۲) دیوریت (۳) گرانیت (۴) پریدوتیت

۱۵۴+۲۰. سنگ درشت بلوری که دارای کوارتز، فلدسپار پتاسیم‌دار و مسکوویت است، چه نام دارد؟

- (۱) ریولیت (۲) بازالت (۳) گابریو (۴) گرانیت

۱۵۵. با توجه به نظریه بونه وجود سنگی با محتوای کانی‌شناسی تقریباً غیرممکن است.

(۱) الیوین + پیروکسن + فلدسپار پلازیوکلاز کلسیم‌دار

(۲) پیروکسن + بیوتیت + مسکوویت + فلدسپار پلازیوکلاز سدیم‌دار

(۳) فلدسپار پتاسیم + مسکوویت + کوارتز + فلدسپار پلازیوکلاز سدیم‌دار

(۴) پیروکسن + آمفیبول + فلدسپار پلازیوکلاز کلسیم‌دار

۱۵۶+۲۰. کدام کانی مقدار آهن و منیزیم بیشتری در ترکیب خود دارد و زمان تبلور آن طولانی تر است؟

- (۱) گابریو (۲) ریولیت (۳) گرانیت (۴) کماتئیت

کامل کنید

۱۵۷. با کلمات مناسب جدول زیر را کامل کنید.

محتوای کانی‌شناسی	نوع سنگ آذرین	
	درونی	بیرونی
کمی پیروکسن + آمفیبول + بیوتیت + (ب)	(الف)	دیوریت
کمی بیوتیت + فلدسپار پتاسیم + (ت) + کوارتز + (ت)	ریولیت	(پ)

سؤالات تشریحی

۱۵۸. به عقیده بونه «بیشتر ماغماها ترکیب بازالتی دارند.»، این ماغماهای اولیه حاوی چه عناصری می‌باشد؟

۱۵۹. دو عامل مؤثر بر تشکیل ماغماها با ترکیبات متفاوت چیست؟

سؤالات کوتاه پاسخ

۱۶۰. به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) نخستین کانی‌هایی که از سردشدن ماغما به وجود می‌آیند، چه نام دارند؟

ب) این کانی‌ها کدام سنگ‌ها را می‌سازند؟

۱۶۱. پس از تبلور گابریو و بازالت ماغماهای باقی‌مانده از چه عناصری غنی خواهد بود؟

تعریف اصطلاح

۱۶۲. اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) غلظت کلارک

ت) بی‌亨جاري منفی

پ) سری واکنشی بونه

ب) کلارک تمرکز





خلاصه نموداری فصل ۲

منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه

منابع معدنی در زندگی ما: منابع معدنی توسط زمین‌شناسان **۱** شناسایی، **۲** استخراج و **۳** فراوری می‌شوند و در زندگی روزمره استفاده می‌شوند.

غلظت کلارک: میانگین درصد وزنی عناصر سازنده پوسته زمین

مغبیت، شرایطی که مقدار عنصر در منطقه‌ای بالاتر از غلظت کلارک باشد.

بی‌هنگاری منفی، شرایطی که مقدار عنصر در منطقه‌ای پایین‌تر از غلظت کلارک باشد.

سیلیکاتی: دارای بنیان (SiO_4^{4-})، بیش از ۹۰ درصد پوسته را می‌سازند.

غیرسیلیکاتی: فاقد بنیان (SiO_4^{4-})، درصد بسیار کمی از پوسته را می‌سازند.

غلظت عناصر در پوسته زمین

سری واکنشی بوون

توالی تشکیل کانی‌های سیلیکاتی را بیان می‌کند.

سری ناپیوسته: **۱** الیوین **۲** پیروکسن **۳** آمفیبول **۴** بیوتیت **۵** فلدسپار پتاسیم **۶** مسکوویت **۷** کوارتز

سری پیوسته: **۱** فلدسپار پلازیوکلاز کلسیم و سدیم دار **۲** فلدسپار پلازیوکلاز سدیم دار

کانسنگ (سنگ معدن) شامل **۲** بخش **۱** کانه (کانی که دارای فلز ارزشمندی است). **۲** باطله (بخشی که ارزش اقتصادی چندانی ندارد).

انواع کانسنگ‌ها از نظر منشأ و نحوه تشکیل

کانسنگ ماقعای برخی به علت چگالی بالاکف اتاق ماقما متتمرکز می‌شوند. مانند: کروم، نیکل، پلاتین و آهن

در مراحل آخر تبلور ماقما به علت فراوانی آب و مواد فرار تشکیل کانسارهای درشت بلور مانند: پگماتیت‌های حاوی بریل،

لیتیم، سزیم و مسکوویت

کانسنگ گرهایی: آب‌های گرم زیرزمین رگه‌های معدنی مس، سرب، روی، طلا، قلع و مولیبدن را در شکاف‌های ته‌نشین می‌کنند.

کانسنگ رسوبی: فرسایش سنگ‌های رسوبی و آزادشدن کانی‌های مقاوم و چگال سپس انتقال آن‌ها توسط آب و ته‌نشینی در رودخانه‌ها در نهایت تشکیل کانسارهای پلاسربی مانند کانسنگ آهن نواری و ذخایر پلاسربی طلا و پلاتین

مراحل اکتشاف معدن: **۱** بی‌جوبی **۲** حفاری تا عمقی که ماده معدنی ادامه دارد. **۳** آزمایشگاه (مطالعه با میکروسکوپ) **۴** تحلیل با نرم افزار

استخراج معدن: بر اساس **۱** شکل **۲** چگونگی فرارگیری **۳** عمق فرارگیری و **۴** نوع ماده معدنی ← دو نوع معدن روباز و زیرزمینی

گوهرها: **۱** ویژگی گوهرها، **۲** زیبایی **۳** کمیاب بودن **۴** رنگ **۵** درخشش **۶** سختی (مهمنترین ویژگی گوهرها ← سختی)

انواع گوهرها: **۱** کریزوبریل ← درخشندگی چشم گریه **۲** آپال ← درخشش رنگین کمانی **۳** الکساندریت ← تغییر رنگ زیر نور **۴** الماس

← سختی **۵**، ترکیب کرین خالص، تشکیل در گوشه (در دما و فشار بالا) **۶** یاقوت ← نام علمی کرندوم، ترکیب شیمیایی اکسید آلومینیم،

سختی **۷** زمرد ← سیلیکات بریلیم، گران‌ترین نوع بریل **۸** گارنت ← دارای رنگ‌های مختلف، در سنگ‌های دگرگونی، گارنت قرمز تیره،

فراوان‌ترین نوع آن، گارنت سبز با غ بر جریان شهرت جهانی دارد. **۹** عقیق ← نوعی گوهر سیلیسی (SiO_2) **۱۰** زبرجد ← نوع شفاف و

قیمتی الیوین، رنگ سبز زیتونی **۱۱** فیروزه ← ترکیب فسفاتی، با نام تجاری تورکواریز، فیروزه نیشاپور شهرت جهانی دارد.

سوختهای فسیلی



انواع زغال سنگ: **۱** تورب **۲** لیگنیت **۳** بیتومینه **۴** آنتراسیت

از تورب تا آنتراسیت: **۱** کاهش آب و مواد فردار **۲** افزایش درصد کرین **۳** افزایش توان تولید انرژی

علم، زندگی، کارآفرینی

سنگ‌شناصی (پترولوزی) ← شیوه تشکیل، منشأ و رده‌بندی سنگ‌های آذرین و دگرگونی را بررسی می‌کند.

زمین‌شناصی اقتصادی ← با بهره‌گیری از اصول زمین‌شناصی به دنبال ذخایر ارزشمند معدنی است.

زمین‌شناصی نفت ← چگونگی تشکیل، مهاجرت، انباشته شدن و استخراج نفت را مطالعه و بررسی می‌کند.

ژئوشیمی ← با مطالعه روی ترکیب سیارات و زمین به شناخت عناصر و چگونگی تشکیل آن‌ها می‌پردازد.

بخش دوم

پاسخ نامہ



پاسخ فصل اول

۲۲. **الف** نخستین حالت ماده **ب** پلاسما / **ب** نخستین حالت گاز
ا تم هیدروژن / **ب** نخستین حالت جامد **ا** برهایی از غبار
۲۳. نخستین جامدات در جهان به صورت ابرهایی از غبار به همراه گازهای مختلف در اشکالی بسیار متنوع تجمع یافته و سحابی‌ها را تشکیل دادند.
۲۴. **الف** نوعی از امواج تابشی ضعیف که شدت آن در همه جهات یکسان است. / **ب** انفجار بزرگ (مهبانگ)
۲۵. تصویر ۱ **کندرون‌های آزاد، داغ و شناور**
تصویر ۲ **تشکیل سیارک‌ها**
۲۶. نخستین کانی‌های متبلور شده به همراه سولفیدهای آهن و نیکل در شکل گلوله‌های کوچک، کندرون‌ها را ساختند.
۲۷. **۱** اندازه و وزن بالای آنها **۲** ترکیب معدنی (مانند محتوای طلا، پلاتین، الماس و ...). **۳** زیبایی ظاهری مانند رنگ و ... **۴** منشأ پیدایش شهاب‌سنگ (مثلًاً از ماه یا مریخ آمده باشد).
۲۸. **الف** واکنش زنجیری / **ب** توزیع / **ب** سردشدن / **ت** غبار
سحابی عقاب
۲۹. پس از تشکیل زمین قطعاتی از کندریت‌ها در مسیر برخورد با زمین قرار گرفتند، هر گاه بقایایی از این اجرام هنگام عبور از هواکره منهدم نشوند و به سطح زمین برستند، شهاب‌سنگ نامیده می‌شوند.
۳۰. **الف** پلاسما: حالتی از ماده که در آن هسته‌های اتمی که از ذرات بنیادی شکل گرفته‌اند، در دریایی از الکترون‌های آزاد شناور هستند.
- ب** کندریت: اجرام حاصل از تجمع کندرون‌ها با هم برخورد کرده و مجددآذوب شده و پس از آن متبلور می‌شوند و کانی‌های مختلفی را می‌سازند. اجرام تشکیل شده از کندرون‌ها را کندریت می‌نامیم.
- درست** ۳۲
۳۱. **نادرست** قطر کهکشان راه شیری صدهزار سال نوری است.
۳۲. **نادرست** حدود ۴ میلیارد سال قبل سنگ‌های آذرین به عنوان نخستین اجزای سنگ‌کرده تشکیل شدند.
- درست** ۳۵
۳۳. **نادرست** بشرتاکنون موفق به عکس برداری از کل کهکشان راه شیری نشده است.
- درست** ۳۷
۳۴. **نادرست** بیشتر شواهد و مدارک برای مطالعه گذشته زمین در سنگ‌های رسوبی یافت می‌شود.
۳۹. ۶ میلیارد - سامانه خورشیدی **۴۴**. مذاب **۴۴**. مذاب
۴۵. زیستکره **۴۰**. چرخه آب
۴۱. نیروی گرانشی متنقابل **۴۶**. ده هزار
۴۲. مارپیچی **۴۷**. فوران آتشفسان‌های متعدد
۴۳. **۴۲** / ۸ دقیقه نوری
۴۹. **گزینه ۳** ابتدا سنگ‌های آذرین، سنگ‌کرده را به وجود آورند. سپس با به وجود آمدن چرخه آب و فرسایش سنگ‌ها، رسوبات و سنگ‌های رسوبی تشکیل شدند. در ادامه با حرکت ورقه‌های سنگ‌کرده و افزایش دما و فشار، سنگ‌های دگرگونی پدید آمدند.
۵۰. **گزینه ۱** می‌دانیم که سرعت نور در خلا برابر 3×10^8 km است و طبق داده‌های سؤال، فاصله زمین تا خورشید هم برابر 1.5×10^8 km در نظر گرفته شده است می‌توان محاسبه کرد:

$$v = 300000 \text{ km/s}$$

$$x = 1/5 \times 10^8 \text{ km} = 150 \times 10^6 \text{ km}$$

۱. درست

۲. درست

۳. **نادرست** مهبانگ دوره‌ای است که در آن جهان وارد یک دوره گسترش بسیار شدید شد.

۴. **نادرست** دومین گاز در جهان بعد از هیدروژن، هلیوم به وجود آمد.

۵. درست

۶. ذرات بنیادی

۷. هیدروژن

۸. پلاسما

۱۱. تایید

۱۲. کاهش

۱۳. آهن و نیکل

۱۴. آفرینش

۱۵. یکسان

۹. سولفیدهای آهن

۱۰. شهاب‌سنگ‌ها

۱۶. گزینه ۴ با تشکیل عناصر، توزیع و سردشدن آن‌ها در جهان، نخستین جامدات به وجود آمدند.


نخستین جامدات به صورت ابرهایی از غبار شکل گرفتند. ابرهایی از غبار (نخستین جامدات) به همراه گازهای مختلف در اشکال مختلف تجمع یافته و سحابی‌ها را ساختند.

بررسی علت نادرستی گزینه ۴: نخستین کانی‌هایی متبلور شده به همراه سولفیدهای آهن و نیکل در شکل گلوله‌های کوچکی به نام کندرون تجمع یافتند.

۱۷. گزینه ۱ پس از آن که دما آن چنان افت کرد که برای به دام افتادن الکترون‌ها در مدار پیرامون هسته‌های اتم کافی شد، نخستین اتم یعنی هیدروژن به وجود آمد.

۱۸. گزینه ۱ **الف** قطره‌های مذاب / **ب** تبلور کانی‌ها و کندرون‌ها

قطره‌های مذاب



طرحی از چگونگی شکل‌گیری کندرون‌ها

۱۹. گزینه ۱ شهاب‌سنگ‌ها به ۲ دلیل مهم برای ما انسان‌ها مهم هستند، با مطالعه آن‌ها می‌توانیم **۱** به ترکیب شیمیایی بخش‌های غیرقابل دسترس زمین و همچنین دیگر سیارات و **۲** سن زمین، سامانه خورشیدی و کهکشان راه شیری پی‌بریم.

۲۰. گزینه ۲ در موضوع تشکیل عناصر تا تشکیل زمین می‌توان به صورت خلاصه ترتیب پیدایش هر بخش را به این صورت بیان کرد:

۱ حالت پلاسما **۲** نخستین اتم (H) **۳** سحابی‌ها

۴ نخستین کانی‌ها **۵** کندرون‌ها **۶** کندریت‌ها **۷** سیاره‌زمین

۸ شهاب‌سنگ‌ها

۹ **۱۰** ۳/۸ **۱۱** ۱۳/۸

۴. حالت از **فقط صورتی از انرژی (یک صورت)**

انقباض **گسترش**