


زیست‌شناسی (۱)

از آنجاکه در درس زیست‌شناسی، اساساً بودجه‌بندی خاص وجود ندارد! با این حال می‌دانیم که انتظار شما از مهروماه بالاست و شما من خواهید بدانید کدام فصل‌ها اهمیت بیشتری دارند

در کنکور سراسری ۱۴۰۰، از کتاب زیست دهم ۱۵ سؤال طرح شده است که در آن، اهمیت فصل‌های گوارش و گردش مواد بیشتر از سایر فصل‌ها است. این را هم به خاطر داشته باشید که مطالب گیاهی در کنکور اهمیت فوق العاده‌ای دارند؛ چون اولاً شما این مطالب را زیاد دوست ندارید، دوماً طراحان محترم کنکور، فصل‌های پایانی کتاب را بیشتر دوست دارند!





۲ مشاوره سطوح سازمان یابی حیات، از بنیادی ترین مطالب زیست‌شناسی به شمار می‌رود. درک درست این بخش، می‌تواند در پاسخگویی تست‌های سایر فصل‌ها به شما کمک کند.



سطح سازمان یابی حیات

یاخته: پایین‌ترین سطح سازمان یابی حیات است. همه جانداران از یاخته تشکیل شده‌اند.

▪ بعضی جانداران تک یاخته‌ای هستند و بعضی دیگر، از تعدادی یاخته تشکیل شده‌اند.

بافت: تعدادی یاخته، یک بافت را به وجود می‌آورند. اندام: از چندین بافت مختلف تشکیل شده است.

دستگاه: از چندین اندام تشکیل شده است. فرد: جانداری مانند گوزن، فردی از جمعیت گوزن‌هاست.

جمعیت: افراد یک گونه که در زمان و مکانی خاص زندگی می‌کنند، یک جمعیت را به وجود می‌آورند.

اجتماع: جمعیت‌های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک اجتماع را به وجود می‌آورند.

بوم‌سازگان: عوامل زنده (اجتماع) و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می‌گذارند، بوم‌سازگان را می‌سازند.

زیست‌بوم: از چند بوم‌سازگان تشکیل می‌شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکندگی جانداران مشابه‌اند.

زیست‌کره: شامل همه زیست‌بوم‌های زمین است.

نکات مهم

۱ اجزای عملکردی یاخته‌ها، اندامک‌ها هستند اما واحد عملکردی همه جانداران، یاخته است.

۲ دنای یاخته‌های یوکاریوتی در هسته، راکیزه و دیسه قرار دارد.

۳ بعضی از یاخته‌های یوکاریوتی، هسته و اندامک غشادار ندارند (مانند گویچه‌های قرمز بالغ در انسان). بدیهی است که این یاخته‌ها دنا نیز ندارند. یاخته‌های سازنده آوندهای آبکش گیاهان نیز هسته خود را از دست داده‌اند.

۴ نمی‌توان گفت که هر یاخته، همه ویژگی‌های حیات را دارد! مثلاً یک یاخته ممکن است توانایی تولیدمثل نداشته باشد.

۵ بعضی از جانداران، تک یاخته‌ای هستند. بنابراین بافت، اندام و دستگاه ندارند.

جمع‌بندی پلاس گروه‌بندی کلی جانداران


| همگی تک یاخته‌ای | باکتری‌ها | پروکاریوت‌ها | جانداران |
|--------------------------------------|---|--------------|----------|
| دارای انواع تک یاخته‌ای و پریاخته‌ای | آغازیان قارچ‌ها گیاهان جانوران | یوکاریوت‌ها | |
| همگی پریاخته‌ای | | | |



- ساختار فسفولیپیدها شبیه تری‌گلیسریدهاست، با این تفاوت که در فسفولیپیدها، مولکول گلیسرول به دو اسید چرب و یک گروه فسفات متصل شده است.
- فسفولیپیدها یکی از ترکیبات سازنده صفرا هستند و به گوارش چربی‌ها کمک می‌کنند.
- کلسترول در ساختار غشای یاخته‌های جانوری و نیز انواعی از هورمون‌ها شرکت می‌کند.
- LDL و HDL لیپوپروتئین‌هایی هستند که در ساختار آن‌ها کلسترول وجود دارد. در LDL مقدار کلسترول بیشتر از پروتئین است؛ در حالی که HDL پروتئین بیشتری دارد.
- اگر نسبت LDL به HDL بیشتر باشد، احتمال رسوب کلسترول در دیواره سرخرگ‌ها افزایش می‌یابد که منجر به سخت‌شدن رگ‌ها (تصلب شرائین) می‌شود و یکی از دلایل بروز سکته قلبی است.
- یاخته‌های روپوست در اندام‌های هوایی گیاه با ترشح ترکیبات لیپیدی، لایه‌ای به نام پوستک را در سطح خود می‌سازند که نقش محافظتی دارد. پوستک از خروج بخار آب، ورود نیش حشرات، سرما و عوامل بیماری‌زا جلوگیری می‌کند.
- چوب‌پنه (سوبرین) از ترکیبات لیپیدی است که توسط بعضی از یاخته‌های گیاهی تولید می‌شود و نسبت به آب نفوذناپذیر است.

پروتئین‌ها

- علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن نیز دارند و از بهم پیوستن واحدهای به نام آمینواسید تشکیل می‌شوند.
- برای ساخت پروتئین، رناتن (ریبوزوم) آمینواسیدها را به یکدیگر متصل می‌کند. اتصال آمینواسیدها از طریق واکنش سنتز آبدھی و با نوعی پیوند اشتراکی به نام پیوند پپتیدی انجام می‌شود.



- بعضی پروتئین‌ها از یک رشته پلی‌پپتیدی و بعضی دیگر از آن‌ها از دو یا چند رشته پلی‌پپتیدی تشکیل شده‌اند. به عنوان مثال مولکول هموگلوبین چهار رشته پلی‌پپتیدی دارد.
- پروتئین‌ها متعدد ترین گروه مولکول‌های زیستی از نظر ساختاری و عملکردی هستند.
- آمینواسیدها در طبیعت انواع گوناگونی دارند، اما فقط ۲۰ نوع از آن‌ها در ساختار پروتئین‌ها به کار می‌روند. از تجزیه آمینواسیدها، نوعی ماده دفعی نیتروژن دار به نام آمونیاک تولید می‌شود که بسیار سمی است. آمونیاک از طریق جریان خون به کبد منتقل و از ترکیب آن با کربن دی‌اکسید، ماده دفعی نیتروژن داری به نام اوره تولید می‌شود که سمیت کمتری دارد.
- نقش‌های پروتئین‌ها:

- ➊ انقباض ماهیچه (مثل اکتین و میوزین) ➋ انتقال مواد در خون (مثل هموگلوبین و آلبومین) ➌ کمک به عبور مواد از غشای یاخته (مثل پمپ سدیم - پتاسیم) ➍ عملکرد آنزیمی (مثل آمیلاز) ➎ نقش هورمونی (مثل انسولین و اکسی‌توسین) ➏ عملکرد دفاعی (مثل پروتئین‌های مکمل، اینترفرون، پادتن و پرفورین) ➐ تنظیم فعالیت‌زن‌ها (مثل پروتئین مهارکننده) ➑ اتفاقات خون (مثل پروترومیتاز، پروتومیبین و فیبرینتوژن) ➒ گیرنده غشایی (مثل گیرنده آنتی‌زن در سطح لنفوسيت) ➓ استحکام بافت‌ها (مثل کلارن) ➔ تقسیم سیتوپلاسم (مثل اکتین و میوزین) و ...
- بیشتر آنزیم‌ها، از جنس پروتئین هستند. آنزیم‌ها با فراهم کردن امکان برخورد مناسب بین مولکول‌ها و کاهش انرژی فعال‌سازی، سرعت واکنش‌های شیمیایی را که در بدن موجود زنده انجام شدنی هستند، افزایش می‌دهند.



نوکلئیک اسیدها

- علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن و فسفر نیز دارند.
- به طور کلی دونوع نوکلئیک اسید وجود دارد: ۱) دئوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) که اطلاعات و راثتی را ذخیره می‌کند.
- ۲) ریبونوکلئیک اسید (RNA) که از روی بخشی از یک رشته DNA ساخته می‌شود و انواع مختلف آن، نقش‌های متفاوتی دارند.
- هر نوکلئیک اسید از واحدهای ساختاری به نام نوکلئوتید و هر نوکلئوتید از سه بخش ساخته شده است:
- ۱) باز آلی نیتروژن دار ۲) قند پنج کربنی ۳) یک تا سه گروه فسفات
- بازهای آلی نیتروژن دار به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: ۱) بازهای پورین (دو حلقه‌ای) شامل آدنین (A) و گوانین (G) ۲) بازهای پیریمیدین (تک حلقه‌ای) شامل تیمین (T)، سیتوزین (C) و یوراسیل (U)
- آدنین، گوانین و سیتوزین در DNA و RNA وجود دارند. تیمین در DNA و یوراسیل در RNA به کار می‌رود.
- قند پنج کربنی ریبوز در نوکلئوتیدهای RNA و قند پنج کربنی دئوکسی ریبوز در نوکلئوتیدهای DNA به کار می‌رود.
- DNA موجود در هسته یاخته‌های یوکاریوتی از نوع خطی DNA اما DNA موجود در باکتری‌ها، راکیزه (میتوکندری) و دیسه (پلاست) از نوع حلقوی است.

+) جمع‌بندی پلاس مقایسه DNA و RNA

| RNA (RNA) | DNA (DNA) | نام مولکول |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ریبونوکلئیک اسید | دئوکسی ریبونوکلئیک اسید | واحد ساختاری |
| ریبونوکلئوتید | دئوکسی ریبونوکلئوتید | نوع قند پنج کربنی |
| ریبوز | دئوکسی ریبوز | نوع باز آلی نیتروژن دار |
| آدنین، یوراسیل، گوانین و سیتوزین | آدنین، تیمین، گوانین و سیتوزین | روش معمول تشکیل |
| رونویسی | همانندسازی | محل فعالیت در یاخته‌های یوکاریوتی |
| ماده زمینه سیتوپلاسم، راکیزه و دیسه | هسته، راکیزه و دیسه | محل فعالیت در یاخته‌های پروکاریوتی |
| سیتوپلاسم | سیتوپلاسم | |

یاخته و بافت در بدن انسان

- یاخته، واحد ساختار و عملکرد در جانداران است. یاخته جانوری از سه بخش تشکیل شده است: ۱) هسته ۲) سیتوپلاسم ۳) غشا

هسته

- شکل، اندازه و کار یاخته یوکاریوتی را مشخص و فعالیت‌های آن را کنترل می‌کند.
- پروکاریوت‌ها (باکتری‌ها) برخلاف یوکاریوت‌ها (جانوران، گیاهان، قارچ‌ها و آغازیان) هسته مشخصی ندارند.
- بخش عمده DNA در هسته قرار دارد و دارای اطلاعات لازم برای تعیین صفات است.
- هسته، پوششی دولایه (غشای داخلی و خارجی) دارد که از طریق منافذ آن، ارتباط بین هسته و سیتوپلاسم برقرار می‌شود.
- بر روی غشای خارجی هسته همانند غشای شبکه آندوپلاسمی زبر، رناتن وجود دارد.
- بیشتر یاخته‌های انسان تک‌هسته‌ای هستند (مثل یاخته‌های عصبی).




▶ نایزک

- انشعابی از نایزک که دیگر غضروف ندارد، نایزک نامیده می‌شود.
- نایزک‌ها به دلیل نداشتن غضروف می‌توانند با تنگ و گشاد شدن، مقدار هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کنند.
- آخرین انشعاب نایزک در بخش هادی، نایزک انتهایی نام دارد.

◀ مشاوره با توجه به این که بعضی از نایزک‌ها جزء بخش هادی و بعضی دیگر جزء بخش مبادله‌ای هستند، در

جلة آزمون به نوع نایزک مطرح شده در سؤال دقت کنید.



▶ ب. بخش مبادله‌ای



- اجزه: ① نایزک‌های مبادله‌ای
② کیسه‌های حبابکی
- نایزکی که روی آن حبابک وجود دارد، نایزک مبادله‌ای نامیده می‌شود.
- حبابک‌ها به صورت تکی یا مجموعه‌ای به نایزک مبادله‌ای متصل‌اند.
- کیسه‌های حبابکی، ساختاری خوش‌های دارد و از چندین حبابک تشکیل شده است.
- مخاط مژک دار، در طول نایزک مبادله‌ای به پایان می‌رسد.
- گروهی از یاخته‌های دستگاه ایمنی به نام درشت‌خوار (ماکروفافاژ) در حبابک‌ها مستقر هستند.
- ماکروفافاژها، جزء یاخته‌های دیواره حبابک محسوب نمی‌شوند.

▶ جمع‌بندی پلاس دستگاه تنفسی انسان +



یاخته‌های دیواره حبابک‌ها

- نوع اول که فراوان‌تر است، از نوع سنگفرشی و به شکل چند وجهی با یک هسته در مرکز دیده می‌شود. این یاخته‌ها مبادله گازهای تنفسی را بر عهده دارند.
- نوع دوم که به تعداد خیلی کمتر دیده می‌شوند و ظاهری کاملاً متفاوت دارند، عامل سطح فعال را به سطح درونی حبابک‌ها ترشح می‌کنند.
- عامل سطح فعال (سورفاکتانت) در سطحی که مجاور هواست ترشح می‌شود و با کاهش نیروی کشش سطحی آب، باز شدن حبابک‌ها را تسهیل می‌کند.



مویرگ‌های اطراف حبابک

- مویرگ‌های خونی فراوان، اطراف حبابک‌ها را احاطه کرده‌اند.
- دیواره حبابک‌ها همانند دیواره مویرگ‌های خونی، از بافت پوششی سنگفرشی یک لایه تشکیل شده است.
- دیواره مویرگ و دیواره حبابک، در جاهای متعدد، یک غشای پایه مشترک دارند.
- اکسیژن موجود در حبابک، برای ورود به گویچه قرمز، باید از ۵ غشا عبور کند.
- مولکول‌های اکسیژن و کربن دی‌اکسید، می‌توانند با عبور از یک غشای پایه، بین حبابک و خون مبادله شوند.
- یاخته‌های دیواره حبابک‌ها، ۰٪ مورد نیاز خود را از هوا و مواد غذایی مورد نیاز خود را از خون دریافت می‌کنند.


مشاوره با توجه به این که هموگلوبین نقش مهمی در انتقال گازهای تنفسی دارد، لازم است ساختار هموگلوبین (فصل ۱ دوازدهم) را نیز مرور کنید. علاوه بر آن، با توجه به تولید کربن دی‌اکسید در تنفس هوایی، لازم است بدانید در کدام مراحل تنفس یاخته‌ای، کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود.

حمل گازها در خون

- اکسیژن به دو روش در خون حمل می‌شود:
 - ① بخش اندکی از آن به صورت محلول در خوناب ② بخش عمده آن به صورت ترکیب با هموگلوبین کربن دی‌اکسید به سه روش در خون حمل می‌شود:
 - ① بیشترین مقدار آن به صورت یون بیکربنات ② مقداری از آن به صورت ترکیب با هموگلوبین ③ بخش اندکی از آن به صورت محلول در خوناب

- گویچه قرمز، آنزیم کربنیک ایندراز دارد که کربن دی‌اکسید را با آب ترکیب می‌کند و کربنیک اسید می‌سازد.
 - کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می‌شود.
 - یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به خوناب وارد می‌شود. با رسیدن به شش‌ها، کربن دی‌اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می‌شود.

هموگلوپین




- چهار زنجیره پلی پپتیدی (دو زنجیره آلفا و دو زنجیره بتا) دارد زنجیره آلفا — زنجیره بتا که به هر یک از آن‌ها یک گروه هم (غیرپروتئینی) متصل است.
 - هر گروه هم یک اتم آهن دارد که یک مولکول اکسیژن می‌تواند به صورت برگشت‌پذیر به آن متصل شود.
 - کربن دی‌اکسید برخلاف اکسیژن، به گروه هم متصل نمی‌شود.
 - کربن مونوکسید همانند اکسیژن، به اتم آهن گروه هم متصل می‌شود، اما پس از اتصال، به آسانی از آن جدا نمی‌شود.
 - کربن مونوکسید گاز سمی است، تنفس آن باعث مسمومیت می‌شود و به گاز‌گرفتگی شهرت دارد.
 - گویچدهای قرمز، در انتقال بخش عمدۀ کربن دی‌اکسید خون دخالت دارند.
 - نقش اصلی هموگلوبین، انتقال اکسیژن است.
 - هر مولکول هموگلوبین می‌تواند چهار مولکول (هشت اتم) اکسیژن را حمل کند.

تهویه ششی

شیش‌ها

- درون قفسه سینه و روی پرده ماهیچه‌ای میان‌بند (دیافراگم) قرار دارند.
 - شش چپ به علت مجاورت با قلب، از شش راست کوچک‌تر است.
 - شش چپ از دولپ و شش راست از سه لپ تشکیل شده است.
 - اجزای شش: کیسه‌های حبابکی، نایزه‌ها، نایزک‌ها و رگ‌ها
 - بخشی از نایزه‌های اصلی، تمام بخش‌های نایزه‌های کوچک‌تر و نایزک‌ها جزء شش‌ها هستند.
 - شش‌ها از بیرون توسط یک بافت پیوندی احاطه شده‌اند.
 - بیشتر حجم شش‌ها، اکسی‌های حبابکی، به خود اختصاص داده‌اند.




بردة حنب

- لایه خارجی پرده جنب به سطح درونی قفسه سینه (دندنه‌ها و ماهیچه‌های بین دندنه‌ای) متصل است.
 - لایه داخلی پرده جنب به سطح شش متصل است.
 - پرده جنب از جنس بافت پیوندی است.
 - فشار مایع جنب از فشار جو کمتر است و باعث می‌شود شش‌ها در حالت بازدم، کاملاً جمع نشوند.



- فشار مایع جنب هنگام دم کاهش و هنگام بازدهم افزایش می‌یابد.
- اگر قسمتی از قفسه سینه سوراخ شود، ممکن است هر دو شش جم شوند که علت آن ورود هوای فضای جنب است.
- دو ویژگی مهم شش‌ها: ① پیروی از حرکات قفسه سینه ② کشسانی
- با متبسط شدن قفسه سینه هنگام دم، فشار درون شش‌ها کاهش می‌یابد؛ سپس با ورود هوای درون شش‌ها، به تدریج فشار درون شش‌ها افزایش می‌یابد.
- شش‌ها به علت کشسانی، در برابر کشیده شدن مقاومت می‌کنند و تمایل دارند به وضعیت اولیه بازگردند.
- ویژگی کشسانی شش‌ها در بازدم نقش مهمی دارد.

مشاوره در سوالات مربوط به دم و بازدم، ابتدا ببینید سؤال مربوط به دم و بازدم معمولی است یا عمیق؛ سپس براساس آن باید تشخیص دهید کدام ماهیچه‌های تنفسی در حال انقباض و کدام در حال استراحت هستند.



◀ هنگام دم

- حجم قفسه سینه و شش‌ها افزایش پیدامی کند.
- میان‌بند منقبض می‌شود، پایین می‌رود و مسطح می‌شود.
- انقباض ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی، دنده‌ها را به سمت بالا و خارج می‌برد.
- استخوان جناغ به سمت جلو (بیرون) می‌رود.
- در تنفس آرام و طبیعی، میان‌بند نقش اصلی را بر عهده دارد.
- در دم عمیق، انقباض ماهیچه‌های گردن، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می‌کند.


◀ هنگام بازدم

- حجم قفسه سینه و شش‌ها کاهش پیدا می‌کند.
- میان‌بند به حالت استراحت درمی‌آید و گنبدی شکل می‌شود.
- ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی به حالت استراحت درمی‌آیند.
- انقباض ماهیچه‌های بین دنده‌ای داخلی و ماهیچه‌های شکمی، فقط در بازدم عمیق به کاهش حجم قفسه سینه کمک می‌کند.
- هنگام بازدم، با به استراحت درآمدن ماهیچه میان‌بند و ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی و بر اثر ویژگی کشسانی شش‌ها، حجم قفسه سینه و در نتیجه حجم شش‌ها کاهش می‌یابد و هوای درون آن‌ها به بیرون رانده می‌شود.
- میان‌بند و ماهیچه‌های بین دنده‌ای، از نوع ماهیچه‌های مخطط (اسکلتی) هستند و تحت کنترل ارادی قرار دارند.

+ جمع‌بندی پلاس ماهیچه‌های مؤثر در دم و بازدم

| ماهیچه | دم عادی | دم عمیق | بازدم عادی | بازدم عمیق |
|---------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| میان‌بند (دیافراگم) | انقباض (مسطح) | انقباض (مسطح) | استراحت | استراحت |
| بین دنده‌ای خارجی | انقباض | انقباض | استراحت | استراحت |
| بین دنده‌ای داخلی | استراحت | استراحت | استراحت | استراحت |
| گردنی | انقباض | انقباض | استراحت | استراحت |
| شکمی | استراحت | استراحت | استراحت | انقباض |

بخش یاخته‌ای



- یاخته‌های خونی پس از تولید توسط یاخته‌های بنیادی مغز استخوان، با عبور از دیوارهٔ مویرگ وارد خون می‌شوند.
- در دوران جنینی، یاخته‌های خونی علاوه بر مغز استخوان، در اندام‌های دیگری مانند کبد و طحال نیز ساخته می‌شوند.
- لنفوسيت‌ها، علاوه بر مغز استخوان، در ساختارهای لنفی نیز می‌توانند تولید شوند.

گویچه‌های قرمز (RBC)

- بیش از ۹۹ درصد یاخته‌های خونی را تشکیل می‌دهند، کروی‌شکل و از دو طرف فرو رفتند.
- در انسان و بسیاری از پستانداران دیگر، هنگام تشکیل در مغز استخوان، هسته و بیشتر اندام‌های خود را از دست می‌دهند و سیتوپلاسم آن‌ها از هموگلوبین پر می‌شود.
- نقش اصلی گویچه‌های قرمز، انتقال گازهای تنفسی است.
- متوسط عمر گویچه‌های قرمز ۱۲۰ روز است و روزانه حدود ۱٪ از آن‌ها تخریب می‌شود.
- گویچه‌های قرمز آسیب دیده و مرده در طحال و کبد تخریب می‌شوند.
- آهن آزادشده از تخریب گویچه‌های قرمز یا در کبد ذخیره می‌شود یا همراه خون به مغز استخوان می‌رود.
- برای تولید گویچه‌های قرمز دو نوع ویتامین از خانواده B (B₁₂ و فولیک اسید) و آهن لازم است.
- فولیک اسید برای تقسیم طبیعی یاخته‌ای لازم است. کمبود این ویتامین باعث می‌شود یاخته‌ها به ویژه در مغز استخوان تکثیر نشوند و در نتیجه، تعداد گویچه‌های قرمز کاهش یابد.
- منابع آهن و فولیک اسید: سبزیجات با برگ سبز تیره، حبوبات، گوشت قرمز و جگر
- فولیک اسید، هم در منابع گیاهی و هم در منابع جانوری وجود دارد؛ در حالی که ویتامین B₁₂ فقط در منابع جانوری یافت می‌شود
- مقداری ویتامین B₁₂ در رودهٔ بزرگ تولید می‌شود.
- کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامین B₁₂ وابسته است.
- میزان تولید گویچه‌های قرمز به ترشح هورمون اریتروپویتین بستگی دارد.
- نسبت حجم گویچه‌های قرمز خون به حجم خون که به صورت درصد بیان می‌شود، خون‌بهر (هماتوکریت) نامیده می‌شود
- ◀ اریتروپویتین
- از کبد و کلیه به خون ترشح می‌شود و با اثر بر مغز استخوان، سرعت تولید گویچه‌های قرمز را افزایش می‌دهد.
- به طور طبیعی، به مقدار کم ترشح می‌شود اما هنگام کاهش اکسیژن خون، ترشح آن افزایش می‌یابد که علت آن می‌تواند موارد زیر باشد:

① کم خونی ② بیماری‌های تنفسی و قلبی ③ ورزش‌های طولانی ④ قرار گرفتن در ارتفاعات

گویچه‌های سفید (WBC)

- کمتر از یک درصد یاخته‌های خونی را شامل می‌شوند.
- ضمن گردش در خون، در بافت‌های مختلف بدن نیز پراکنده می‌شوند.
- نقش اصلی آن‌ها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.



- همه انواع گویچه‌های سفید خون می‌توانند با تراکذری (دیاپدز) از دیواره مویرگ‌ها عبور کنند.
- همه گویچه‌های سفید خون، تک‌هسته‌ای هستند.
- هر گویچه سفیدی با سیتوپلاسم دانه‌دار، دارای هسته دو یا چند قسمتی است.
- هر گویچه سفیدی با سیتوپلاسم بدون دانه، دارای هسته تک قسمتی است.

جمع‌بندی پلاس + انواع گویچه‌های سفید خون



بازووفیل



اوزینوفیل



نوتروفیل



مونوسیت



لنفوسيت

هسته دو قسمتی روی هم افتاده

بازووفیل‌ها سیتوپلاسم با دانه‌های تیره

هسته دو قسمتی دمبلي

اوزینوفیل‌ها سیتوپلاسم با دانه‌های روشن درشت

هسته چند قسمتی

نوتروفیل‌ها سیتوپلاسم با دانه‌های روشن ریز

هسته تکی خمیده یا لوبیایی

مونوسیت‌ها منشأ درشت‌خوارها و یاخته‌های دارینه‌ای

هسته تکی گرد یا بیضی

لنفوسيت‌ها در دفاع اختصاصی و غیراختصاصی

سیتوپلاسم دانه‌دار

سیتوپلاسم بدون دانه

گرده‌ها یا پلاکت‌ها (PLT)

- قطعات یاخته‌ای بی‌رنگ و فاقد هسته‌اند که اندازه آن‌ها از گویچه‌های خون کوچک‌تر است.
- در مغز استخوان، از قطعه قطعه شدن بخش سیتوپلاسمی مگاکاریوسیت‌های بابه وجود می‌آیند و سپس وارد جریان خون می‌شوند.
- به طور معمول مگاکاریوسیت وارد خون نمی‌شود.
- دانه‌های کوچک زیادی دارند که پر از ترکیبات فعال هستند.

بافت‌ها و گرده‌های آسیب‌دیده

◀ گرده‌ها به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیری می‌کنند:

❶ در خونریزی‌های محدود که دیواره رگ‌ها آسیب جزئی می‌بینند، دور هم جمع می‌شوند و با ایجاد درپوش، جلوی خروج خون را می‌گیرند.

❷ در خونریزی‌های شدیدتر، در تولید لخته خون نقش اصلی را دارند.

▶ در شروع فرایند تشکیل لخته، بافت‌ها و گرده‌های آسیب‌دیده آنزیم پروترومیناز ترشح می‌کنند.



ترشح آنزیم پروترومیناز

پروتومیناز

ترومبین

تشکیل لخته



فیبرینوژن

فیبرین

- برای تشکیل لخته، انواعی از پروتئین‌های خوناب (پروترومبین و فیبرینوژن)، وجود ویتامین K، یون کلسیم و عوامل انعقادی دیگر (مانند عامل انعقادی ۸) لازم است.
- پروترومبین و فیبرینوژن از پروتئین‌های محلول در خوناب هستند و همواره در خون وجود دارند.
- ترومبین و فیبرین، پروتئین‌هایی نامحلول هستند و فقط در روند انعقاد خون تولید می‌شوند.
- ترومبین، آنزیم فعال پروتئینی با خاصیت پروتئازی است.
- عواملی که سبب اختلال در روند انعقاد خون می‌شوند:
 - ۱ فقدان عامل انعقادی ۸ بر اثر نقصن ژنی (شایع‌ترین نوع بیماری هموفیلی)
 - ۲ کاهش شدید تعداد گرده‌های خون
 - ۳ اختلال در تنظیم ترشح هورمون‌های کلسیتونین و پاراتیروثیدی
 - ۴ کمبود ویتامین D که منجر به کاهش جذب کلسیم می‌شود.
 - ۵ تشکیل سنگ در کیسه صفرای یا مجرای صفرای
 - ۶ کاهش تولید صفرای بر اثر اختلال در کار کبد که موجب کاهش جذب ویتامین K می‌شود.
 - ۷ کاهش ترشح آنزیم لیپاز (از پانکراس و معده) که موجب کاهش جذب چربی و در نتیجه کاهش جذب بعضی ویتامین‌ها می‌شود.

۱۴ تنوع گردش مواد در جانوران

جمع‌بندی پلاس روش‌های گردش مواد در جانوران +



سامانه گردش آب در اسفنج

■ این سامانه در اسفنج‌ها به تبادل گازهای تنفسی، تغذیه و دفع مواد زائد کمک می‌کند.

■ آب از سوراخ‌های دیواره به حفره یا حفره‌هایی وارد و پس از آن از سوراخ یا سوراخ‌های بزرگ‌تری خارج می‌شود.

■ عامل حرکت آب، یاخته‌های یقه‌دار هستند که تاژک دارند.

■ تاژک‌ها در سطح درونی حفرات بدن اسفنج قرار دارند.

■ هر یاخته یقه‌دار، یک تاژک دارد.

■ سطح درونی حفره یا حفرات بدن اسفنج برخلاف منافذ دیواره آن توسط یاخته‌های تاژک‌دار پوشیده شده است.

■ هر یاخته سازنده منفذ، با بیش از یک یاخته تماس مستقیم دارد.



حفره گوارشی

- در هیدر، حفره گوارشی پر از مایعات، علاوه بر گوارش، وظیفه گردش مواد را نیز برعهده دارد.
- جانورانِ دارای حفره گوارشی فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارند.
- در کرم‌های پهنه‌آزادی (مثل پلاناریا) انشعابات حفره گوارشی به تمام بدن نفوذ می‌کنند.
- در جانورانی مانند پلاتاریا، حرکات بدن به جایه‌جایی مواد کمک می‌کند.

سامانه گردش باز

- بندپایانی مانند ملخ، سامانه گردشی باز دارند.
- قلب، همولنف را به حفره‌های بدن پمپ می‌کند.
- همولنف نقش خون، لنت و آب میان‌بافتی را برعهده دارد.
- این جانوران مویرگ ندارند و همولنف مستقیماً به فضای بین یاخته‌های بدن وارد می‌شود و در مجاورت آن‌ها جریان می‌یابد.

حشرات



- یک قلب لوله‌ای در سطح پشتی بدن خود دارند.
- همولنف از طریق رگ‌ها به درون حفرات پمپ می‌شود.
- یاخته‌ها به طور مستقیم مواد خود را با همولنف مبادله می‌کنند.
- همولنف از طریق منافذ دریچه‌دار به قلب بازمی‌گردد.
- منافذ دریچه‌دار هنگام انقباض قلب بسته‌اند و هنگام استراحت قلب باز می‌شوند تا خون به قلب بازگردد.
- در محل ورود همولنف به قلب حشرات، همانند محل خروج همولنف از قلب آن، دریچه وجود دارد.
- منافذ دریچه‌دار ابتدای رگ‌های ملخ هنگام انقباض قلب باز می‌شوند.
- ملخ قادر سیاه‌رگ است و بازگشت همولنف به قلب آن از طریق منافذ دریچه‌دار صورت می‌گیرد.
- برای همولنف حشرات از اصطلاح تیره و روشن استفاده نمی‌شود؛ چون همولنف حشرات گاز تنفسی حمل نمی‌کند.

سامانه گردش بسته

- ساده‌ترین سامانه گردش خون بسته در کرم‌های حلقوی (مانند کرم خاکی) دیده می‌شود.
- در این نوع سامانه، مویرگ‌ها در کنار یاخته‌ها و با کمک آب میان‌بافتی، مبادله مواد غذایی، مواد دفعی و گازها را انجام می‌دهند.
- تمام مهره‌داران سامانه گردشی بسته دارند.
- در گردش خون ساده، خون ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب عبور می‌کند. در حالی که در گردش خون مضاعف، خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می‌کند.
- در هر جانوری با گردش خون بسته، خون ضمن یک بار گردش در بدن، فقط یک بار از دستگاه تنفس عبور می‌کند.
- مزیت گردش خون ساده انتقال یکباره خون اکسیژن‌دار به تمام مویرگ‌های اندام‌هاست.
- در جانورانی که گردش خون بسته دارند، فقط یاخته‌های سطح درونی قلب و رگ‌ها با خون تماس مستقیم دارند و می‌توانند بدون نیاز به مویرگ، مبادلات خود را به طور مستقیم با خون انجام دهند.



آزمون عبارات

■ در هر یک از عبارت‌های زیر، مورد صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید:

۱. در گیاه سبزه‌مینی (**رسشه / ساقه**) می‌تواند در دیسه‌های خود، مقادیر فراوانی نشاسته ذخیره کند.
 ۲. یاخته‌های پارانشیمی (**همانند / برخلاف**) فیبر در دیواره خود لان دارند.
 ۳. در هر گیاه (**گلدار / دانه‌دار**) یاخته‌های همراه، به تراپری ترکیبات آلی کمک می‌کنند.
 ۴. پلاسمولیز سبب (**کاهش / افزایش**) فاصله بین غشا و دیواره یاخته گیاهی می‌شود.
 ۵. رنگ‌دیسه (**همانند / برخلاف**) سبزدیسه، حاوی کاروتونوئید است.
 ۶. یاخته‌های همراه، همانند یاخته‌های آوندی مجاورشان (**دیواره سلولزی / فامتن**) دارند.
 ۷. یاخته‌های گیاهی که نقش استحکامی دارند (**می‌توانند / نمی‌توانند**) قادر دیواره پسین باشند.
 ۸. در پی فعالیت مریستم بین دو گره، یاخته‌های آوندی تولید (**می‌شوند / نمی‌شوند**).
 ۹. ذره‌های سختی که هنگام خوردن گلابی حس می‌کنیم، مجموعه‌ای از یاخته‌های (**فیبر / اسکلرئید**) هستند.
- درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید:

 ✓

۱۰. از تقسیم هر یاخته کامپیوم آوندساز، یک آوند چوبی و یک آوند آبکش حاصل می‌شود.

۱۱. پوستک، لایه‌ای است که در تماس مستقیم با دیواره نخستین یاخته‌های روپوست قرار می‌گیرد.

۱۲. هر لایه‌ای از دیواره که حاوی پکتین است، دو یاخته گیاهی را در کنار هم نگه می‌دارد.

۱۳. یاخته سامانه بافت زمینه‌ای می‌تواند دارای یک یا دو دیواره باشد.

۱۴. بافت پوششی هر اندام هوایی گیاه، یاخته‌هایی دارد که ترکیبات لیپیدی تولید می‌کنند.

۱۵. کاهش نور، منجر به تجزیه سبزینه در هر گیاه فتوسنترکننده می‌شود.

۱۶. ترکیبات سازنده دیواره یاخته‌های گیاهی، از سمت داخل به دیواره اضافه می‌شوند.

۱۷. یاخته‌های برگ گیاه گندم در واکوئول‌های خود، گلوتن ذخیره می‌کنند.

۱۸. هر یاخته بافت زمینه‌ای می‌تواند با تقسیم خود، به ترمیم زخم‌ها کمک کند.

۱۹. هر یاخته آوندی که در دیواره خود کانال‌های میکروسکوپی دارد، حاوی سیتوپلاسم است.

۲۰. نهان‌دانگان، بیشترین گونه‌های گیاهی روی زمین را تشکیل می‌دهند.

۲۱. هر ترکیبی که در واکوئول ذخیره می‌شود، توسط گیاه تولید شده است.

۲۲. بعضی یاخته‌های اسکلرانشیمی در حالت بلوغ قادر پروتوبلاست‌اند.

۲۳. در گیاهان دیواره هر یاخته گیاهی در ساختار خود دارای کربوهیدرات است.

۲۴. آلکالوئیدهای موجود در شیرابه بعضی گیاهان، می‌توانند مانع از تقسیم یاخته انسانی شوند.

۲۵. پلاسمودسیم هر یاخته گیاهی، حاوی سیتوپلاسم است.

مشاوره بعد از پاسخ دادن به آزمون عبارات، خودتان را ارزیابی کنید:

اگر کمتر از ۱۳ مورد را درست تشخیص داده‌اید، برگردید و یک بار دیگر درسنامه را بخوانید.

اگر بیشتر از ۸ عبارت را بدون جواب گذاشته‌اید، باید کمی روی اعتماد به نفس‌تان کار کنیدا نترسید، ریسک کنید و جواب مورد نظرتان را انتخاب کنید؛ مگر در مواردی که چیزی از مطلب نمی‌دانید.

اگر بیشتر از ۲۰ مورد را درست تشخیص داده‌اید، مشخص است که همه کارهایتان را عالی انجام داده‌اید.

بهتر است قبل از تسلط به درسنامه و آزمون عبارات، به سراغ تست‌ها نروید.



پاسخ‌نامه تشریحی

شنبه
۱۳

۱۳۲

پاسخ آزمون عبارات

۱۷. **نادرست** / علاوه بر ریشه، اندام‌های دیگری مانند برگ نیز در جذب مواد نقش دارند و برگ دارای پوستک است.
۱۸. **نادرست** / گیاه برنج با آزو لا همزیستی ندارد؛ بلکه گیاه آزو لا با سیانوباکتری‌ها همزیستی دارد و بخشی از نیتروژن مورد نیاز خود را از این باکتری به دست می‌آورد.
۱۹. **نادرست** / بعضی سیانوباکتری‌ها قادر به تثبیت نیتروژن هستند.
۲۰. **نادرست** / روزندهای مسئول تعزیق، روزندهای آبی نام دارند و همیشه بازنده.
۲۱. **درست** / این قارچ‌ها در سطح ریشه زندگی می‌کنند و رشته‌های ظریفی به درون ریشه می‌فرستند.
۲۲. **درست** / بخشی از آمونیوم موجود در خاک توسط باکتری‌های نیترات‌ساز به نیترات تبدیل می‌شود.
۲۳. **درست** / طبق این مدل، حرکت شیره پرورده در درون آوند آبکش به صورت جریان توده‌ای است و نیازی به مصرف ATP ندارد.
۲۴. **نادرست** / از شته‌ها برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده استفاده می‌شود. طناب عصبی حشرات، از نوع شکمی و گره‌دار است.

پاسخ آزمون تستی

۶۱. **گزینه «۳»** در صورتی که زن مؤثر در تثبیت نیتروژن را از باکتری استخراج و به گیاه گندم وارد کنیم، گیاه تراژن می‌تواند از نیتروژن جو استفاده کند.
- بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۱): باکتری‌های نیترات‌ساز، از آمونیوم برای تولید نیترات استفاده می‌کنند؛ آمونیوم می‌تواند بر اثر فعالیت ریزوبیوم‌ها تولید شود.
- گزینه (۲): باکتری‌های نیترات‌ساز، آمونیوم را به نیترات تبدیل می‌کنند؛ آمونیوم، توسط گیاهان قابل جذب است.
- گزینه (۴): باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن، N₂ جو را به آمونیوم تبدیل می‌کنند؛ بنابراین آمونیوم در خود این باکتری‌ها تولید می‌شود.
۶۲. **گزینه «۱»** گیاهی که مواد معدنی مورد نیاز خود را با کمک قارچ جذب می‌کند، حتماً گیاه آوندی است و همه گیاهان آوندی تراکثیددارند. تراکثیدهایان دارودوکی شکل‌اند.
- بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۲): عدسک در ساقه چوبی نهان دانگان دولپه‌ای تشکیل می‌شود؛ در دولپه‌ای‌ها، به طور

پاسخ آزمون عبارات


۱. **همانند** / آب برای رسیدن به غشا باید از دیواره بگذرد.
۲. **همانند** / کودهای شیمیایی حاوی مواد معدنی هستند؛ کودهای آلی نیز اگرچه حاوی مواد آلی هستند اما با تجزیه‌این مواد، به تدریج مواد معدنی را آزاد و به خاک اضافه می‌کنند.
۳. **باعبور از غشا** / با حل شدن CO₂ در آب، یون بیکربنات به وجود می‌آید که باعبور از غشاء یاخته‌های گیاه جذب می‌شود.
۴. **عناصر معدنی** / کودهای زیستی معمولاً همراه با کودهای شیمیایی به خاک افزوده می‌شوند.
۵. **معدنی** / این باکتری‌ها، آمونیوم (نوعی ماده معدنی) را به نیترات تبدیل می‌کنند.
۶. **ساقه** / سیانوباکتری‌های همزیست در ساقه و دمبرگ‌های گونرا زندگی می‌کنند.
۷. **آمونیوم** / باکتری‌های همزیست با ریشه گیاهان تیره پروانه‌واران، تثبیت‌کننده نیتروژن هستند و نیتروژن جو را به آمونیوم تبدیل می‌کنند.
۸. **همچسبی مولکول‌های آب** / مکش تعریقی عامل اصلی صعود شیره خام است اما پیوستگی ستون آب درون آوند چوبی اساساً به ویژگی‌های مولکول‌های آب (همچسبی و دگرچسبی) استگی دارد.
۹. **آلی** / هوموس (گیاخاک) که در واقع شامل مواد آلی خاک است، بالسفنجی کردن حالت خاک به نفوذ ریشه کمک می‌کند.
۱۰. **فاقد** / خارجی‌ترین لایه استوانه آوندی، لایه ریشه‌زا نام دارد و فاقد نوار کاسپاری است.
۱۱. **درست** / یاخته‌های نگهبان، سبزدیسه دارند و می‌توانند اکسیژن تولید شده طی فتوسنتز را در تنفس یاخته‌ای مصرف کنند.
۱۲. **نادرست** / ابتدا یون‌های پتاسیم و کلر و سپس آب وارد یاخته‌های نگهبان می‌شود.
۱۳. **نادرست** / بیشتر گیاهان، بخشی از مواد مورد نیازشان را می‌سازند که شامل همه مواد آلی مورد نیاز آن‌هاست.
۱۴. **نادرست** / بخش از تثبیت نیتروژن در خاک با کمک باکتری‌ها و بخشی نیز با کمک یوکاریوت‌ها انجام می‌شود.
- باکتری‌ها فقط یک نوع یوکاریوت‌های انواعی رنبلسپاراز دارند.
۱۵. **نادرست** / قارچ ریشه‌ای به جذب آب و مواد معدنی مختلف (به ویژه فسفات) کمک می‌کند.
۱۶. **نادرست** / نیترات پس از ورود به ریشه، به آمونیوم تبدیل می‌شود. بنابراین نیتروژن جذب شده به ریشه، به صورت آمونیوم وارد آوندهای چوبی ساقه می‌شود.

زیست‌شناسی (۲)

زیست یازدهم اهمیت فوق العاده‌ای در کنکور سراسری دارد. احتمال این که سوالات فصل‌های ۱، ۴، ۵ و ۷ چالشی باشند، بسیار زیاد است و امکان دارد سوالات فصل‌های دیگر جنبهٔ حفظی بیشتری داشته باشند.

سعی کنید فصل‌های مرتبط را به دنبال هم مطالعه کنید. فصل‌های ۱ و ۲ ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. فصل‌های ۶ و ۷ هم بسیار با هم مرتبط‌اند. دو فصل آخر نیز که مربوط به گیاهان عزیز هستند و خود به خود پیوسته‌اند.

سخت‌ترین فصل این کتاب برای کنکور، فصل تولیدمثل است. برای این فصل حساب ویژه‌ای باز کنید و حسابی روی آن وقت بگذارید.





مُخچه

- در پشت ساقه مغز قرار دارد و شامل دو نیمکره و بخشی به نام کرمینه در وسط آن است.
- مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است.
- به طور پیوسته از بخش‌های دیگر مغز، نخاع و اندام‌های حسی (مانند گوش‌ها) پیام را دریافت و بررسی می‌کند.
- مُخچه، فعالیت ماهیچه‌ها و حرکات بدن را در حالت‌های گوناگون به کمک مغز و نخاع هماهنگ می‌کند.

تalamوس‌ها


- ۱۵۸
- دو تalamوس با یک رابط به هم اتصال دارند.
 - محل پردازش اولیه و تقویت اطلاعات حسی‌اند.
 - اغلب پیام‌های حسی در تalamوس‌ها گرد هم می‌آیند تا برای پردازش نهایی، به بخش‌های مربوط در قشر مخ فرستاده شوند.

هیپوتalamوس

- در زیر تalamوس قرار دارد.
- **وظایف هیپوتalamوس:** ۱ تنظیم دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنجی، گرسنگی و خواب ۲ تنظیم میزان آب و فشار اسمزی خون با تولید هورمون ضدادراری ۳ تسهیل زایمان و خروج شیر با تولید هورمون اکسیتوسین ۴ تأثیر بر فعالیت بخش پیشین هیپوفیز با تولید هورمون‌های آزاد کننده و مهارکننده که منجر به تغییر در فعالیت ترشحی تیروئید، قشر فوق‌کلیه و غده‌های جنسی می‌شود.

سامانه کناره‌ای (لیمبیک)

- با قشر مخ، تalamوس‌ها و هیپوتalamوس ارتباط دارد. در واقع پیام‌ها را از تalamوس و هیپوتalamوس به قشر مخ منتقل می‌کند.



- در حافظه، یادگیری و همچنین احساساتی مانند ترس، خشم و لذت نقش دارد.
- اسپک‌مغز (هیپوکامپ) یکی از بخش‌های سامانه کناره‌ای است که در تشکیل حافظه و یادگیری نقش دارد. این بخش، در ایجاد حافظه کوتاه مدت و تبدیل آن به حافظه بلند مدت نقش دارد.
- در صورت آسیب دیدن اسپک‌مغز، فرد از یادگیری اسامی جدید ناتوان خواهد بود اما برای به یاد آوردن خاطرات قبل از آسیب‌دیدگی مشکل چندانی ندارد.
- پیازهای بویایی جزو سامانه کناره‌ای نیستند اما با آن ارتباط دارند.
- دو پیاز بویایی از بخش عقبی با یکدیگر ارتباط دارند.

اعتیاد

- واژتگی به مصرف یک ماده (مثل الکل، کوکائین، نیکوتین، هروئین، مورفین و...) یا انجام یک رفتار (مانند بازی‌های رایانه‌ای) است که ترک آن مشکلات جسمی و روانی برای فرد به وجود می‌آورد.

مواد اعتیادآور و مغز

- صرف مکرر مواد اعتیادآور، سبب تغییراتی در مغز می‌شود.
- اعتیاد بیماری برگشت‌پذیر است؛ یعنی حتی سال‌ها پس از ترک مواد، فرد دوباره در خطر مصرف دوباره قرار دارد.
- مواد اعتیادآور، بر بخشی از سامانه کناره‌ای اثر می‌گذارند و موجب آزاد شدن ناقل‌های عصبی از جمله دوپامین می‌شوند که در فرد، احساس لذت و سرخوشی ایجاد می‌کند.
- با ادامه مصرف، دوپامین کمتری آزاد می‌شود و به فرد، احساس کسالت، بی‌حوالگی و افسردگی دست می‌دهد و فرد مجبور است مقادیر بیشتری از ماده اعتیادآور را مصرف کند.
- مواد اعتیادآور بر بخش‌هایی از قشرمغز نیز اثر می‌گذارند و توانایی قضاوت، تصمیم‌گیری و خودکنترلی فرد را کاهش می‌دهند.

اعتیاد به الکل (اتانول)

- حتی مصرف کمترین مقدار الکل، بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
- الکل در دستگاه گوارش، به سرعت جذب می‌شود و از غشای یاخته‌های عصبی بخش‌های مختلف مغز عبور و فعالیت‌های آن‌ها را مختل می‌کند.
- الکل، علاوه بر دوپامین، بر فعالیت انواعی از ناقل‌های عصبی تحریک‌کننده و بازدارنده تأثیر می‌گذارد.

آثار الکل

- کاهش فعالیت‌های بدنی (ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن) اختلال در گفتار (برگشت اسید معده (ریفلکس)) بروز پوکی استخوان اختلال در تقسیم کاستمان (تأثیر سوء بر رشد و نمو جنین) الکل فعالیت مغز را کند و در نتیجه، زمان واکنش‌های فرد به محرك‌های محیطی افزایش پیدا می‌کند.
- پیامدهای مصرف بلند مدت الکل: مشکلات کبدی، سکته قلبی و انواع سرطان

- مشاوره** خیلی‌ها از این قسمت بیزارند و به همین دلیل، طراحان کنکور علاقه ویژه‌ای به تشریح مغز گوسفند نشان خواهند داد. به جای کارهای اضافه، نام هر یک از اجزای مغز را بر روی قسمت‌های برش خورده و همچنین کار آن‌ها را به خاطر بسپارید.

تشریح مغز گوسفند

قبل از برش مغز

- موارد مقابل فقط در سطح پشتی مغز قابل مشاهده‌اند: کرمینه و شیار بین دو نیمکره
- موارد مقابل فقط در سطح شکمی مغز قابل مشاهده‌اند: چلیپای بینایی، پل مغزی، مغز میانی و بصل النخاع
- موارد مقابل در هر دو سطح پشتی و شکمی قابل مشاهده‌اند: دو نیمکره مخ، نیمکره‌های مخچه و لوب‌های بویایی لوب‌های (پیازهای) بویایی




بخش‌های درونی مغز

- اگر دو نیمکره مخ را از سطح پشتی کمی فاصله دهیم، بدون برش، می‌توان رابط پینه‌ای را مشاهده کرد.
- با برش دادن رابط پینه‌ای، این موارد را می‌توان دید: ① رابط سه‌گوش در زیر رابط پینه‌ای (رأس آن به طرف جلو و قاعده آن به طرف عقب) ② بطن‌های ۱ و ۲ در دو طرف رابط‌های پینه‌ای و سه‌گوش (درون نیمکره‌های مخ)
- اجسام مخلوط و شبکه‌های مویرگی ترشح‌کننده مایع مغزی - نخاعی در درون بطن‌های ۱ و ۲
- اگر رابط سه‌گوش را به صورت طولی برش دهیم، این موارد را می‌توانیم ببینیم: ① دو تalamوس و رابط بین آن‌ها (در زیر رابط سه‌گوش) ② بطن سوم (در قسمت عقبی تalamوس‌ها) ③ غده اپی‌فیز در لبه پایینی بطن سوم
- برجستگی‌های چهارگانه در قسمت عقبی اپی‌فیز
- برجستگی‌های چهارگانه از اپی‌فیز بزرگ‌ترند.
- اگر کرمینه مخچه را در امتداد شیار بین دو نیمکره برش دهیم، درخت زندگی و بطن چهارم مغز را می‌توانیم ببینیم.
- درخت زندگی، انشعابات ماده سفید در بخش خاکستری مخچه است.



نخاع

- درون ستون مهره‌ها از بصل النخاع تا دومین مهره کمر کشیده شده است.
- بخش بیرونی نخاع به رنگ سفید (اجتماعی از رشته‌های میلین دار) و بخش درونی آن به رنگ خاکستری (شامل جسم‌یاخته‌های عصبی و رشته‌های بدون میلین) است.
- کanal مرکزی نخاع در بخش خاکستری قرار دارد و حاوی مایع مغزی - نخاعی است.
- بخش خاکستری نخاع در قسمت جلویی، پهن‌تر از قسمت عقبی آن است.
- مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می‌کند؛ مسیر عبور پیام‌های حسی از اندام‌های حسی بدن به مغز و همچنین ارسال پیام‌های مغز به اندام‌هاست.
- مرکز برخی انعکاس‌ها مانند عقب کشیدن دست بعد از برخورد به جسم داغ است.
- انعکاس تخلیه مثانه نیز نوعی انعکاس نخاعی است.
- به نخاع ۳۱ جفت عصب مخلوط متصل است. هر عصب نخاعی یک ریشه حسی (پشتی) و یک ریشه حرکتی (شکمی) دارد.
- در بخش خاکستری نخاع: ① آسه یاخته عصبی حسی با دارینه یاخته‌های عصبی رابط همایه برقرار می‌کند.
- آسه یاخته‌های عصبی رابط با دارینه یاخته‌های عصبی حرکتی همایه برقرار می‌کند.



جمع‌بندی پلاس انعکاس عقب کشیدن دست


- ۱ یاخته عصبی حسی
 - ۲ یاخته عصبی رابط
 - ۳ یاخته عصبی حرکتی
 - ۴ تحریکی ←
 - ۵ سیناپس مهاری ← ۱
 - ۶ غیرفعال ← ۱
- هدایت پیام عصبی در ۴ یاخته عصبی رابط
- ۱ یاخته عصبی حسی
- ۲ یاخته عصبی رابط
- ۱ یاخته عصبی حرکتی ماهیچه دوسر بازو

بخش خودمختار

- کار ماهیچه‌های صاف ماهیچه قلبی و غده‌ها را به صورت ناآگاهانه تنظیم می‌کند و همیشه فعال است.
- از اعصاب هم‌حس (سمپاتیک) و پادهم‌حس (پاراسمپاتیک) تشکیل شده است که معمولاً برخلاف یکدیگر کار می‌کنند.
- بخش پادهم‌حس باعث برقراری حالت آرامش در بدن می‌شود. در این حالت فشار خون و ضربان قلب کاهش می‌یابد.
- بخش هم‌حس هنگام هیجان بر بخش پادهم‌حس غلبه دارد و بدن را در حالت آماده‌باش نگه می‌دارد. در این حالت، فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس افزایش می‌یابد و جریان خون به سوی قلب و ماهیچه‌های اسکلتی هدایت می‌شود.

مشاوره دستگاه عصبی جانوران در کتاب درسی بسیار ساده بیان شده است. این مطالب می‌توانند به صورت ترکیبی با سایر فصول، تست‌های قدرتمندی را به وجود بیاورند. اگر می‌خواهید این تست‌ها برایتان غول بی‌شاخ و دم نباشد، بخش جاندارنامه در انتهای این کتاب را قورت بدید!

دستگاه عصبی جانوران



هیدر

- جانوری بی‌مهره که فاقد مغز، نخاع، طناب عصبی و عصب است.
- ساده‌ترین ساختار عصبی (شبکه عصبی) را دارد.
- شبکه عصبی، مجموعه‌ای از یاخته‌های عصبی پراکنده در دیواره بدن هیدر است که با هم ارتباط دارند.
- شبکه عصبی هیدر، ماهیچه‌های بدن را تحریک می‌کند.
- تحریک هر نقطه از بدن جانور، در همه سطح آن منتشر می‌شود.



پلاناریا

- دارای دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است.
- مغز آن شامل دو گره عصبی است. هر گره مجموعه‌ای از جسم یاخته‌های عصبی است.
- مغز و دو طناب عصبی متصل به آن در طول بدن جانور کشیده شده‌اند و با رشته‌هایی به هم متصل هستند. این مجموعه، بخش مرکزی دستگاه عصبی را تشکیل می‌دهد.



- جسم یاخته‌های عصبی حسی عصب نخاعی، خارج از نخاع (در ریشه پشتی) قرار دارد.
- جسم یاخته‌های و دارینه یاخته‌های عصبی حرکتی عصب نخاعی، در بخش خاکستری نخاع قرار دارد.
- ریشه پشتی عصب نخاعی دارای بخشی از دارینه، جسم یاخته‌های و بخشی از آسه است.
- ریشه شکمی عصب نخاعی فقط دارای بخشی از آسه نورون حرکتی است.


مشاوره اگر به سوالی برخورد کردید که مربوط به اعصاب بود، باید به این موارد دقت کنید:

- ۱- عصب حسی، حرکتی یا مختلط است؟
- ۲- اگر عصب از نوع حرکتی است، مربوط به بخش خودمختار است یا پیکری؟
- ۳- اگر اندام هدف عصب یک ماهیچه است، از چه نوعی است (صف، قلبی یا اسکلتی)؟

دستگاه عصبی محیطی

- مغز و نخاع را به بخش‌های دیگر (اندام‌های حس، ماهیچه‌ها، غده‌ها و ...) مرتبط می‌کند.
- شامل ۴۳ جفت عصب (۱۲ جفت مغزی و ۳۱ جفت نخاعی) است.
- هر عصب، مجموعه‌ای از رشته‌های عصبی است که درون بافت پیوندی قرار گرفته‌اند.
- دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش حسی و حرکتی است.
- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش پیکری و خودمختار است.

جمع‌بندی پلاس دستگاه عصبی محیطی



بخش پیکری


- پیام‌هارا به ماهیچه‌های اسکلتی می‌رساند. فعالیت این ماهیچه‌ها به صورت ارادی و غیرارادی (انعکاسی) تنظیم می‌شود.
- انعکاس، پاسخ سریع و غیرارادی ماهیچه‌های در پاسخ به حرکت است. برخی انعکاس‌ها مغزی و برخی دیگر نخاعی هستند.

انعکاس عقب کشیدن دست

- بر اثر برخورد دست با جسم داغ، یاخته عصبی حسی تحریک می‌شود و پیام عصبی را به نخاع می‌برد.
- آسه یاخته عصبی حسی در بخش خاکستری نخاع با دو یاخته عصبی رابط همایه برقرار می‌کند که هر دوی این همایه‌ها از نوع تحریک‌کننده هستند.
- یکی از یاخته‌های عصبی رابط با همایه تحریک‌کننده، پیام عصبی را به یاخته عصبی حرکتی مربوط به جلوی بازو انتقال می‌دهد و بر اثر آزاد شدن ناقل عصبی از یاخته عصبی حرکتی جلوی بازو، ماهیچه جلوی بازو (دوسر) به انقباض درمی‌آید. انقباض این ماهیچه، سبب حرکت ساعد به سمت بالا (عقب) می‌شود.
- همایه بین یاخته عصبی رابط دیگر با یاخته عصبی حرکتی مربوط به پشت بازو (سه‌سر) از نوع بازدارنده است؛ یعنی یاخته عصبی رابط با آزاد کردن ناقل عصبی مهاری، مانع از تحریک یاخته عصبی حرکتی مربوط به ماهیچه پشت بازو می‌شود. بنابراین ماهیچه سه‌سر در حالت استراحت باقی می‌ماند.
- همزمان با این انعکاس، پیام حسی به مغز نیز منتقل می‌شود که نتیجه آن درک داغی جسم است اما این مسیر، ارتباطی به انعکاس عقب کشیدن دست ندارد.

+ جمع‌بندی پلاس نورون‌های انعکاس عقب کشیدن دست

| نورون حسی | نورون‌های رابط | نورون حرکتی ماهیچه دوسر بازو | نورون حرکتی ماهیچه سه‌سر بازو |
|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| خارج از نخاع | مادة خاکستری نخاع | مادة خاکستری نخاع | مادة خاکستری نخاع |
| تحریکی | تحریکی / مهاری | تحریکی | — |
| هدایت پیام عصبی | محل تولید ناقل عصبی | نوع ناقل عصبی ترشحی | محل ترشح ناقل عصبی |



- در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست
- هر چهار همایه بین نورون‌ها در بخش خاکستری نخاع قرار دارند.
- همایه بین یاخته عصبی حرکتی و ماهیچه پشت بازو غیرفعال است. یعنی در این همایه، ناقل عصبی ترشح نمی‌شود.
- جسم یاخته‌های یاخته‌های عصبی رابط و یاخته‌های عصبی حرکتی در بخش خاکستری نخاع اما جسم یاخته‌های یاخته‌های عصبی حسی، در ریشه پشتی عصب نخاعی قرار دارد.
- دندریت یاخته‌های عصبی حرکتی فقط در بخش خاکستری نخاع قرار دارد؛ در حالی که دارینه یاخته عصبی حسی در عصب نخاعی و انتهای آن در ریشه پشتی عصب نخاعی قرار گرفته است.

از لقاح تا جایگزینی

- تقسیمات رشتمانی یاخته تخم، حدود ۳۶ ساعت پس از لقاح آغاز می‌شود.
- مورولا (توده پریاخته‌ای توپر)، تقریباً به اندازه یاخته تخم است و در لوله رحم به سمت رحم حرکت می‌کند.
- یاخته‌های حاصل از تقسیم تخم، بدون رشد به مورولا تبدیل می‌شوند.
- این توده پریاخته‌ای توپر پس از رسیدن به رحم، به بلاستوسیست تبدیل می‌شود که کره‌ای توخالی است و درون آن با مایعات پر شده است.
- بلاستوسیست دارای یک لایه یاخته‌ای بیرونی و یک توده یاخته‌ای درونی است.
- لایه بیرونی بلاستوسیست، تروفوبلاست نام دارد که بعداً برونشامه (پرده کوریون) را می‌سازد و برونشامه جنین همراه با بخشی از دیواره رحم، جفت را به وجود می‌آورد.
- توده یاخته‌ای درونی بلاستوسیست، حالت بنیادی دارد و منشأ بافت‌های مختلف تشکیل دهنده جنین محسوب می‌شود.
- از توده درونی، لایه‌های زاینده جنینی شکل می‌گیرند که هر کدام منشأ بافت‌ها و اندام‌های گوناگون است.
- یاخته‌های تروفوبلاست (لایه بیرونی بلاستوسیست) با ترشح آنزیم‌های هضم کننده، جدار رحم را تخریب و حفره ایجاد می‌کنند و پس از آن جایگزینی انجام می‌شود.
- در این مرحله، یاخته‌های جنینی مواد مغذی مورد نیاز خود را از بافت‌های هضم شده به دست می‌آورند.

بعد از جایگزینی



- پرده‌های محافظت‌کننده در اطراف جنین به وجود می‌آیند که مهم‌ترین آن‌ها درون‌شامه و برونشامه جنین نام دارند.
- برون‌شامه جنین (آمتيون) در حفاظت و تغذیه جنین نقش دارد.
- برون‌شامه جنین (کوریون) از تروفوبلاست به وجود می‌آید و در تشکیل جفت و بند ناف دخالت دارد. جفت، رابط بین بند ناف و دیواره رحم است.
- برون‌شامه جنین، یاخته‌های درون‌ریزی دارد که هورمون HCG ترشح می‌کنند. این هورمون به خون مادر وارد و سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح پروژسترون از آن می‌شود.
- هورمون HCG اساس تست‌های بارداری است. وجود این هورمون در خون مادر، از قاعده‌گی و تخم‌گذاری مجدد جلوگیری می‌کند.



- به طور طبیعی، ابتدا سر و سپس بقیه بدن از رحم خارج می‌شود.
- پس از خروج نوزاد، ادامه انقباض‌های رحم سبب خروج جفت و اجزای مرتبط با آن از رحم می‌شود.
- هورمون اکسی‌توسین با انقباض ماهیچه صاف غدد شیری، سبب خروج شیر می‌شود.
- ترشح هورمون‌های پرولاکتین و اکسی‌توسین، با بازخورد مثبت تنظیم می‌شود. افزایش این هورمون‌ها به ترتیب، باعث افزایش تولید و ترشح شیر می‌شود.

مشاوره مطابق معمول، مطالب مربوط به جانوران می‌توانند با هم ترکیب شوند و سوالات سخت‌تری را تشکیل دهند. سعی کنید با رسیدن به اسم هر جاندار، علاوه بر ویژگی‌های تولیدمثلی، سایر ویژگی‌های رانیز در ذهن خود مرور کنید. این کار معجزه می‌کندا

۴

تولیدمثل در جانوران


- اساس تولیدمثل در همه جانوران مشابه است.

جمع‌بندی پلاس ا نوع لقاد در جانوران +



نرماده (هرمافروdit)

- کرم‌های پهن (مانند کرم کبد) و کرم‌های حلقوی (مانند کرم خاکی) نرماده‌اند.
- جانور نرماده (هرمافروdit)، هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارد.
- در کرم‌های پهن، هر فرد تخمک‌های خود را بارور می‌کند.
- کرم‌های حلقوی لقاد دوطرفی دارند؛ یعنی دو کرم حلقوی (مثلاً کرم خاکی) در کنار هم قرار می‌گیرند، سپس زامه‌های هر کدام، تخمک‌های دیگر را بارور می‌سازد.



آزمون عبارات


- در هر یک از عبارت‌های زیر، مورد صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید:

 ۱. دوقلوهای (همسان/ناهمسان) در اثر جدا شدن یاخته‌های بنیادی بلاستوسیست ایجاد می‌شوند.
 ۲. جدار لقاحی، در نتیجه تغییر لایه (داخلی/خارجی) اطراف تخمک ایجاد می‌شود.
 ۳. در لوله‌های رحمی، (مخاط مژک‌دار/تغییرات قاعده‌گی) مشاهده نمی‌شود.
 ۴. هورمون HCG، موجب (رشد/حفظ) یاخته‌های ترشح‌کننده پروژسترون می‌شود.
 ۵. (بلاستوسیست/مورولا)، توده یاخته‌ای حاصل از تقسیمات تخم است که در لوله رحم حرکت می‌کند.
 ۶. غده‌های برون‌ریز دستگاه تولیدمثل مرد، (درون/بیرون) محوطه شکمی قرار دارند.
 ۷. در زنان، محل انجام دومین تقسیم کاستمانی، (لوله رحم/تخمدان) است.
 ۸. در مردان، زام یاخته (اولیه/ثانویه) یاخته تک‌لادی با فامتن‌های دوفامینیکی است.
 ۹. در هر انبانک نابالغ انسان، یاخته‌های تغذیه‌کننده، اطراف یک یاخته حاصل از (کاستمان/رشتمان) را فراگرفته‌اند.
 - درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید:

 ۱۰. بعضی یاخته‌های لوله‌های زامه‌ساز انسان، هورمونی تولید می‌کنند که محرک رشد اندام‌های جنسی است.
 ۱۱. زامه‌ها پس از کسب توانایی حرکت، لوله پیچیده و طویلی را ترک می‌کنند.
 ۱۲. پس از روز بیست و هشتم چرخه جنسی زن، میزان هورمون‌های FSH و LH شروع به افزایش می‌کند.
 ۱۳. همزمان با دفع خون قاعده‌گی، ممکن است ضخامت دیواره رحم در حال افزایش باشد.
 ۱۴. هر پادتن تولید شده توسط لنفوسيت‌های مادر، با عبور از جفت وارد خون جنین می‌شود.
 ۱۵. پلاتیپوس، فاقد اندام ماهیچه‌ای گلابی‌شکل برای حفاظت از جنین است.
 ۱۶. سیاهرگ‌های بند ناف، خون روشن را از جفت به جنین می‌رسانند.
 ۱۷. ضمن تبدیل یاخته تخم به مورو لا، به تدریج اندازه یاخته‌ها کوچک‌تر می‌شود.
 ۱۸. هنگام لقاح، آنزیم‌های آکروزوم، لایه‌های اطراف مام یاخته را هضم می‌کنند.
 ۱۹. پس از ورود زامه‌ها به وزیکول سمعیانی، مایع غنی از فروکتوز به آن‌ها اضافه می‌شود.
 ۲۰. به طور متوسط، کاهش ضخامت دیواره داخلی رحم حدود هفت روز طول می‌کشد.
 ۲۱. زامه در مقایسه با زام یاختک، هسته بزرگ‌تر و سیتوپلاسم کمتر دارد.
 ۲۲. هر هورمونی که در یاخته‌های غدد شیری زن گیرنده دارد، توسط غده‌ای تولید می‌شود که جمجمه در حفاظت از آن نقش دارد.
 ۲۳. هر دنای حلقوی موجود در یاخته تخم انسان، منشاً مادری دارد.
 ۲۴. هورمون FSH بر تمام مراحل زامه‌زایی تأثیرگذار است.
 ۲۵. از تقسیم یاخته‌های بنیادی بلاستوسیست، سه لایه زاینده جنینی حاصل می‌شود.
 ۲۶. گامت‌های طبیعی زنبر عسل می‌توانند بدون جدایی فامتن‌های همتا تشکیل شوند.
 ۲۷. ترشحات پروسهای موجب قلیایی شدن مسیر عبور زامه‌ها به سمت گامت ماده می‌شود.
 ۲۸. هر جانور نرماده، می‌تواند تخمک خود را بارور کند.

مشاوره بعد از پاسخ دادن به آزمون عبارات، خودتان را ارزیابی کنید:

- اگر کمتر از ۱۵ مورد را درست تشخیص داده‌اید، برگردید و یک بار دیگر درسنامه را بخوانید.
- اگر بیشتر از ۱۰ عبارت را بدون جواب گذاشته‌اید، باید کمی روی اعتماد به نفس‌تان کار کنید! نرسید، ریسک کنید و جواب مورد نظرتان را انتخاب کنید؛ مگر در مواردی که چیزی از مطلب نمی‌دانید.
- اگر بیشتر از ۲۵ مورد را درست تشخیص داده‌اید، مشخص است که همه کارهایتان را عالی انجام داده‌اید.
- بهتر است قبل از تسلط به درسنامه و آزمون عبارات، به سراغ تست‌ها نروید.



آزمون تستی

- ۱۸۱. کدام عبارت در مورد دستگاه تولیدمثلی زن درست است؟**
- (۱) بافت پوششی داخل رحم، مخاطی و مژکدار است.
 - (۲) موقع قاعده‌گی، مهم‌ترین شاخص کارکرد صحیح آن است.
 - (۳) دیواره داخلی رحم در دوران بارداری برخلاف قاعده‌گی، دچار تغییراتی می‌شود.
 - (۴) مام‌یاخته، یاخته‌ای است که در دوران جنینی و پس از تولد در تخمدان یافت می‌شود.
- ۱۸۲. کدام عبارت درست است؟**
- (۱) زنبورهای عسل نر ممکن است حاصل بکرزاوی و یا لقاح باشند.
 - (۲) بعضی ماهی‌های نر، زامه‌های خود را وارد دستگاه تناسلی فرد ماده می‌کنند.
 - (۳) در اسبک ماهی، پس از انجام لقاح درون حفره، یاخته‌ای تخم از بدن فرد نر آزاد می‌شود.
 - (۴) کرم کبد، جانوری نرماده است که در آن، تخمکها از طریق لقاح دوطرفی بارور می‌شوند.
- ۱۸۳. به طور معمول در انسان سالم و بالغ، قبل از —— جنین، ——**
- (۱) تشکیل سیاهرگ‌های بند ناف - بلاستوسیست به جداره رحم متصل می‌گردد.
 - (۲) شکل‌گیری لایه‌های زاینده - درون توده یاخته‌ای حاصل از تخم حفره ایجاد می‌شود.
 - (۳) به وجود آمدن پرده‌های اطراف - ساختار جفت تشکیل می‌شود.
 - (۴) ایجاد رابطه خونی مادر با - هورمون HCG ترشح نمی‌شود.
- ۱۸۴. در دستگاه تولیدمثل مرد، ——**
- (۱) هر زام‌یاخته اولیه دارای ۴۶ فامتن دوفامینکی است.
 - (۲) هورمون FSH در تولید زام‌یاخته اولیه همانند زامه نقش دارد.
 - (۳) هسته زامه‌ها، پس از رسیدن به مجرای لوله زامه‌ساز فشرده می‌شود.
 - (۴) یاخته‌های بینابینی، پشتیبانی زامه‌ها و بیگانه‌خواری باکتری‌ها را برعهده دارند.
- ۱۸۵. در دستگاه تولیدمثلی زنان سالم و بالغ، هر هورمونی که عامل اصلی ——، فقط —— ترشح می‌شود.**
- (۱) تخمک‌گذاری است - به منظور آزاد شدن دو یاخته با اندازه متفاوت از تخمدان
 - (۲) رشد انبانک‌های تخمدان است - در پاسخ به کاهش ضخامت دیواره داخلی رحم
 - (۳) رشد جسم زرد است - در مرحله انبانکی چرخه تخمدانی، تحت تأثیر بازخورد مثبت
 - (۴) آماده کردن رحم برای بارداری احتمالی است - توسط یاخته‌های انبانک در حال رشد
- ۱۸۶. در مردان سالم و بالغ، هر غده برون‌ریزی که در تولید مایع منی نقش دارد و ترشحات آن ——**
- (۱) مسیر عبور زامه‌ها را خنثی می‌کند، با دارینه‌های اعصاب خودمختار ارتباط دارد.
 - (۲) به مجرای لوله‌مانندی وارد می‌شوند، در خنثی کردن مسیر زامه‌ها مؤثر است.
 - (۳) انرژی لازم برای فعالیت زامه‌ها را تأمین می‌کنند، در مجاورت میزراه قرار دارد.
 - (۴) قبل از ترکیبات قلیایی به زامه‌ها اضافه می‌شوند، در پشت مثانه واقع شده است.
- ۱۸۷. به طور معمول در انسان، از تقسیم رشتمان هر یاخته مامه‌زا، یاخته‌ایی تولید می‌شوند که هر یک از آن‌ها**
- (۱) تقسیم خود را در مرحله پروفاز ۱ متوقف خواهند کرد
 - (۲) ۲۳ ساختار چهارفامینکی ایجاد خواهند کرد.
 - (۳) قابلیت مضاعف کردن فامتن‌های خود را دارند.
 - (۴) یک مجموعه فامتنی در هسته خود دارند.
- ۱۸۸. کدام گزینه، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟**
- «هر پرده محافظت‌کننده از جنین انسان که ——»
- (۱) به دیواره رحم می‌چسبد، تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی، توسعه پیدا می‌کند.
 - (۲) مانع از مخلوط شدن خون جنین و مادر می‌شود، در تشکیل بند ناف دخالت دارد.
 - (۳) در تشکیل جفت شرکت می‌کند، زوائد انگشت‌مانندی در دیواره رحم ایجاد می‌کند.
 - (۴) در تغذیه جنین نقش دارد، از تقسیم و تمایز یاخته‌های تروفوبلاست ایجاد شده است.



۱۸۹. کدام گزینه درباره هر زنبر عسل حاصل از بکرزایی، درست است؟

- ۱) رخ نمود حدواسط بعضی از صفات را بروز می دهد.
- ۲) عوامل محیطی می توانند باعث مضاعف شدنی در فامتن های آن شوند.
- ۳) دناهای هسته ای و راکیزهای خود را فقط از یک والد دریافت کرده است.
- ۴) پس از بلوغ، می تواند در برخی یاخته های خود، ساختار چهار فامینکی ایجاد کند.

۱۹۰. به طور طبیعی در مردان سالم و بالغ، یکی از هورمون های متوجه از هیپوفیز پیشین با اثر بر — می شود.

- ۱) نوعی غده درون ریز، سبب تولید زامه های متحرک

- ۲) نوعی یاخته غیر جنسی در خارج محوطه شکمی، منجر به تسهیل تمایز زامه ها
- ۳) یاخته های جنسی، سبب آزاد شدن آنزیم ها از کیسه موجود در سر آن ها
- ۴) لوله های زامه ساز، سبب ترشح پیک شیمیایی مؤثر بر ماهیچه ها و استخوان ها

پاسخ نامه تشریحی

پاسخ آزمون عبارات

۹. رشتمان / ابانک نابالغ شامل یک مام یاخته اولیه و یاخته های تغذیه کننده اطراف آن است. مام یاخته اولیه محصول رشتمان است.

۱۰. نادرست / هورمون تستوسترون که محرك رشد اندام های جنسی است، از یاخته های بینابینی ترشح می شود که بین لوله های زامه ساز قرار دارند (نه در خود این لوله ها).

۱۱. درست / زامه ها توانایی حرکت خود را در لوله های پیچیده و طویل به نام برخاگ کسب می کنند و سپس از آن خارج می شوند.

۱۲. نادرست / شروع افزایش ترشح این هورمون ها، در انتهای چرخه است.

۱۳. درست / قاعدگی حدود هفت روز طول می کشد، در حالی که کاهش ضخامت دیواره رحم تا اواسط هفته اول است. از آن به بعد، اگر چه قاعدگی ادامه دارد اما ضخامت دیواره رحم، کمی افزایش می یابد.

۱۴. نادرست / بعضی پادتن های تولید شده توسط مادر، وارد خون جنین می شوند.

۱۵. درست / اندام ماهیچه های گلابی شکل که از جنین محافظت می کند، رحم است؛ پلاتی پوس رحم ندارد.

۱۶. نادرست / سیاهرگ بند ناف حاوی خون روشن است و آن را به جنین می رساند؛ اما دقت کنید که بند ناف فقط یک سیاهرگ دارد!

۱۷. درست / در تشکیل مورو لا، یاخته ها فرصت رشد ندارند؛ بنابراین یاخته ها ضمن تقسیم، کوچک تر می شوند.

۱. همسان / دوقلوهای حاصل از یک بلاستوسیست، در واقع از یک یاخته تخم پدید آمدند و همسان محسوب می شوند.

۲. داخلی / پس از ادغام هسته زامه با هسته تخمک، لایه داخلی (ژله ای) اطراف تخمک بر اثر اضافه شدن ترکیباتی، به جدار لقاحی تبدیل می شود.

۳. تغییرات قاعدگی / سطح درونی لوله های رحمی (فالوب) را مخاط مژک دار می پوشاند. تغییرات قاعدگی در رحم رخ می دهند (نه در لوله های رحمی).

۴. حفظ / هورمون HCG از برونشامه جنین ترشح و با اثر بر جسم زرد، موجب حفظ آن می شود. پروژسترون هورمونی است که توسط جسم زرد ترشح می شود.

۵. مورو لا / توده یاخته ای که در لوله رحم حرکت می کند، مورو لا نام دارد. بلاستوسیست، پس از رسیدن توده یاخته ای به رحم تشکیل می شود.

۶. درون / غده های برونشامه تولیدگاه تولید مثل مرد (پروستات، وزیکول سمعینال و پیازی میزراهی) درون محوطه شکمی قرار دارند.

۷. لوله رحم / اولین تقسیم کاستمانی در تخدمان و دومین تقسیم کاستمانی در لوله رحمی (در صورت برخورد مام یاخته ثانویه با زامه) انجام می شود.

۸. ثانویه / زام یاخته اولیه، یاخته ای دولاد اما زام یاخته ثانویه یاخته ای تک لاد با فامتن های دوفامینکی است؛ چون از کاستمان ۱ حاصل می شود.



گزینه (۳): دیواره داخلی رحم طی دوران قاعده‌گی و بارداری دچار تغییراتی می‌شود.

۱۸۲. گزینه «۲» اغلب ماهی‌ها لقادح خارجی و بعضی از آن‌ها (مانند کوسه) لقادح داخلی دارند. در لقادح داخلی کوسه، زامه‌ها وارد دستگاه تولیدمثلی ماده می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۱): همه زنبورهای عسل ماده از لقادح و همه زنبورهای عسل نر از بکرزایی به وجود می‌آیند.

گزینه (۳): در اسپک ماهی، لقادح درون حفره‌ای در بدن فرد نر انجام می‌شود، اما یاخته تخم آزاد نمی‌شود؛ بلکه پس از طی مراحل رشد و نمو در بدن والد نر، نوزاد از آن خارج می‌شود.

گزینه (۴): کرم کبد لقادح دو طرفی ندارد و از طریق خودباروری تولیدمثل جنسی انجام می‌دهد.

۱۸۳. گزینه «۲» ایجاد حفره در توده یاخته‌ای حاصل از تخم، قبل از شکل‌گیری لایه‌های زاینده جنینی است.

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۱): قبل از تشکیل سیاهرگ بند ناف، بلاستوسيست در دیواره رحم جایگزین می‌شود.

دقت کنید که بند ناف یک سیاهرگ دارد.

گزینه (۳): ابتدا پرده‌های اطراف جنین تشکیل می‌شوند؛ سپس یکی از این پرده‌ها که برون‌شامه جنین نام دارد، همراه با بخشی از دیواره رحم، جفت را به وجود می‌آورد.

گزینه (۴): برای برقراری رابطه خونی بین جنین و مادر، باید جفت و بند ناف تشکیل شود. قبل از تشکیل این ساختارها، پرده‌های اطراف جنین مانند برون‌شامه جنین به وجود می‌آیند. برون‌شامه جنین، هورمون HCG را ترشح می‌کند

۱۸۴. گزینه «۲» هورمون FSH بر یاخته‌های سرتولی اثر می‌کند و این یاخته‌ها در تمام مراحل زامه‌زایی نقش دارند. پس هورمون FSH در تولید تمام یاخته‌ها از زام یاخته اولیه تا زامه نقش دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۱): زام یاخته اولیه از تقسیم رشتمان حاصل می‌شود. این یاخته هنگام تولید، دارای ۴۶ کروموزوم تک‌فامینکی است اما وقتی می‌خواهد

تقسیم شود، ۴۶ کروموزوم دوفامینکی دارد.

گزینه (۳): زامه‌ها پس از تولید به مجرای وسط لوله آزاد می‌شوند. یکی از تغییراتی که هنگام تبدیل زام یاخته به زامه صورت می‌گیرد، فشرده شدن هسته است.

گزینه (۴): یاخته‌های سرتولی، پشتیبانی زامه‌ها و بیگانه‌خواری باکتری‌هارا برعهده دارند (نه یاخته‌های بینابینی).

۱۸۵. گزینه «۳» هورمون LH عامل اصلی رشد جسم زرد است که افزایش یکباره ترشح آن در اواخر مرحله انبانکی تخدمان، تحت تأثیر بازخورد مثبت صورت می‌گیرد.

۱۸. نادرست / زامه‌ها می‌توانند از بین یاخته‌های لایه خارجی عبور کنند؛ آنزیم‌های آکروزوم فقط لایه داخلی را هضم می‌کنند.

۱۹. نادرست / وزیکول سمینال مایعی سرشار از فروکتوز ترشح می‌کند اما زامه‌ها وارد این غده نمی‌شوند.

۲۰. نادرست / قاعده‌گی هفت روز طول می‌کشد اما حدود نیمی از آن با کاهش ضخامت دیواره داخلی رحم همراه است.

۲۱. نادرست / هسته زامه کوچک‌تر (فسرده‌تر) از زام یاخته است.

۲۲. نادرست / هورمون‌های اکسی‌توسین و پرولاکتین که بر غدد شیری زن اثر می‌گذارند، به ترتیب توسط هیپوتالاموس و هیپوفیز تولید می‌شوند و هر دوی آن‌ها توسط جمجمه محافظت می‌شوند؛ اما دقیقاً کنید که هورمون‌های دیگری نیز در غدد شیری گیرنده دارند، مانند هورمون‌های تیروئیدی

۲۳. درست / دناهای حلقوی یاخته تخم مربوط به تحمل راکیزه‌هاست و همه راکیزه‌های یاخته تخم مربوط به تحمل است. چون راکیزه‌های زامه در قطعه میانی قرار دارند؛ در حالی که هنگام لقادح فقط سر زامه وارد تحمل می‌شودا

۲۴. درست / در مردان، هورمون FSH بر یاخته‌های سرتولی اثر می‌کند و این یاخته‌ها در تمام مراحل زامه‌زایی، نقش پشتیبانی و تغذیه یاخته‌های جنسی را برعهده دارند.

۲۵. درست / یاخته‌های توده یاخته‌ای درون بلاستوسيست، حالت بنیادی دارند و سه لایه زاینده جنینی را به وجود می‌آورند. این سه لایه، بافت‌های مختلف را به وجود می‌آورند

۲۶. درست / جدایی فامتن‌های همتا مربوط به تقسیم کاستمان است؛ در حالی که زنبور عسل نر با تقسیم رشتمان گامت تولید می‌کند.

۲۷. نادرست / ترشحات پروستات قلیایی است و مسیر عبور زامه را خنثی می‌کند.

۲۸. نادرست / کرم‌های پهنه (مانند کرم کبد)، جانوران نرم‌ماده‌ای هستند که تحملک‌های خود را بارور می‌کنند. کرم‌های حلقوی (مانند کرم خاکی)، نیز جانورانی نرم‌ماده‌اند اما لقادح دو طرفی دارند.

پاسخ آزمون تستی

۱۸۱. گزینه «۴» مام یاخته (اووسیت) در دوران جنینی درون تحملان تولید می‌شود و پس از تولد نیز تا زمان یائسگی در تحملان یافت می‌شود.


بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۱): سطح درونی رحم را لایه مخاطی می‌پوشاند اما رحم، مژک ندارد.

گزینه (۲): مهم‌ترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثل زن، نظم قاعده‌گی است، نه صرفاً وقوع آن.

زیست‌شناسی (۳)


موقع جمع‌بندی کتاب زیست دوازدهم، لازم است به نکات زیر توجه کنید:

- مباحث همانندسازی، رونویسی و ترجمه، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و ممکن است سؤال مقایسه‌ای از آن‌ها طرح شود.
- قبل از فصل ۱۴، لازم است ساختار فامتن‌ها (فصل ۶ یازدهم) و همچنین ساختار دنا (فصل ۱ دوازدهم) را یک بار سریع مرور کنید.
- فصل‌های ۵ و ۶ مهم‌ترین فصل‌های این کتاب هستند و احتمال این‌که برخی سؤالات آن‌ها ترکیبی از دو فصل باشند، بسیار زیاد است.
- فصل‌های ۷ و ۸، اگر چه ساده‌اند، اما مطمئن باشید که طراحان محترم کنکور توجه ویژه‌ای به آن‌ها خواهند داشت.






- جهت حرکت رنابسپارازها بر روی ژن‌های مختلف یک مولکول دنا و در نتیجه جهت رونویسی آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد.




- در یاخته‌های یوکاریوتی، رنای ساخته شده در هسته با رنایی که در سیتوپلاسم وجود دارد، متفاوت است.

تغییرات رنای پیک

- رنای پیک ممکن است در حین رونویسی و یا پس از آن دستخوش تغییراتی شود. یکی از این تغییرات، حذف بخش‌هایی از رنای پیک است.
- بعضی ژن‌های یوکاریوتی، دارای بخش‌های بیانه (اگزون) و میانه (اینترن) هستند.
- میانه‌ها، بخش‌هایی از ژن هستند که رونوشت آن‌ها از رنای پیک حذف می‌شود.
- بیانه‌ها، بخش‌هایی از ژن هستند که رونوشت آن‌ها در رنای پیک باقی می‌ماند.
- هنگام حذف هر رونوشت میانه، دو پیوند فسفودی‌استر شکسته می‌شود و سپس با تشکیل یک پیوند فسفودی‌استر، دو رونوشت بیانه به هم متصل می‌شوند.
- رنای نابالغ (اولیه) ساخته شده در هسته، دارای بخش‌های رونوشت بیانه و میانه است.
- رنای اولیه پس از حذف رونوشت میانه‌ها و اتصال رونوشت بیانه‌ها، تغییرات دیگری نیز می‌کند و به رنای بالغ تبدیل می‌شود.
- رنای بالغ که به سیتوپلاسم فرستاده می‌شود، فاقد رونوشت میانه‌هاست و به آن رنای سیتوپلاسمی نیز گفته می‌شود.




- اگر رنای بالغ را در کنار رشته‌الگوی ژن سازنده‌اش قرار دهیم، بخش‌هایی از رشته‌الگو به صورت حلقه‌هایی بیرون می‌زنند. این بخش‌ها میانه هستند و در رنای بالغ مکمل ندارند.





ساخته شدن همزمان چندین رنا از روی یک ژن

- بعضی ژن‌ها، مانند ژن‌های سازنده رنای رناتی در یاخته‌های تازه تقسیم شده، بسیار فعال‌اند؛ چون این یاخته‌ها باید تعداد زیادی از این نوع رنا را بسازند.




در رونویسی از این ژن‌ها:

- به طور همزمان، تعداد زیادی رنابسپاراز (همگی از یک نوع) از روی ژن رونویسی می‌گذند.
- آنزیم‌های رنابسپاراز، همگی از یک رشته ژن (رشته الگو) در حال رونویسی بوده و در مراحل مختلفی از رونویسی هستند.
- رناهای در حال رونویسی، اندازه‌های متفاوتی دارند. هر چه رنا به انتهای ژن نزدیک‌تر باشد، طول آن بیشتر است.

به سوی پروتئین





- به ساخته شدن پلی‌پپتید از روی اطلاعات رنای پیک، ترجمه گفته می‌شود.



مهر و ماه

- رنای ناقل تاخوردگی‌های مجددی پیدا می‌کند که ساختار سه‌بعدی را به وجود می‌آورد.



- رنای ناقل، بخشی به نام جایگاه اتصال آمینواسید دارد که آمینواسید انتهایی آن متصل می‌شود.
- بخش دیگری از رنای ناقل، پادرمزه (آنتریکدون) نام دارد که می‌تواند با رمزه‌ها (های) مکمل خود در رنای پیک، رابطه مکملی برقرار کند.

■ در همه رناهای ناقل، به جز در ناحیه پادرمزه‌ای، انواع توالی‌های مشابهی وجود دارند.

- تعداد انواع پادرمزه‌ها کمتر از رمزه‌های است که یکی از دلایل آن، نبود رنای ناقل برای رمزه‌های پایان است.


■ آنزیم‌های ویژه‌ای، براساس نوع توالی پادرمزه، آمینواسید مناسب را به جایگاه اتصال آن در رنای ناقل متصل می‌کنند. این فرایند نیازمند انرژی است.

- پادرمزه با رمزه رابطه مکملی دارد. مثلاً رمزه آمینواسید متیونین به صورت AUG است و رنای ناقل این آمینواسید دارای پادرمزه UAC است.

■ رنای ناقل با پادرمزه‌های AUU، AUC و ACU وجود ندارد.

مشاوره ترجمه، یکی از اساسی‌ترین موضوعات زیست‌شناسی کنکور است. علاوه بر دانستن جزئیات هر مرحله، باید به ترتیب آن‌ها نیز دقیق تر ترتیب کنید. مثلاً این ترتیب را به خاطر بسپارید:

- ① رنای ناقل مکمل وارد جایگاه A می‌شود.
- ② پیوند آمینواسید و رنا در جایگاه P شکسته می‌شود.
- ③ آمینواسید یا زنجیره پلی‌پپتیدی در حال ساخت، به جایگاه A منتقل می‌شود.
- ④ پیوندی پپتیدی در جایگاه A تشکیل می‌شود.
- ⑤ رناتن به اندازه یک رمزه به جلو حرکت می‌کند.
- ⑥ رنای ناقل فاقد آمینواسید از جایگاه E خارج می‌شود.





۱ هم‌توانی: در این حالت، افراد ناخالص اثر هر دو دگره را با هم بروز می‌دهند. برای نشان دادن رابطه هم‌توانی، دگره‌ها را با دو حرف بزرگ و متفاوت می‌نویسیم.

▪ مثلاً رنگ موی اسب اسب توسط دو نوع دگره (R و W) کنترل می‌شود. دگره R باعث ایجاد موی قرمز روی بدن اسب می‌شود و دگره W نیز عامل ایجاد موی سفید روی بدن این جانور است. افرادی که ژن نمود RR دارند فقط موی بدن قرمز و افراد WW فقط موی بدن سفید دارند. اما افراد RW روی بدن‌شان هم موی قرمز دارند و هم موی سفید؛ چون هیچ‌یک از این دو دگره نمی‌تواند اثر دیگر را بپوشاند و اثر هر دوی آن‌ها با هم ظاهر می‌شود.

۲ بارزیت ناقص: حالتی است که در آن، افراد ناخالص، حد واسط اثر دو دگره را بروز می‌دهند.

▪ برای نشان دادن بارزیت ناقص نیز دگره‌ها را با دو حرف بزرگ می‌نویسیم. مثلاً رنگ گل گیاه میمونی توسط دو دگره کنترل می‌شود. دگره R عامل قرمزی و دگره W عامل سفیدی رنگ گل است. گیاهان RR گل‌های قرمز و گیاهان WW گل‌های سفید دارند اما گیاهان RW گل‌های صورتی (حد واسط قرمز و سفید) تولید می‌کنند. تفاوت هم‌توانی و بارزیت ناقص همین است که در بارزیت ناقص، افراد ناخالص رخ نمود حد واسط دارند.

گروه خونی Rh

▪ براساس وجود یا فقدان نوعی پروتئین به نام پروتئین D در غشای گویچه‌های قرمز، افراد را به دو گروه Rh مثبت و منفی تقسیم می‌کنند. افراد دارای پروتئین D را Rh^+ و افراد فاقد این پروتئین را Rh^- می‌نامند.

▪ صفت گروه خونی Rh توسط دو ژن کنترل می‌شود که آن‌ها را دگره‌های Rh می‌نامند. ژن D باعث تولید پروتئین D می‌شود اما ژن d قادر به تولید این پروتئین نیست.

▪ نوع رابطه بین دگره‌های D و d از نوع بارز و نهفتگی است. یعنی اگر ژن نمود یک نفر Dd باشد، فقط اثر D بروز می‌کند.

▪ این دو ژن، جایگاه یکسانی در فام تن شماره ۱ دارند. با توجه به این که هر فرد به طور طبیعی در هر هسته یاخته دولاد خود دو فام تن شماره ۱ دارد، حالتهای زیر امکان‌پذیر است:

۱ خالص بارز: فردی است که هر دو فام تن شماره ۱ او دارای ژن D باشند؛ به عبارت دیگر این فرد دارای دو دگره D است و ژن نمود او به صورت DD نشان داده می‌شود. بدیهی است که این فرد در غشای گویچه‌های قرمز خود، پروتئین D را دارد و Rh^+ محسوب می‌شود.

۲ ناخالص: فردی است که یکی از فام تن های شماره ۱ آن دارای ژن D و دیگری دارای ژن d باشد. ژن نمود این فرد به صورت Dd نشان داده می‌شود. این فرد هم Rh^+ است و در غشای گویچه‌های قرمز خود پروتئین D را دارد.

۳ خالص نهفته: فردی است که هر دو فام تن شماره ۱ آن دارای ژن d باشند. ژن نمود این فرد به صورت dd نوشته می‌شود. این فرد Rh^- است و در غشای گویچه‌های قرمز خود پروتئین D را ندارد.

▪ در ارتباط با گروه خونی Rh، سه نوع ژن نمود (DD، Dd و dd) و دو نوع رخ نمود (Rh مثبت و Rh منفی) وجود دارد. افراد Rh^- قطعاً ژن نمود dd دارند اما افراد Rh^+ ممکن است Dd یا DD باشند. خباز کجا باید بفهمیم که فرد Rh^+ خالص است یا ناخالص؟ حتماً در سؤال، اطلاعاتی از والدین یا فرزندان داده می‌شود. اگر فرد Rh^+ دارای فرزندی Rh^- یا این که یکی از والدینش Rh^- باشد، می‌توان نتیجه گرفت که ژن نمود این فرد ناخالص (Dd) است.

مثال: زن و مردی Rh^+ ، فرزندی Rh^- دارند. در ارتباط با این صفت، حداکثر چند نوع ژن نمود در بین فرزندان آن‌ها می‌توان انتظار داشت؟



جواب: زن و مرد Rh مثبتی که فرزند Rh منفی دارند، هر دو ناخالص‌اند (Dd) و می‌توان آمیزش آن‌ها را به صورت مقابل نوشت:

$$Dd \times Dd \rightarrow DD + 2Dd + dd$$

 بنابراین در بین فرزندان آن‌ها، حداکثر سه نوع ژن نمود برای این صفت می‌توان انتظار داشت.

گروه خونی ABO

- گروه خونی ABO که آن را گروه اصلی خونی نیز می‌نامند، شامل چهار گروه خونی A، B، AB و O است. این گروه‌بندی بر مبنای بودن یا نبودن دو نوع کربوهیدرات به نام‌های A و B در غشای گویچه‌های قرمز است.
- جایگاه ژنی گروه خونی ABO در فامتن شماره ۹ قرار دارد. برای این صفت، سه نوع دگره وجود دارد:
 - ➊ دگره I^A که برای راحتی آن را به صورت A نشان می‌دهیم، آنزیمی می‌سازد که کربوهیدرات A را به غشای گویچه قرمز اضافه می‌کند.
 - ➋ دگره I^B که برای راحتی آن را به صورت B نشان می‌دهیم، آنزیمی می‌سازد که کربوهیدرات B را به غشای گویچه قرمز اضافه می‌کند.
 - ➌ دگره i که آن را به صورت O نشان می‌دهیم، قادر به ساختن هیچ‌یک از این دو آنزیم نیست.
- دگره A نسبت به O بارز است، یعنی در افرادی با ژن نمود AO، اثر دگره A بروز می‌کند. همچنین دگره B نیز نسبت به O بارز است، یعنی در افرادی با ژن نمود BO، اثر دگره B بروز می‌کند؛ اما دگره‌های A و B نسبت به هم، هم‌توان هستند. بنابراین در افرادی که ژن نمود آن‌ها AB است، اثر هر دو دگره با هم ظاهر می‌شود.
- در ارتباط با گروه‌های خونی ABO، چهار نوع رخ نمود (A، B، AB و O) و شش نوع ژن نمود (AA، AO، BB، BO، AA، AB و OO، BO، AB) وجود دارد. در جدول زیر اطلاعات مربوط به آن‌ها خلاصه شده است:

| نوع کربوهیدرات‌های غشای گویچه‌های قرمز | ژن نمودها | رخ نمودها |
|--|-----------|-----------|
| A | AA, AO | A |
| B | BB, BO | B |
| هم A، هم B | AB | AB |
| نه A، نه B | OO | O |

مثال زنی با گروه خونی A با مردی که گروه خونی B دارد ازدواج کرده و اولین فرزند آن‌ها دارای گروه خونی O شده است. گروه‌های خونی ممکن برای فرزندان این خانواده، کدام‌اند؟

جواب: با توجه به تولد فرزندی با گروه خونی O می‌توان نتیجه گرفت که زن و مرد هر دو ناخالص‌اند؛ یعنی زن AO و مرد BO است. ژن نمودهای ممکن برای فرزندان این زوج، به صورت زیر به دست می‌آید:

$$AO \times BO \rightarrow AB + AO + BO + OO$$

بنابراین هر چهار نوع گروه خونی اصلی ممکن است در بین فرزندان این خانواده دیده شوند.

انواع صفات

- صفاتی که جایگاه ژنی آن‌ها بر روی یکی از فامتن‌های غیرجنسی قرار دارد، صفات مستقل از جنس نامیده می‌شوند.
- صفاتی که جایگاه ژنی آن‌ها در یکی از فامتن‌های جنسی (X یا Y) قرار دارد، صفات وابسته به جنس نامیده می‌شوند. جایگاه ژنی بعضی صفات وابسته به جنس در فامتن X قرار دارد که در این صورت، صفت را وابسته به X می‌نامند. جایگاه ژنی بعضی دیگر از صفات وابسته به جنس، در فامتن Y گرفته است.
- هسته یاخته‌های پیکری طبیعی انسان، از هر فامتن غیرجنسی دو نسخه دارد. به عنوان مثال وقتی می‌گوییم جایگاه ژنی یک صفت بر روی فامتن شماره ۱ انسان است، منظورمان این است که یاخته‌های دولاد پیکر انسان دو نسخه از این ژن را دارند که بر روی دو فامتن شماره ۱ قرار گرفته‌اند.



ب-هموفیلی: مرد مبتلا به هموفیلی ($Y^h X^h$) است وزن سالم که پدری مبتلا به این بیماری داشته، ناقل هموفیلی ($X^H X^h$) است. پس می‌توان نوشت: $X^h Y \times X^H X^h \rightarrow X^H Y + X^h Y + X^H X^h + X^h X^h$ پسران سالم، نمی‌توانند ناقل بیماری وابسته به X باشند اما در این خانواده، پسر سالم می‌تواند ناقل فنیل‌کتونوری باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: دختران این خانواده از نظر هموفیلی یا فنیل‌کتونوری می‌توانند سالم یا بیمار باشند.

گزینه «۳»: ژن نمود پدر از نظر هموفیلی، $Y^h X^h$ و از نظر فنیل‌کتونوری، Aa است که هر دوی آن‌ها برای پسران این خانواده امکان‌پذیر است.

گزینه «۴»: همه دختران این خانواده، ژن هموفیلی را از پدر خود دریافت می‌کنند.

مثال ۱۱: از ازدواج مردی سالم و دارای گروه خونی AB با زنی سالم و دارای گروه خونی O . دختری زال (بیماری مستقل از جنس نهفته) و پسری هموفیل متولد گردیده است. در این خانواده، ممکن.....

۱) نیست دختری هموفیل و زال با گروه خونی B متولد شود.

۲) است پسری بارخ نمود مشابه پدر متولد شود.

۳) است دختری با بارخ نمود مشابه مادر متولد شود.

۴) نیست فرزندی با گروه خونی A و فاقد دگره بیماری متولد شود.

جواب گزینه ۱: در این خانواده، پدر و مادر از نظر زالی ناخالص‌اند؛ پس فرزندان آن‌ها می‌توانند مبتلا به این بیماری یا سالم باشند:

$Aa \times Aa \rightarrow AA + 2Aa + aa$
 $AB \times OO \rightarrow AO + BO$ گروه خونی فرزندان این زوج نیز می‌تواند A یا B باشد:
 اما دختر هموفیل دارای ژن نمود ($X^h X^h$) است و نمی‌تواند پدری سالم ($X^H Y$) داشته باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: برای این که رخ نمود یک پسر شبیه پدرش باشد، باید از نظر همه صفات مورد نظر مانند او باشد.

گروه خونی پدر AB است و هیچ‌یک از فرزندان نمی‌توانند گروه خونی مشابه پدر خود داشته باشند.

گزینه «۳»: دختر این خانواده نیز می‌تواند همانند مادر خود از نظر زالی و هموفیلی سالم باشد، اما نمی‌تواند گروه خونی مشابه مادرش داشته باشد.

گزینه «۴»: در این خانواده احتمال تولد فرزندی با گروه خونی A که فاقد دگره زالی (AA) و هموفیلی ($X^H X^H$ و $X^H Y$) است، وجود دارد.

سوالات تیپ ۵: دو صفت وابسته به جنس باهم

اگر دو صفت وابسته به جنس باهم در سؤال مطرح شده باشد، باید دگرهای آن‌ها را باهم روی فام تن X بنویسیم. فرض کنید در یک سؤال، دو بیماری وابسته به X نهفته مطرح شده‌اند؛ یکی هموفیلی که آن را با h و دیگری کوررنگی که آن را با a نشان می‌دهیم. در این صورت نحوه نوشتن ژن نمودها به صورت زیر است:

۱) مردان هموفیل و کوررنگ: $X_h^a Y$

۲) مردانی که به هموفیلی و کوررنگی مبتلا نیستند: $X_H^A Y$

۳) مردان هموفیل که کوررنگ نیستند: $X_h^A Y$

۴) مردان کوررنگ که هموفیل نیستند: $X_H^a Y$

۵) زنان مبتلا به هموفیلی و کوررنگی: $X_h^a X_h^a$

۶) زنان سالم و خالص از نظر هر دو بیماری: $X_H^A X_H^A$

آزمون جامع ۳ (دوازدهم)




۳۴۱. در نوعی الگوی گونه‌زایی که به دنبال رخدادهای زمین‌شناختی و ایجاد سدهای جغرافیایی روی می‌دهد،

- ۱) در پی یک سری تغییرات تدریجی، گونه‌های جدید ایجاد می‌شوند.
- ۲) جدایی تولیدمثلی، باعث توقف شارش ژن بین جمعیت‌ها می‌شود.
- ۳) جهش و شارش ژن، باعث افزایش سازگاری با محیط می‌شوند.
- ۴) در هر زیستگاه، جدایی تولیدمثلی منجر به گونه‌زایی می‌شود.

۳۴۲. در تنظیم رونویسی در اشرشیاکلای، می‌شود.

- ۱) منفی - اتصال لاکتوز به اپراتور منجر به رونویسی ژن‌های آنزیم‌ساز
- ۲) مثبت - حضور لاکتوز منجر به تولید آنزیم‌های لازم برای تجزیه آن
- ۳) مثبت - نبود مالتوز مانع از اتصال فعال‌کننده به بخشی از مولکول دنا
- ۴) منفی - نبود مالتوز موجب اتصال پروتئین تنظیمی به جایگاه اتصال آن

۳۴۳. با توجه به شکل رو به رو که به نوعی گیاه C_3 تعلق دارد، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟
نیاز چرخه کالوین را بخشی که با شماره نشان داده شده است می‌تواند «



- الف) ۱- در واکنش‌های وابسته به نور، NADH مورد نیاز چرخه کالوین را ایجاد کند.
 - ب) ۲- با فعالیت ژن‌های خود، آنزیم‌های پوستکساز را بسازد.
 - ج) ۳- با آزادسازی CO_2 از اسید چهار کربنی، قند سه کربنی بسازد.
 - د) ۴- با تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A، NADH تولید نماید.
- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| (۱) | (۲) | (۳) | (۴) |

در مقایسه با اینترفرون طبیعی، دارد.

- ۱) ژنتیک - خاصیت ضدیروسی قوی تری
- ۲) پروتئین - توالی آمینواسیدی متفاوتی
- ۳) ژنتیک - فعالیت بیشتری
- ۴) پروتئین - توانایی شناسایی آنتی ژن‌های کمتری را

۳۴۵. هر باکتری که بتواند برای ساختن ترکیبات آلی خود، از به عنوان منبع الکترون استفاده کند،

- ۱) ترکیبات غیر گوگردی - می‌تواند در پی تولید NAD^+ ، به طور مداوم ATP بسازد.
- ۲) آب - انرژی زیستی قابل استفاده خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می‌آورد.
- ۳) ترکیبات غیر گوگردی - انرژی نور خورشید را توسط باکتریوکلروفیل جذب می‌کند.
- ۴) ترکیبات غیر آلی - در غشای خود قادر رنگیزهای فتوسنتزی است.

۳۴۶. کدام یک از موارد زیر در مورد گریفیت درست است؟

- ۱) در زمان وی تصور می‌شد که عامل بیماری آنفلوانزا، نوعی باکتری به نام استافیلوکوکوس نومونیا است.
- ۲) در هر مرحله از آزمایش او که موش زنده ماند، در خون موش پوشینه باکتری مشاهده نمی‌شد.
- ۳) جانور مورد آزمایش او در صورت دارا بودن پوشینه موجب بیماری می‌شد.
- ۴) وی نتوانست به نحوه انتقال خصوصیات ظاهری در بین باکتری‌ها پی ببرد.

**۷ باکتری‌های گرمادوست**

- در چشم‌های آب گرم زندگی می‌کنند.
- آمیلاز و سایر آنزیم‌های آن‌ها پایداری بیشتری در برابر گرما دارند.
- **استرپتوكوکوس نومونیا**
- دارای دو نوع پوشینه‌دار (کپسول‌دار) و بدون پوشینه است که نوع پوشینه‌دار آن عامل بیماری سینه‌پهلو است.
- آزمایش‌های گریفیت و ایوری با استفاده از این باکتری انجام شد.
- در زمان گریفیت، تصور بر این بود که استرپتوكوکوس نومونیا عامل بیماری آنفلوانزا است!

۸ اشرشیا کلای

- قند مصرفی ترجیحی آن، گلوکز است.
- برای جذب و تجزیه لاکتوز به سه نوع آنزیم نیاز دارد.
- برای جذب و تجزیه مالتوز، به سه نوع آنزیم دیگر نیاز دارد.
- آزمایش مزلسون و استال بر روی دنای این باکتری انجام شد.

۹ ریزوبیوم

- از جانداران ثبیت‌کننده نیتروژن است و در خاک زندگی می‌کند.
- با گیاهان تیره پروانه‌واران (مانند سویا، نخود و یونجه)، همزیستی برقرار می‌کند.
- پس از مرگ این گیاهان یا برداشتن بخش هوایی آن‌ها، گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد می‌کنند.

۱۰ باکتری‌های آمونیاک‌ساز


- با تجزیه مواد آلی، آمونیاک (NH_4^+) تولید می‌کنند که به آمونیوم (NH_4^+) تبدیل می‌شود.

کاربرد باکتری‌ها در زیست‌فناوری

- ژن‌های سازنده بسیاری از مواد سازنده پلاستیک زیستی، از بعضی باکتری‌ها استخراج می‌شود.
- از باکتری‌های تخمیر‌کننده برای تولید محصولات تخمیری (نان، سرکه، فراورده‌های لبنی، خیارشورو...) استفاده می‌شود.
- برای تولید انبوه ژن یا فراورده‌های آن، ژن خارجی را به یاخته میزبانی مثل باکتری وارد می‌کنند.
- آنزیم‌های برش دهنده دنای از باکتری‌ها استخراج می‌شوند.
- برای مقاوم کردن گیاهانی مانند پنبه، سویا و ذرت در برابر آفت‌ها، ژن سازنده نوعی سم را از نوعی باکتری خاکزی استخراج می‌کنند.
- در مهندسی زنتیک، برای تولید هورمون انسولین، دو توالی ژنی را به طور جداگانه به دو باکتری وارد می‌کنند که یکی سازنده زنجیره A و دیگری سازنده زنجیره B است.

۱۱ یوکاریوت‌ها

- شامل چهار گروه از موجودات زنده هستند: آغازین، قارچ‌ها، گیاهان و جانوران
- انواع تک‌یاخته‌ای و پریاخته‌ای دارند.
- هسته مشخص و اندامک‌های غشادار (مانند راکیزه، دیسه، شبکه آندوپلاسمی و کافنده‌تن) و اندامک‌های بدون غشا (مانند رناتن و میانک) دارند.
- دنای هسته‌ای آن‌ها خطی است و در اتصال با پروتئین‌های هیستون قرار دارد.
- دنای سیتوپلاسمی آن‌ها حلقوی است و درون راکیزه و دیسه قرار دارد.



هیدر

- در آب شیرین زندگی می‌کند. در اطراف دهان خود، تعدادی بازو دارد.
- در سطح درونی حفره گوارشی خود، یاخته‌های تازک‌دار دارد.
- ساده‌ترین ساختار عصبی را دارد که شبکه عصبی نامیده می‌شود و دستگاه عصبی آن، تقسیم‌بندی مرکزی و محیطی ندارد.
- تحریک هر نقطه از بدن آن، در همه سطوح بدن منتشر می‌شود که نتیجه آن انقباض ماهیچه‌ها و حرکت بازوهاست.

عروس دریایی

- دارای ایمنی غیراختصاصی است.
- دارای اسکلت آب‌ایستایی است. این نوع اسکلت به حرکت کمک می‌کند و به بدن جاندار شکل می‌دهد. در این جانوران با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف حرکت می‌کند.

شقایق دریایی

- به صورت غریزی (انعکاسی) بازوها خود را در پاسخ به تحریک مکانیکی منقبض می‌کند.
- به دلیل نوعی رفتار یادگیری به نام عادی شدن (خوگیری)، به حرکت مداوم آب (محرك تکراری بدون سود یا زیان) پاسخی نمی‌دهد.

نرم‌تنان

- حلزون و صدف از نرم‌تنان هستند.
- حلزون، تنفسی ششی و اسکلت بیرونی دارد.
- ایمنی غیراختصاصی دارند.
- صدف‌ها، غذای خرچنگ‌های ساحلی به شمار می‌روند. این خرچنگ‌ها، صدف‌هایی با اندازه متوسط را ترجیح می‌دهند.

ستاره دریایی

- از خارپستان است و تنفس آب‌ششی دارد.
- یکی از جانورانی است که ساده‌ترین آب‌شش‌ها را دارد.
- آب‌شش‌های آن به صورت بر جستگی‌های کوچک و پراکنده پوستی هستند.
- پوست ستاره دریایی فقط از یک یاخته تشکیل شده است.
- در زیرپوست آن کانالی وجود دارد که مایعات درون انشعابات آن، گازهای تنفسی را با محیط مبادله می‌کند.
- لارو ستاره دریایی شفاف است.
- ایلیا مچنیکوف برای نخستین بار درون بدن لارو ستاره دریایی، یاخته‌های بیگانه‌خوار را مشاهده کرد.



سخت‌پستان

- سخت‌پستان با روش انتشار ساده، مواد دفعی نیتروژن‌دار را از آب‌شش‌ها دفع می‌کنند.
- اسکلت بیرونی (کمک به حرکت و وظیفه حفاظتی) دارند؛ بنابراین اندازه آن‌ها از حد خاصی بیشتر نمی‌شود.
- لقال داخلى دارند؛ بنابراین دستگاه تولیدمثلی با اندام‌های تخصص‌یافته برای لقال دارند.

آزمون‌های جامع

خوب رسیدیم به قسمت حساس کار! حالا باید خودتان را ارزیابی کنید.
دو آزمون استاندارد (کنکورهای سراسری ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) را در انتهای کتاب قرار داده‌ایم که
بتوانید با کمک آن‌ها، کم و کاستی‌هایتان را جبران کنید.

- به هر یک از آزمون‌های این کتاب در مدت ۳۶ دقیقه پاسخ بدهید.
- در پایان هر آزمون، درصدتان را با احتساب نمره منفی حساب کنید. نگران نباشید! عددی که به دست می‌آید، درصد کنکور شما نیست، بلکه میزان آمادگی فعلی شما را نشان می‌دهد و هنوز من توانید این عدد را ارتقا بدهید.
- هر سؤال و پاسخ تشریحی آن را به طور کامل بررسی کنید و نقاط قوت و ضعف‌تان را مشخص نمایید. بدیهی است که باید روی نقاط ضعفتان کار کنید.





آزمون جامع ۱۴ (کنکور سراسری ۱۳۹۹)



۳۹۱. کدام عبارت، درباره جانوری بی‌مهره‌ای صادق است که دستگاه عصبی مرکزی آن از مغز و دو طناب عصبی موازی تشکیل شده است؟

- ۱) مایعات واردشده به حفرات بدن را به کمک یاخته‌های یقه‌دار به حرکت در می‌آورد.
- ۲) به منظور تنظیم فشار اسمزی بدن خود، از واکوئول‌های انقباضی استفاده می‌کند.
- ۳) در ابتدای لوله‌های منشعب و مرتبط، منافذی برای تبادل گازهای تنفسی دارد.
- ۴) یاخته‌های حفره گوارشی آن، ذره‌های مواد غذایی را از طریق درون‌بری دریافت می‌کنند.

۳۹۲. کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در گیاهان، تنظیم کننده رشدی که به واسطه عامل چیرگی رأسی در جوانه‌های جانبی تولید و افزایش می‌یابد، شود.»

۱) نمی‌تواند باعث تأخیر در پیر شدن اندام‌های هوایی

۲) می‌تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته‌های تمایزیافته

۳) نمی‌تواند باعث تحریک تولید آنزیم‌های تجزیه کننده دیواره یاخته‌ها

۴) می‌تواند در شرایط نامساعد سبب کاهش عمل تعرق و مانع رویش دانه

۳۹۳. کدام مورد، در ارتباط با هورمون‌های FSH و LH یک دختر بالغ همواره درست است؟

۱) باعث تکمیل مراحل تخمکزایی می‌شوند.

۲) با سازوکار بازخورد منفی کنترل می‌گردند.

۳) بازیاد شدن ضخامت دیواره داخلی رحم، افزایش می‌یابند.

۴) تحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از مغز تنظیم می‌شوند.

۳۹۴. در خانواده‌ای که والدین هردو سالم‌اند، دختری فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین با گروه خونی B و پسری فاقد عامل انعقادی شماره هشت با گروه خونی A متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام فرزند در این خانواده معکن است؟

۱) پسری با گروه خونی O و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و دارای آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین

۲) پسری با گروه خونی AB، دارای عامل انعقادی شماره ۸ و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین

۳) دختری با گروه خونی O و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین و دارای عامل انعقادی شماره ۸

۴) دختری با گروه خونی AB و فاقد عامل انعقادی شماره ۸ و دارای آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین

۳۹۵. چند مورد در ارتباط با طریقة عمل سیانید بر یاخته جانوری صحیح است؟

الف - ابتدا بر تجزیه NADH تأثیر می‌گذارد.

ب - مانع تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) می‌شود.

ج - آنزیم ATP ساز موجود در غشای خارجی راکیزه (میتوکندری) را غیرفعال می‌کند.

د - از پعپ شدن پروتون‌ها به فضای داخلی راکیزه (میتوکندری) ممانعت به عمل می‌آورد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۳۹۶. کدام عبارت در ارتباط با انسان صحیح است؟

۱) در همه افراد، بروز یک ویژگی خاص همواره ناشی از حضور دو دگره (الل) است.

۲) اثر دو دگره (الل) مربوط به دو فامتن (کروموزوم) غیرجنسی، می‌تواند همراه با هم ظاهر شود.

۳) دو نوع کربوهیدرات، با حضور دو نوع دگره (الل) موجود در غشای گوییچه‌های قرمز تولید می‌شوند.

۴) وجود پروتئین D بر غشای گوییچه‌های قرمز به طور حتم وابسته به حضور دو دگره (الل) یکسان است.


۳۹۷. کدام مورد، درباره جانوران مهره‌داری صادق است که هر دو نوع خون موجود در قلب آن‌ها، همراه با هم وارد رگی می‌شود که ابتدا به دو شاخه تقسیم می‌گردد؟

۱) همانند پرندگان، کلیه‌های آن‌ها توانمندی زیادی در بازجذب آب دارند.

۲) برخلاف خزندگان، ابتدایی ترین طناب عصبی شکمی را دارند.

۳) برخلاف خزندگان، به کمک مویرگ‌های زیر پوستی هم، به تبادلات گازی می‌پردازند.

۴) همانند پرندگان، نسبت به سایر مهره‌داران، انرژی بیشتری را به هنگام حرکت مصرف می‌کنند.


۴۲۴. کدام عبارت در ارتباط با بدن انسان، تادرست است؟

- (۱) فاصله کلیه راست تا مثانه بیش از فاصله کلیه چپ تا مثانه است.
- (۲) تعداد لوب‌های شش راست بیش از تعداد لوب‌های شش چپ است.
- (۳) به هنگام دم، نیمه چپ دیافراگم پایین‌تر از نیمه راست آن قرار می‌گیرد.
- (۴) قطر رگ لنفی نیمه راست که به سیاهرگ زیر ترقوه‌ای می‌پیوندد، کمتر از قطر رگ مشابه در نیمه چپ است.

۴۲۵. در ارتباط با وسیع‌ترین بخش ساقه اصلی (تنه) یک درخت ۵۰ ساله، کدام مورد صحیح است؟

- (۱) دو نوع مریستم پسین دارد.
- (۲) قادر یاخته‌هایی با دیواره چوب‌پنبه‌ای است.
- (۳) در هدایت شیره خام گیاه قادر نقش اصلی است.
- (۴) یاخته‌های پارانشیم و عدسک‌های فراوان دارد.

۴۲۶. به هنگام تعزیزی یک مولکول گلوکز، طی اولین مرحله تنفس در یاخته ماهیچه‌ای انسان و به منظور تولید هر ترکیب غیرقندی سه کربنی دوفسفاته، کدام مورد به ترتیب تولید و مصرف می‌شود؟

- (۱) 2ADP^+ و 1NAD^+
- (۲) 2ATP و 2NADH^-
- (۳) 2NAD^+ و 1ATP
- (۴) 1NAD^+ و 2ADP

۴۲۷. در ارتباط با هر مولکول حامل اطلاعات وراثتی در یوکاریوت‌ها، کدام مورد صحیح است؟

- (۱) هر رشته آن دو سر متفاوت دارد.
- (۲) همانندسازی آن در دو جهت انجام می‌گیرد.
- (۳) واحدهای سه‌بخشی آن توسط نوعی پیوند بهم متصل می‌شوند.
- (۴) تعداد جایگاه‌های همانندسازی آن بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می‌شود.

۴۲۸. چند مورد، درباره همه موادی صحیح است که توسط یاخته‌های دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت‌ها به خوتاب (پلاسمما) وارد می‌شوند؟

- (الف) توانایی اتصال به غشای یاخته بیگانه را دارند.
- (ب) به عنوان گیرنده‌های دفاع اختصاصی عمل می‌کنند.
- (ج) بر فعالیت مولکول‌هایی مؤثرند که در تپ بسیار بالا تغییر ساختار می‌دهند.
- (د) به کمک ساختارهای حلقه‌مانند باعث مرگ یاخته می‌شوند.

- (۱) ۴
- (۲) ۳
- (۳) ۲
- (۴) ۱

۴۲۹. کدام عبارت، درباره ساختار پروتئین قرمز رنگ موجود در تار ماهیچه‌ای کند انسان، صحیح است؟

- (۱) بخشی که دارای اتم آهن مرکزی است، جزیی از زنجیره پیتیدی آن محسوب می‌شود.
- (۲) زنجیره‌های تاخورده آن، از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
- (۳) همه آمینواسیدهای موجود در ساختار دوم، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند.
- (۴) در یک زنجیره، گروه CO_2 یک آمینواسید به گروه NH_2 آمینواسید غیرمجاورش نزدیک و پیوند برقرار می‌نماید.

۴۴۰. بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگ‌های ناپیوسته خون‌رسانی می‌شود و تعدادی از یاخته‌های آن حالت بنیادی دارند، در کدام مورد نقش ندارد؟

- (۱) انتقال گازهای تنفسی
- (۲) بیگانه‌خواری همه انگل‌های فعل
- (۳) بروز نوعی اختلال دستگاه ایمنی
- (۴) ترشح عامل تنظیم‌کننده تولید گوییچه‌های قرمز

آزمون جامع ۵ (کنکور سراسری ۱۴۰۰)


۴۴۱. خارجی‌ترین یاخته‌های استخوانی موجود در تنہ استخوان ران یک فرد سالم چه مشخصه‌ای دارند؟

- (۱) در مجاورت خود رگ‌های خونی و رشته‌های عصبی و مغز قرمز دارند.
- (۲) در سمت داخل یاخته‌هایی پهن و نزدیک به هم واقع شده‌اند.
- (۳) بر روی دایره‌ای با مرکزیت مجرای هاورس قرار گرفته‌اند.
- (۴) در بین یاخته‌های خود، حفره‌های نامنظم زیادی دارند.



پاسخ‌نامه تشریحی

سراسری ۱۳۹۹



هیپوفیز پیشین توسط هورمون‌های آزاد کننده و مهارکننده تنظیم می‌شود که توسط بخشی از مغز (هیپوتالاموس) ترشح می‌شوند.

نقدهای کنکور ارشح هورمون‌های FSH و LH توسط یک نوع هورمون هیپوتالاموسی تنظیم می‌شود که آن هم نوعی هورمون آزاد کننده است. به عبارت دیگر، برای FSH و LH مهارکننده هیپوتالاموسی وجود ندارد بنابراین گزینه (۴) این تست از نظر علمی نمی‌تواند درست باشد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۱): هورمون‌های FSH و LH در تکمیل روند تخمک‌زایی نقش دارند، اما در یک دختر بالغ، همواره روند تخمک‌زایی تکمیل نمی‌شود. برای تکمیل فرایند تخمک‌زایی، تماس زامه با مام یا ختنه ثانویه ضروری است.

۱. دقت کنید در هر دوره جنسی، هورمون FSH باعث رشد و هورمون LH نیز باعث تکمیل کاستمان ۱ در حدود نیمه دوره جنسی می‌شود.

گزینه (۲): تنظیم ارشح هورمون‌های FSH و LH در چرخه جنسی به دو طریق بازخورد منفی و مثبت انجام می‌شود. گزینه (۳): افزایش ضخامت دیواره داخلی رحم در مرحله فولیکولی همزمان با افزایش هورمون LH صورت می‌گیرد. اما در همین زمان مقدار هورمون FSH در حال کاهش است علاوه بر آن، همزمان با افزایش ضخامت دیواره داخلی رحم در مرحله جسم‌زردی، ارشح هورمون‌های FSH و LH در حال کاهش است.

گزینه (۴): در این سؤال، سه صفت مطرح است که عبارت‌اند از:

- فنیل‌کتونوری: با توجه به سالم بودن والدین و تولد دختری که فاقد آنژیم تجزیه‌کننده فنیل‌آلاتین است، می‌توان نتیجه گرفت که هر دوی والدین ناقل فنیل‌کتونوری (دارای ژن نمود Aa) هستند. پس در این خانواده، تولد فرزندان سالم (AA و Aa) و مبتلا (aa) به فنیل‌کتونوری ممکن است.

- انعقاد خون: با توجه به تولد پسری هموفیل از والدین سالم، ژن نمود پدر (X^HY) و ژن نمود مادر (X^HX^h) است. پس در این خانواده، تولد پسر سالم، دختر سالم و پسر بیمار امکان دارد، اما تولد دختری مبتلا به هموفیلی (فاقد عامل انعقادی شماره ۸) ممکن نیست.

۳۹۱. گزینه (۴): جانوری مهره‌ای که دستگاه عصبی مرکزی آن از مغز و دو طناب عصبی موازی تشکیل شده، پلاتاریا است و حفره گوارشی دارد. یاخته‌های پوشاننده حفره گوارشی، ذره‌های غذایی را از طریق درون بری دریافت می‌کنند.

۲. دقت کنید فقط بعضی از جانوران دارای نفریدی، حفره گوارشی دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۱): یاخته‌های یقه‌دار در پلاتاریا وجود ندارند. گزینه (۲): واکونول‌های انقباضی در بعضی از آغازیان (مثل پارامسی) دیده می‌شوند و در جانوران وجود ندارند. گزینه (۳): حشرات، تنفس نایدیسی دارند. نایدیس‌ها لوله‌های منشعب و مرتبط به هم هستند که در ابتدای آن‌ها منافذی برای تبادل گازهای تنفسی وجود دارد.

۳. تذکر هیچ‌یک از حشرات، سامانه دفعی نفریدی ندارند.

۳۹۲. گزینه (۱): عامل چیرگی رأسی، هورمون اکسین است که باعث افزایش تولید و ارشح اتیلن در جوانه‌های جانبی می‌شود.

۴. تجھ عامل چیرگی رأسی (هورمون اکسین)، سبب کاهش تولید سیتوکینین و افزایش تولید اتیلن در جوانه‌های جانبی می‌شود.

۵. دقت کنید هورمونی که پیر شدن اندام‌های هوایی را به تأخیر می‌اندازد، سیتوکینین است (نه اتیلن).

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۲): سیتوکینین سبب ایجاد ساقه از یاخته‌های تمایز نیافته می‌شود (نه اتیلن).

گزینه (۳): اتیلن در ریزش برگ‌ها نقش دارد که طی آن لایه جدا کننده در دمبرگ تشکیل می‌شود. یاخته‌ها در این منطقه به علت فعالیت آنژیم‌های تجزیه‌کننده دیواره یاخته‌ها از هم جدا می‌شوند. گزینه (۴): هورمونی که در شرایط نامساعد سبب کاهش عمل تعرق و جلوگیری از رویش دانه می‌شود، آبیزیک‌اسید است (نه اتیلن).

۳۹۳. گزینه (۴): هورمون‌های FSH و LH توسط هیپوفیز پیشین ارشح می‌شوند. فعالیت ارشحی



سپس پوستک خارج می‌شود (تعرق) و با ایجاد مکش تعریق به جریان تودمای مواد در آوندهای چوبی کمک می‌کنند بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۲): اصلی‌ترین یاخته‌های سامانه‌ها بافت آوندی، آوندهای چوبی و آبکش هستند که از بین آن‌ها، لیگنین فقط در دیواره یاخته‌های اصلی آوندهای چوبی رسوب می‌کند.

گزینه (۳): سامانه زمینه‌ای در جایه‌جایی شیره خام در سراسر گیاه نقشی ندارد. گزینه (۴): رایج‌ترین بافت در سامانه زمینه‌ای، بافت پارانشیمی است. پارانشیم سبزی‌نده‌دار به فراوانی در اندام‌های سبز گیاه مانند برگ دیده می‌شود.

نه درون سبزی‌سه‌ها ساختارهای غشایی و کیسه‌مانندی به نام تیلاکوئید وجود دارند که به هم متصل‌اند.

۴۴۲. گزینه (۴): قند پنج کربنی دوفسفاته در آخرین مرحله چرخه کالوین تولید می‌شود، اما در این مرحله گروه فسفات آزاد نمی‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۱): در تنفس یاخته‌ای، تولید مولکول پنج کربنی از شش کربنی با آزاد شدن CO_2 همراه است (چرخه کربس). ضمن مصرف این مولکول و تشکیل مولکول چهار کربنی نیز CO_2 آزاد می‌شود.

گزینه (۲): ورود پیرووات به راکیزه از طریق انتقال فعال انجام می‌شود. انتقال فعال به کمک پروتئین غشایی انجام می‌شود.

گزینه (۳): تولید ATP از طریق سنتز آبدی صورت می‌گیرد. بنابراین همراه با ساخته شدن ATP، مولکول آب نیز تولید می‌شود.

۴۴۴. گزینه (۲): درونی‌ترین لایه دیواره قلب انسان درون‌شame (آندوکارد) نام دارد که دارای چین‌خوردگی‌های مختلفی است که بعضی از آن‌ها در ایجاد دریچمه‌های قلب نقش دارند.

نه درون‌شame سطح داخلی حفره‌های قلب را می‌پوشاند و از لایه نازکی از بافت پوششی سنتگرفشی ساده تشکیل شده است.

بررسی تک‌تک موارد: الف (نادرست): بعضی از چین‌خوردگی‌ها در سطح درونی حفرات قلب و بعضی دیگر در ساختار دریچمه‌های قلب قرار دارند. پس چین‌خوردگی‌های درون‌شame ساختارهای یکسانی را به وجود نمی‌آورند.


ب (درست): یاخته‌های بافت پوششی بسیار به هم نزدیک‌اند. ج (نادرست): صفحات بینابینی در ساختار ماهیچه قلب

نه دقت کنید همه انگل‌های زنده و فعل، لزوماً قبلی بیگانه‌خواری نیستند! به همین دلیل اثوزینوفیل‌ها محتویات دائم‌های خود را بروی انگل‌های بزرگ می‌ریزند.

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۱): گویچه‌های قرمز در مغز استخوان تولید می‌شوند و در انتقال گازهای تنفسی (اکسیژن و کربن دی‌اکسید) نقش دارند. گزینه (۳): خودایعنی، نوعی اختلال در دستگاه ایمنی است که در آن، گویچه‌های سفید به یاخته‌های خودی حمله می‌کنند و محل تولید گویچه‌های سفید، مغز استخوان است. گزینه (۴): افزایش یا کاهش تولید گویچه‌های قرمز در میزان تولید و ترشح هورمون اریتروپویتین از کبد و کلیه مؤثر است.

۱۴۰۰ سراسری

۴۴۱. گزینه (۲): در تنہ استخوان دراز، بافت استخوانی متراکم در سمت خارج و بافت استخوانی اسفنجی در سمت داخل قرار دارد. یاخته‌های بافت استخوانی متراکم در تماس با بافت پیوندی قرار دارند که یاخته‌های آن پهنه و نزدیک هم هستند.



بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه (۱): مغز قرمز در حفرات بافت استخوانی اسفنجی قرار دارد و نمی‌تواند در مجاورت سطحی‌ترین یاخته‌های موجود در تنہ استخوان ران قرار داشته باشد.

گزینه (۳): در سامانه هاورس، یاخته‌های استخوانی بر روی دایره‌هایی با مرکزیت مجرای هاورس قرار دارند.

نه دقت کنید خارجی‌ترین یاخته‌های استخوانی موجود در تنہ استخوان دراز، جزء سامانه هاورس نیستند و در دایره‌های سامانه هاورس قرار ندارند.

گزینه (۴): حفره‌های نامنظم در بافت استخوانی اسفنجی وجود دارد (نه متراکم).

۴۴۲. گزینه (۱): سامانه پوششی برگ خرزه‌ه، روپوست نام دارد. مقداری آب به صورت بخار از یاخته‌های روپوستی و