

# مقدمه ناشر

## سلام رفقا، چه خبر؟

داشتم به این فکر می‌کردم که تو کنکور چه بخوای چه نخوای، حتماً یه چیزی درسته یه چیزی غلط، اما واقعاً تو زندگی هم این جو ریه؟ یعنی میشه مثل این کتاب بشینیم و مشخص کنیم تک‌تک کارهای من درسته یا نه! من که میگم نمیشه ... تازه اگر هم بشه، آیا چیزی که واسه من درسته و واسه یه نفر دیگه هم درسته؟! مثلاً اگه رشتہ پژشکی واسه من انتخاب درستیه، آیا واسه دوست من هم انتخاب درستیه؟ یا اصن درست‌بودن یعنی چی؟ اصن از کجا میشه فهمید کی موفق‌تره و کاردست‌تره؟ می‌دونید خب حتماً این که تو زندگی بتونی مسیر درست و نادرست رو از هم تشخیص بدی خیلی مهمه، اما شاید مهم‌تر از فهمیدن درست و نادرست، تکرارنکردن اون کارهای صدرصد نادرست و خوشحال‌بودن خود آدم تو مسیر زندگیه!

به قول حامد بهداد:

«لذت می‌برم از زیستن حتی به غلط! پشمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو! وجود داشتم، به غلط! اصن کی تعیین می‌کنه درست و غلط چیه؟ پشمونی برای چی؟ برای این که زنده موندم؟ یا اصن یه فیلم بد بازی کردم؟ یا یه فیلم خوب بازی کردم؟ یا یه رفتارم در جامعه غلط بوده؟ کی تعیین می‌کنه اینا رو ...؟! از لابه‌لای همین دست و پا زدن‌های غلط که شاید شما انتظار پشمونی از صاحب رو داری، یهو پختگی از اون‌جا در میاد. چه قوی زیبایی که جوجه اردک رشتی بود! چه پروانه‌ها که توی پیله بود! هر چه رشتتر، زیباتر! هر چه سیاهتر، سپیدتر!»

حالا قضابت در مورد این حرف‌ها با شما! صرفاً خواستم بگم که از اشتیاه‌کردن تو زندگی نترسید؛ چرا که مسیر موفقیت از همین جا می‌گذرد! 😊

در واقع، هدف این کتاب هم اینه که اشتباه کنید تا یاد بگیرید و پیشرفت کنیدا از این حرف‌ها که بگذریم، کتابی که قراره بخونید، حاصل کار گروهی حسین و فرشاد عزیز با رتبه‌های برتر کنکورها مسلماً ترکیب تجربه و دانش با خلاقیت و جوانی، نتیجه خوبی داره!! از همه‌تون بی‌نهایت سپاس‌گزارم!

از دوستان عزیزم، احسان عزیزآبادی و حسین نصراللهی بابت نظرات کارشناسی‌شون در مورد طرح و ایده کلی این کتاب بسیار ممنونم.

از خانم خردمند و سعیدی نیز بابت پیشنهادهای خوبشان تشکر می‌کنم. سپاس فراوان از هدی ملکپور عزیز به خاطر دلسوزی، مهربانی و همه کارهای خوبش برای به ثمر رسیدن این کتاب و البته خانم انسیه میر جعفری برای زحماتش در شروع پروژه! و در نهایت یک تشکر ویژه از همه بچه‌های دوست‌داشتنی خیلی سبزا!

از اشتباه‌کردن نترس!



تقلیم به همه ازایی که می خوان  
مسیر کنکور رو با ساختگوشی طی کنن  
و ته لین مسیر شیمی کنکور رو بترکون!



# مقدمه مولفان

## سلام به همه دوستان خوبم!

از چند سال پیش تا الان که وارد حیطه تألیف شدم، کتاب‌های متفاوتی را نوشتم! کتاب‌هایی که بعضی‌اشون در نوع خودشون بی‌نظیر بودن و تونستن توجه طیف گسترده‌ای از بجهه‌ها رو به خودشون جلب کنن. در طول این مدت، بین همه کتاب‌های رنگارنگ و متنوع کنکور، حس می‌کردم جای یک کتاب که ۲۲تا ویژگی مهم زیر رو داشته باشه خالیه:

- ۱- کتابی که به طور اختصاصی روی حفظیات و مفاهیم شیمی در قالب عبارات سطح بالا تمرکز داشته باشه!
  - ۲- کتابی که در مراحل تألیف اون، از تجربیات و مهارت علمی رتبه‌های باحال و برتر کنکور استفاده شده باشه!
- به خاطر همین ویژگی‌ها بود که بعد از کنکور ۱۴۰۰، با جمعی از رتبه‌های باحال و برتر کنکور چند سال اخیر صحبت کردم و ازشون خواستم که در تألیف این کتاب به ما کمک کنن! در مراحل تألیف این کتاب، دوستان خوب من از جمله فرهنگ امیری، پارسا مرندی، سعیده محبی، بهنام برهانی، محمدحسین فلاحت، یوسف هوتكانی، مبینا کیان‌مهر، امیرمحمد خدادادی، نیما ابوالحسنی، سودا زینعلی، یگانه کریمی، امیرحسین حسن‌نژاد، امیرضا کریمی و ساحل امینی، با ما همکاری کردن و فکر می‌کنم طی این فرایند، محتوایی تولید شده که تا سال‌های دور و دراز می‌تونه به بچه‌های کنکوری کمک کنه.
- مثل همیشه، توی تألیف این کتاب هم افراد زیادی به طریق مختلف به من کمک کردن! تشکر می‌کنم از دکتر سید آرمان موسوی‌زاده، دکتر کمیل نصری و آقای ایمان سلیمان‌زاده که حامی همیشگی من بودن و تشکر می‌کنم از همه اعضای هیئت مدیره گروه ماز که در مراحل تألیف این کتاب، مایه دلگرمی من بودن! در انتهای، باید یک تشکر ویژه بکنم از خانم انسیه میرجعفری و هدی ملک‌پور و ویراستارهای خوب این کتاب که به تک‌تک مراحل تألیف اون کمک شایانی کردن.

اردیبهشت ۱۴۰۱ - بیمارستان قلب الزهرا شیراز

دکتر فرشاد هادیان‌فرد، مسئول دپارتمان شیمی گروه ماز

farshad\_hf\_

## سلام و درود!

از وقتی که سروکله تست‌های چندموردی در کنار تست‌های کلاسیک چهارگزینه‌ای پیدا شد، همواره یه قسمتی از ذهنم به فکر نوشتن یک کتاب تخصصی برای عبارت‌ها بود. تا این که قسمت شد در کنار دوست و همکار عزیزم، دکتر فرشاد هادیان‌فرد و جمعی از نخبگان کنکورهای سراسری سال‌های اخیر، در تالیف این کتاب سهیم باشم.

کتاب ما این جویی! ده فصل مطابق با فصل‌های کتاب‌های درسی دهم تا دوازدهم و یک فصل شامل عبارت‌هایی از جنس مسئله داریم. در عبارت‌های این کتاب، خط به خط! کتاب درسی را بررسی کردیم و از عبارت‌های ساده تا دشوار و مبهم کنکور و حتی عبارت‌های فضایی فراتر از کنکور را (این آخری رو برای عاشقان بی‌پروگرد شیمی!) پوشش دادیم؛ تا با همه نوع عبارت مواجه شوید و دیگه دغدغه‌ای برای عبارت‌های کنکور نداشته باشید! پاسخ‌نامه این کتاب، کاملاً مختصر و مفید تألیف شده و هر جایی که نیاز بوده، برای افزایش سرعت در تست‌زنی، فرمولی کار راه انداز آورده‌ایم. علاوه بر این‌ها ویژگی‌های عناصری که در کتاب درسی به طور پراکنده آمده است؛ در پاسخ‌نامه این کتاب در قالب نمودارهای درختی به سیک مازل راه شده است.

### اما شرح مختصر آیکون‌های کتاب!

در قسمت عبارت‌ها:

در قسمت عبارت‌ها:

: عبارت از نکات ریز کتاب درسی

: عبارت کنکوری

: عبارت دشوار

: عبارت ترکیبی با فصل‌های قبلی

: عبارت ابهام‌دار

: عبارت ترکیبی با فصل‌های بعدی

: عبارت فضایی (فراتر از کنکور)

با تشکر

از دکتر کمیل نصیری گرامی و دوست خوبم ایمان سلیمان‌زاده عزیز، بابت پیشنهاد تألیف این کتاب هیجان‌انگیز و حمایت‌هایشون!

از خانم‌ها هدی ملک‌پور و انسیه میرجعفری که اگر پیگیری‌هایشون نبود این کتاب به سرانجام نمی‌رسید! از خانم سعیده محبی و آقایان فرهنگ امیری و امیر بصر اویی که با ویراستاری دقیقشون، سطح کتاب را ارتقا دادند!

از همه همکاران همیشه همراه واحد تولید که با تلاش شبانه‌روزیشون، این کتاب سروشکل گرفت!

دکتر حسین ایروانی - اردیبهشت ۱۴۰۱

 chemistry\_with\_iravani



## پایه دهم

۸

۲۶

۴۱

فصل ۱. کیهان زادگاه الفبای هستی

فصل ۲. ردپای گازها در زندگی

فصل ۳. آب، آهنگ زندگی



## پایه یازدهم

۵۷

۷۶

۹۴

فصل ۱. قدر هدایای زمینی را بدانیم

فصل ۲. در پی غذای سالم

فصل ۳. پوشک، نیازی پایان ناپذیر



## پایه دوازدهم

۱۱۳

۱۳۰

۱۵۲

۱۶۸

فصل ۱. مولکول‌ها در خدمت تندرستی

فصل ۲. آسایش و رفاه در سایه شیمی

فصل ۳. شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

فصل ۴. شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روش‌تر



## مسائل

۱۸۳

۱۹۳

عبارت‌های مسئله‌دار

پاسخ‌نامه تشریحی



فصل

# قدرهای زمینی را بدانیم

!

هدایای زمینی

۱ انسان‌های پیشین فقط از برخی مواد طبیعی مانند چوب، سنگ، پشم، پوست، سفال و برخی فلزها بهره می‌بردند.

۲ با گسترش دانش تجربی، رابطه خواص مواد با عناصر سازنده آن‌ها مشخص شده و توانایی انتخاب ماده مناسب برای کاربردی معین، به دست آمد.

۳ عناصر جدول تناوبی براساس بنیادی ترین ویژگی آن‌ها که با نام A مشخص می‌شود، در ۷ دوره و ۱۸ گروه چیزه شده‌اند.

۴ دو عنصر اولی که آرایش الکترون - نقطه‌ای آن‌ها به صورت  $\cdot\ddot{\cdot}$  است، همانند پتاسیم در کودهای شیمیایی وجود دارند.

۵ شیمی‌دان‌ها دریافتند که گرمادان به مواد و افزودن آن‌ها به یکدیگر، همواره سبب تغییر و بهبود خواص آن‌ها می‌شود.

۶ عنانصری با عدد اتمی بزرگ‌تر از ۱۸ را می‌توان بر پایه جدول شارل ژانت طبقه‌بندی کرد.

۷ توانایی انسان در استخراج موادی مانند نفت و فلزها، به او این امکان را داده تا سرپناهی ایمن و گرم برای زندگی فراهم کند.

۸ همه مواد ساختگی از کره زمین به دست آمده و نهایتاً به آن برمی‌گردند، بنابراین جرم کل مواد در آن، به تقریب ثابت می‌ماند.

۹ توزیع یکنواخت منابع در زمین، دلیلی بر پیشرفت صنعت، افزایش سطح رفاه در جامعه و پیدایش تجارت جهانی است.

۱۰ پیشرفت صنعت الکترونیک مبتنی بر موادی است که نسبت به عناصر سمت چپ جدول، رسانایی الکتریکی بیشتری دارند.

۱۱ هالوژن‌ها، نافلزهایی با واکنش پذیری بالا بوده و عناصر موجود در این گروه، به هر سه حالت فیزیکی یافت می‌شوند.

۱۲ عنصر X<sub>۲۵</sub>، با عنصر اسکاندیم در یک تناوب مشابه و با عنصر Y<sub>۹</sub> در یک گروه مشابه قرار گرفته است.

۱۳ فلزها سطحی درخشان داشته و در سال‌های آینده، میزان رشد مصرف آن‌ها در جهان بیشتر از سوخت‌های فسیلی خواهد بود.

۱۴ دسته p جدول دوره‌ای، مجموعاً شامل ۳۶ عنصر مختلف شده و همه عناصر شبه‌فلزی را در خود جای داده است.

۱۵ زغال‌سنگ، متعلق به خانواده‌ای از سوخت‌ها است که در حال حاضر، میزان استخراج آن‌ها نسبت به فلزها کم‌تر است.

۱۶ مطابق جدول شارل ژانت، عنصرها به پنج دسته، تقسیم می‌شوند.

۱۷ برای جداسازی یون سولفات موجود در کودهای شیمیایی، می‌توان از محلول باریم کلرید استفاده کرد.

۱۸ گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته بوده و کشف یک ماده جدید، پرچمدار توسعه فناوری است.

لاستیک‌های یک دوچرخه، پس از فراوری نفت خام استخراج شده از چاه‌های نفت تولید خواهد شد.

از آن جا که الکترون‌های آزاد در رسانایی الکتریکی مواد نقش دارند، این ویژگی جزء خواص شیمیایی عناصر به شمار می‌رود.

عناصر موجود در دستهٔ ۶ از جدول شارل ژانت، شامل ۱۶ گروه خواهند بود.

اولین لایهٔ الکترونی که شامل زیرلایهٔ  $g$  می‌شود، حداقل گنجایش  $5^{\circ}$  ذرهٔ زیراتومی با بار نسبی ۱- را دارد.

علم شیمی را می‌توان مطالعهٔ هدفدار و منظم رفتار عناصر و مواد، برای یافتن الگوهای رفتار فیزیکی و شیمیایی آن‌ها دانست.

استکان شیشه‌ای، با استفاده از شن و ماسه تولیدشده و در ساختار آن، اتم‌هایی از عناصر گروه ۱۴ یافت می‌شود.

آرایش الکترونی اولین عنصر از جدول ژانت که در جدول تناوبی امروزی یافت نمی‌شود، به زیرلایهٔ  $8^{\circ}$  ختم می‌شود.

عدد کوانتمومی فرعی الکترون‌های زیرلایهٔ  $g$ ،  $2 / 5$  برابر عدد کوانتمومی فرعی الکترون‌های زیرلایهٔ  $p$  است.

عنصرهای دستهٔ ۵ همگی در سمت چپ و عنصرهای دستهٔ  $p$ ، همگی در سمت راست جدول تناوبی جای دارند.

عدد کوانتمومی فرعی برای آخرین زیرلایهٔ الکترونی هر عنصر نارسانای جدول دوره‌ای برابر ۱ خواهد بود.

نیکل (Ni<sub>28</sub>) در گروه شمارهٔ ۱۰ و تیتانیم (Ti<sub>۲۲</sub>) در گروه شمارهٔ ۴ جدول تناوبی جای دارد.

جدول ژانت با مدل اتمی همخوانی دارد که در آن، انرژی الکترون‌ها در اتم، با فاصلهٔ آن‌ها از هسته رابطهٔ مستقیم دارد.

در جدول ژانت، عناصر دستهٔ ۶ در مجاورت عناصری قرار دارند، که زیرلایه‌ای با  $= 3$  در آن‌ها در حال برشدن است.

جدول ژانت با مدل اتمی همخوانی دارد که تنها توانایی توجیه طیف نشری - خطی عنصری با عدد اتمی ۱ را داشت.

در عنصری با عدد اتمی ۱۲۱، الکترون‌ها برای نخستین بار وارد زیرلایه‌ای می‌شوند که حداقل گنجایش  $18^{\circ}$  الکترون دارد.

الکترون‌هایی که در زیرلایهٔ  $6^{\circ}$  قرار می‌گیرند، فقط در یک ناحیهٔ کروی شکل و مشخص از اتم حضور پیدا می‌کنند.

طیف نشری گاز نجیبی با آرایش الکترونی لایهٔ ظرفیت متفاوت نسبت به عناصر هم‌گروه خود، با مدل بور قابل توجیه است.

سبزیجات با استفاده از کودهایی پرورش می‌یابند که محتوى اتم‌هایی از فراوان ترین عنصر موجود در هواکره است.

میزان استخراج مواد معدنی مانند سیلیس، از مجموع میزان استخراج سوخت‌های فسیلی و فلزها بیشتر است.

بنیادی‌ترین ویژگی عناصر، توسط ذرات زیراتومی مشخص می‌شود که نماد آن‌ها به صورت  $p^{+}$  نشان داده می‌شود.

گسترش صنعت خودرو، مدیون شناخت ماده‌ای است که مقاومت کششی آن  $100^{\circ}$  برابر تکلایه‌ای از گرافیت است.

## روندها و الگوهای رفتار مواد و عناصر

عنصری که با ید هم‌دوره و با کربن هم‌گروه است، دارای  $6$  زیرلایهٔ دوالکترونی خواهد بود.

عناصری که در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک گذاشته یا می‌گیرند، در سمت راست و بالای جدول قرار دارند.

دو مورد از عناصر دورهٔ چهارم، دارای  $4$  الکترون ظرفیتی در هر اتم خود بوده و سطح صیقلی و درخشان دارند.




- ۴۶** بیشتر از ۵۰٪ عناصر جدول دوره‌ای در واکنش با دیگر عناصر، الکترون از دست داده و به کاتیون تبدیل می‌شوند.
- ۴۷** عنصر X<sub>۲۵</sub>، بزرگ‌ترین شعاع اتمی را در میان عناصر هم‌دوره خود دارد.
- ۴۸** عنصری که با Se<sub>۳۴</sub> هم‌دوره و با سیلیسیم هم‌گروه است، در حالت جامد، سطحی صیقلی داشته و چکش خوار است.
- ۴۹** دوره سوم جدول تناوبی، شامل دو عنصر شبکه‌فلزی می‌شود که در لایه ظرفیت اتم آن‌ها به ترتیب ۴ و ۵ الکترون وجود دارد.
- ۵۰** در واکنش میان هفتمنی عنصر دسته ۵ جدول دوره‌ای با دومین عضو خانواده هالوژن‌ها، نور بنفش‌رنگ تولید می‌شود.
- ۵۱** به دلیل افزایش تعداد لایه‌های الکترونی با افزایش عدد اتمی عناصر موجود در یک گروه، شعاع اتمی عناصر افزایش می‌یابد.
- ۵۲** عنصر X<sub>۲۵</sub> می‌تواند در تشکیل ترکیب‌های یونی و کووالانسی شرکت کند.
- ۵۳** همه فلزهای قلیایی خاکی، برخلاف برخی از فلزهای قلیایی و هالوژن‌ها، با نماد دوحرفی نشان داده می‌شوند.
- ۵۴** یکی از دگرشکل‌های فسفر، به دلیل واکنش پذیری بالا درون آب نگهداری شده و رادیوایزوتوپی از آن، در ایران تولید شده است.
- ۵۵** سیلیسیم، همانند عنصری که در جدول دوره‌ای در خانه پایین آن قرار می‌گیرد، در واکنش‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد.
- ۵۶** به جز عنصر کربن، سایر نافلزها در مجاورت با اتم‌های فلزی الکترون گرفته و به آئیون تبدیل می‌شوند.
- ۵۷** در شرایط یکسان، یک نمونه از گاز نیتروژن نسبت به گاز فلور اسرعت و شدت بیشتری با سدیم و واکنش می‌دهد.
- ۵۸** شبکه‌فلزهای رسانای ضعیف برق بوده و تنها عناصری هستند که فقط تمايل به اشتراک گذاشتن الکترون با سایر اتم‌ها دارند.
- ۵۹** عنصر X<sub>۲۵</sub>، بیشترین واکنش‌پذیری را در مقایسه با عناصر هم‌دوره و هم‌گروه خود دارد.
- ۶۰** عدد اتمی دومین عنصر از گروه ۱۴ که در واکنش با سایر عناصر الکترون از دست می‌دهد، ۲ برابر پنجمین فلز واسطه است.
- ۶۱** تولید نور، آزادسازی گرما، تشکیل رسوب و خروج گاز از سامانه واکنش، نشانه‌هایی از انجام یک تغییر شیمیایی هستند.
- ۶۲** بین عناصر موجود در دوره اول جدول تناوبی، با افزایش عدد اتمی، مقدار نقطه جوش برخلاف شعاع اتمی افزایش پیدا می‌کند.
- ۶۳** بین عناصر موجود در گروه چهاردهم، هیچ عنصری با تشکیل یون تکاتمی نمی‌تواند به آرایش یک گاز نجیب برسد.
- ۶۴** شبیه نمودار تغییر شعاع اتمی عناصر Na<sub>۱۱</sub>, Mg<sub>۱۲</sub>, Al<sub>۱۳</sub>, Si<sub>۱۴</sub>, P<sub>۱۵</sub> و S<sub>۱۶</sub> است.
- ۶۵** روند تغییر خصلت فلزی در گروه‌ها و دوره‌های جدول تناوبی، با افزایش عدد اتمی، مشابه است.
- ۶۶** در ساخت لامپ‌های رشته‌ای، همانند چراغ جلوی خودروها از عنصر گازی استفاده می‌شود که واکنش پذیری ناچیزی دارد.
- ۶۷** گالیم در خواص شیمیایی خود به نافلزها شباهت داشته و در خواص فیزیکی مانند سطح صیقلی به فلزها شبیه است.
- ۶۸** با توجه به یکسان‌بودن حالت فیزیکی برخی از عناصر هم‌گروه، قانون دوره‌ای فقط برای خواص شیمیایی مطرح می‌شود.
- ۶۹** تنها عنصر از گروه ۱۴ که رسانایی گرمایی ندارد، در واکنش با سایر اتم‌ها الکترون گرفته یا به اشتراک می‌گذارد.
- ۷۰** عنصر X<sub>۲۵</sub>، حالت فیزیکی متفاوت با عناصر هم‌دوره و هم‌گروه خود دارد.
- ۷۱** در دوره سوم جدول تناوبی، با افزایش عدد اتمی عناصر، نیروی جاذبه هسته بر الکترون‌های ظرفیتی افزایش می‌یابد.

هر اتم از هالوژنی که در دمای اتاق با گاز هیدروژن به آرامی واکنش می‌دهد، در مقایسه با اتم  $\text{H}_2$ ، شعاع کوچک‌تری دارد.

سرب مداد، یک ماده بسیار نرم بوده و آلوتروپی با ساختار دوبعدی از تنها عنصر نافلزی موجود در گروه ۱۴ جدول دوره‌های است.

نیمی از عناصر موجود در دوره‌ای که زیرلایه‌های اول و دوم لایه سوم در آن شروع به پرشدن می‌کنند، سطح درخشان دارند.

با کاهش شعاع اتمی فلزهای قلیابی، آن فلز آسان‌تر الکترون از دست داده و در واکنش با  $\text{Cl}_2$  انرژی بیشتری آزاد می‌کند.



نمودار مقابل، روند کلی واکنش‌پذیری چهار عنصر از دوره دوم در برابر اکسیژن را به درستی نشان می‌دهد.

نقطه جوش هالوژن‌ها، همانند شعاع اتمی این عناصر، با کاهش واکنش‌پذیری آن‌ها، افزایش پیدا می‌کند.

واکنش‌پذیری هر عنصر، به معنای تمايل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است.

تمایل به گرفتن الکترون و شکنندگی در حالت جامد، از جمله ویژگی‌های مشترک همه نافلزها هستند.

تعداد عناصری از جدول دوره‌ای که تمایل به گرفتن الکترون دارند، کمتر از تعداد عناصر چکش خوار این جدول است.

هر عنصر از تناوب سوم که در اثر ضربه تغییر شکل داده ولی خرد نمی‌شود، در حالت جامد، سطحی درخشان دارد.

کمترین واکنش‌پذیری در میان عناصر دوره دوم، متعلق به عنصری است که آرایش الکترونی آن به  $2s^2 2p^5$  ختم می‌شود.

جلای نقره‌ای فلزی از دوره سوم که بیشترین شعاع اتمی را دارد، در مجاورت هوا به کندی از بین رفته و کدر می‌شود.

بین عناصر ژرمانیم و قلع، در آرایش الکترونی عنصری با رسانایی الکتریکی کمتر،  $16$  الکترون با  $1 = 1$  وجود دارد.

در دوره سوم جدول تناوبی، شب تغییرات شعاع اتم‌های فلزی، بیشتر از شب تغییر شعاع اتم‌های نافلزی است.

نیمی از عناصر موجود در گروه ۱۴ جدول دوره‌ای، در حالت جامد، چکش خوار بوده و جریان برق را از خود عبور می‌دهند.

شمار عناصری از دوره سوم که در دمای اتاق حالت جامد دارند،  $5 / 1$  برابر شمار عناصری از آن است که سطح درخشان دارند.

اتم عنصر  $X_{۳۴}$ ، مانند اتم عناصرهای دیگر هم‌گروه خود، در واکنش‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد.

بیش از ۷۵٪ عناصری که در جدول دوره‌ای بین دو عنصر  $\text{Si}$  و  $\text{Ge}$  قرار می‌گیرند، رسانای الکتریسیته هستند.

از عناصر نافلزی که در هر دوره بیشترین واکنش‌پذیری را دارند، در ساخت چراغ جلوی خودروها استفاده می‌شود.

اگر اتم‌های روبه‌رو مربوط به دو عنصر از گروه ۱۷ جدول تناوبی باشند، درستی یا نادرستی چهار عبارت زیر را مشخص کنید.

A      B

اگر آنیون  $\text{B}^-$ ، فراوان ترین یون موجود در آب دریا باشد، عنصر A می‌تواند زیرلایه پر از الکترون داشته باشد.

اگر B نافلز‌ترین عنصر موجود در جدول دوره‌ای باشد، بین این عنصر و  $X_{۳۴}$  عنصر دیگر در جدول دوره‌ای وجود دارد.

در معادله یونش اسید HA از نماد  $\rightarrow$  برای نشان دادن برگشت‌پذیری‌بودن واکنش استفاده می‌شود.

قدرت نیروهای بین مولکولی در یک نمونه از A<sub>۷</sub>، همانند واکنش‌پذیری این ماده، بیشتر از یک نمونه B<sub>۷</sub> است.



۹۲ رفتارهای فیزیکی فلزها شامل داشتن جلا، رسانایی الکتریکی و گرمایی و خاصیت چکش خواری است.

۹۳ از سامانه واکنش گاز کلر با عنصری که آرایش الکترونی آن به ۳S ختم می‌شود، نور زردرنگ گسیل خواهد شد.

۹۴ در شرایط معین، هر چه اتم فلزی، آسان‌تر الکترون از دست داده و به کاتیون تبدیل شود، خصلت فلزی بیشتری دارد.



با توجه به تصویر داده شده که بخشی از جدول دوره‌ای را نشان می‌دهد، درستی یا نادرستی چهار عبارت زیر را مشخص کنید.

۹۵ عنصر E در دمای اتفاق به حالت گاز بوده و تمایل آن به گرفتن الکترون، بیشتر از عنصر Y است.

۹۶ عنصر X، همانند عنصر A، در حالت جامد سطحی درخشان داشته و در واکنش‌ها الکترون از دست می‌دهد.

۹۷ بین عناصر D، Y و E، عنصری با بیشترین خاصیت نافلزی، دارای ۵ الکترون ظرفیتی است.

۹۸ مجموع مقدار I + n الکترون‌های ظرفیتی عنصر Y، دو برابر مقدار این مؤلفه برای عنصر X خواهد بود.

۹۹ نیمی از عناصر موجود در گروه ۱۴ جدول دوره‌ای، سطح صیقلی داشته و چکش خوار هستند.

۱۰۰ در واکنش  $\text{Na(s)} + \text{FeO(s)}$ ، واکنش پذیری فراورده‌ها از واکنش‌دهنده‌ها بیشتر است.

۱۰۱ عنصر X ۵۵، متعلق به دسته‌ای از جدول است که دومین عنصر آن، ۲ الکترون جفت‌نشده در آرایش الکترون – نقطه‌ای خود دارد.

۱۰۲ رنگ آلوتروپی از فسفر که به خاطر واکنش پذیری بالا در زیر آب نگه‌داری می‌شود، مشابه سومین عضو خانواده هالوژن‌ها است.

۱۰۳ هر عنصر از جدول دوره‌ای که مجموع شماره دوره و گروه آن برابر با ۱۶ است، جربان الکتریسیته را از خود عبور می‌دهد.

۱۰۴ هر چه تمایل یک فلز به از دست دادن الکترون بیشتر باشد، استخراج آن فلز از سنگ معدن دشوارتر خواهد بود.

|      |   |   |     |    |    |
|------|---|---|-----|----|----|
| گروه |   |   | ... |    |    |
| دوره | ۱ | ۲ | ۳   | ۱۶ | ۱۷ |
| ۲    |   | A |     | D  |    |
| ۳    | E |   |     | G  |    |
| ۴    | X |   | ... | Z  |    |

با توجه به جدول مقابل که بخشی از جدول دوره‌ای را نشان می‌دهد، درستی یا نادرستی چهار عبارت زیر را مشخص کنید.

۱۰۵ عنصر A چکش خوار بوده و خصلت فلزی آن در مقایسه با E کم‌تر است.

۱۰۶ تمایل عنصر G در گرفتن الکترون، از عنصر D بیشتر است.

۱۰۷ عنصر X دارای ۲ زیرلایه عالکترونی بوده و شعاع اتمی آن از عنصر G بزرگ‌تر است.

۱۰۸ در میان عنصرهای مشخص شده، Z بزرگ‌ترین شعاع اتمی را دارد.

۱۰۹ بین گازهای فلور و کلر، ماده‌ای که دمای جوش بالاتری دارد، باشد بیشتری با فلز سدیم واکنش می‌دهد.

۱۱۰ فلزی از تناوب سوم که کم‌ترین واکنش پذیری را دارد، در واکنش با فلور ترکیبی با  $\text{XF}_3$  را ایجاد می‌کند.

۱۱۱ گاز کلر به رنگ زرد دیده شده و تمایل آن برای تبدیل شدن به یون هالید، بیشتر از گاز فلور خواهد بود.

۱۱۲ ترکیب هیدروژن دار نافلزی از تناوب دوم با بزرگ‌ترین شعاع اتمی، در دمای صفر درجه سانتی‌گراد به حالت گاز است.

- فراؤان ترین شبکه فلز سیاره زمین، جریان الکتریسیته را از خود عبور داده و در ساخت سلول‌های خورشیدی نقش دارد.**
- سرعت واکنش میان گاز کلر با فلز پتاسیم در مقایسه با واکنش میان بخار برم و فلز سدیم بیشتر خواهد بود.**
- اتمهای سازنده سه عنصر اول موجود در گروه ۱۴ جدول دوره‌ای در ساختار هیچ ترکیب یونی یافت نمی‌شوند.**
- طول موج رنگ نور حاصل از واکنش سه عنصر اول با گاز کلر، با افزایش عدد اتمی عنصر فلزی افزایش پیدا می‌کند.**
- استرانسیم دارای  $\text{I}^-$  الکترون با  $= 0$  بوده و در مقایسه با کلسیم، راحت‌تر به یون  $\text{X}^{2+}$  تبدیل می‌شود.**
- سرعت تولید گاز در واکنش فلز پتاسیم با محلول هیدروکلریک اسید، بیشتر از واکنش فلز کلسیم با این محلول است.**
- عناصر  $\text{X}_{22}$  و  $\text{Z}_{22}$ ، در واکنش با اکسیژن، دی‌اکسید تشکیل می‌دهند.**
- شمار عناصری از گروه ۱۴ که رسانایی گرمایی دارند، بیشتر از شمار عناصری از این گروه است که چکش خوار هستند.**
- بین عناصر نیتروژن و اکسیژن، عنصری که ترکیب هیدروژن‌دار آن دمای جوش بالاتری دارد، واکنش پذیرتر از عنصر دیگر است.**
- اکسید حاصل از اغلب عناصر سمت راست و بالای جدول دوره‌ای، با انحلال در آب، غلظت یون هیدروکسید را کاهش می‌دهند.**
- سرعت واکنش یک نمونه از فلز استرانسیم با گاز کلر، بیشتر از سرعت واکنش میان فلز روپیدیم با گاز فلوئور است.**
- ۶۰ درصد از عناصر گروه چهاردهم جدول دوره‌ای که سطحی درخشان دارند، رسانای گرمایی هستند.**
- در هر یک از عناصر متوالی دوره سوم که بیشترین تفاوت در شعاع اتمی را دارند، تعداد  $6\ \text{الکترون با } = 1$  وجود دارد.**
- دومین عنصر موجود در گروه ۱۴، دارای سطحی درخشان بوده و یکی از عناصر اصلی سازنده مواد کووالانسی است.**
- نقش آب در نگهداری فسفر سفید، مشابه لیکوبین در بدن جانداران بوده و موجب افزایش  $\text{E}_1$  یک واکنش می‌شود.**
- فلز قلیایی با کمترین واکنش‌پذیری، دارای  $2\ \text{ایزوتوپ پایدار}$  بوده و در دمای اتاق با آب واکنش می‌دهد.**
- هالوژنی که در دمای اتاق به آرامی با  $\text{H}_2$  واکنش می‌دهد. نسبت به هالوژن موجود در تفلون شعاع اتمی بزرگ‌تری دارد.**
- هالوژنی با کمترین شعاع اتمی، حتی در دمایی که هوای مایع ایجاد می‌شود نیز به سرعت با هیدروژن واکنش می‌دهد.**
- در دوره سوم جدول تناوبی، عنصری کمترین واکنش‌پذیری را دارد که در پتروشیمی شیراز با خلوص بالا تهیه می‌شود.**
- با انحلال هالوژنی که فقط در دمای بالاتر از  $\text{K}_{673}$  با  $\text{H}_2$  واکنش می‌دهد در هگزان، محلول سبزرنگ ایجاد می‌شود.**
- عنصری از گروه ۱۴ که برای رسم آرایش الکترونی فشرده آن از نماد گاز  $\text{Xe}$  استفاده می‌شود، در حلبی یافت می‌شود.**
- گوگرد، جامدی زردرنگ بوده و شعله حاصل سوختن آن نسبت به شعله حاصل سوختن ناقص متنام دمای کمتری دارد.**
- با افزایش مقدار  $\text{Z}$  در مولکول هالوژن‌ها، آنتالپی پیوند برخلاف قدرت نیروی واندروالسی کاهش می‌یابد.**
- محلول دهان‌شویه استریل، از انحلال ترکیب حاصل از واکنش دومین فلز قلیایی با دومین هالوژن در آب ایجاد می‌شود.**



- تعداد ایزوتوب‌های طبیعی اولین فلز قلیایی، با هالوژنی که در شرایط اتاق به آرامی با  $H_2$  واکنش می‌دهد برابر است.**
- واکنش پذیرترین فلز دوره چهارم، در واکنش با کلر، یک ترکیب محلول در آب و به همراه انرژی تولید می‌کند.**
- استکان‌های شیشه‌ای، با استفاده از نمونه ناخالص ترکیبی ساخته می‌شوند که عناصر سازنده آن تنها می‌توانند الکترون به اشتراک بگذارند.**
- در دمایی که برم با  $H_2$  واکنش می‌دهد، هالوژنی که آنیون آن توسط تیروئید جذب می‌شود نیز با  $H_2$  واکنش می‌دهد.**

## عناصر فلزی دسته d چدول دوره‌ای

- عنصر  $X_{\text{۲}}$ ، یک فلز از گروه ۲ و عنصر  $Z_{\text{۳}}$ ، آخرین عنصر واسطه از دوره چهارم است.**
- فلزات دسته d، هنگام تشکیل کاتیون فقط الکترون‌های موجود در بیرونی ترین لایه الکترونی خود را از دست می‌دهند.**
- بیشتر عناصری که عمدتاً در سمت چپ یا مرکز چدول قرار دارند، اغلب به صورت ترکیب یونی در طبیعت یافت می‌شوند.**
- عناصر جامد در شرایط استاندارد که آرایش الکترونی آن‌ها به  $\text{Zr}^{+4}$  باشد، ختم می‌شود، چکش خوارند.**
- فلزی که به صورت کلوخه‌های زرد یافت می‌شود، به دلیل جذب پرتوهای خورشید، در ساخت لباس فضانوردی کاربرد دارد.**
- همه عناصری که شمار الکترون‌های موجود در بیرونی ترین زیرلایه الکترونی آن‌ها با هم برابر است، در یک گروه قرار می‌گیرند.**
- وجود ترکیب‌هایی از عنصر  $X_{\text{۶}}$  در سنگ و یا شیشه، می‌تواند سبب ایجاد رنگ در این مواد شود.**
- فلز واسطه‌ای از دوره چهارم که در تلویزیون رنگی به کار می‌رود، با تبدیل شدن به یون پایدار، به آرایش گازنجیب می‌رسد.**
- یون  $\text{Fe}^{+2}$ ، یکی از سازنده‌های زنگ آهن است.**
- تیتانیم، در آرایش الکترونی خود دارای ۵ زیرلایه الکترونی بوده و تعداد الکترون‌های ظرفیتی آن مشابه  $\text{Se}_{\text{۴}}$  است.**
- طلابه اندازه‌ای نرم است که چند گرم از آن را می‌توان با چکش کاری به صفحه‌ای با مساحت چند متر مربع تبدیل کرد.**
- در ۲ مورد از عناصر واسطه دوره چهارم، زیرلایه  $d$  به صورت نیمه‌پر است.**
- در یون پایدار نخستین فلز واسطه، مجموع تعداد الکترون‌های موجود در زیرلایه‌های p، دو برابر زیرلایه‌های s است.**
- در فلزهای اصلی جدول دوره‌ای، آخرین زیرلایه اشغال شده از الکترون، همواره بخشی از لایه ظرفیت اتم را تشکیل می‌دهد.**
- اغلب فلزهای واسطه، در طبیعت به شکل ترکیب‌های یونی همچون اکسیدها و کربنات‌ها یافت می‌شوند.**
- آرایش الکترونی کاتیون در ترکیب  $\text{Ni}_3\text{S}_2$ ، به صورت  $[\text{Ar}]^{3d^8} \text{Ni}^{+2}$  خواهد بود.**
- وجود ترکیب‌هایی از عناصر واسطه در سنگ زمرد، باعث ایجاد رنگ آبی در این سنگ گران‌بها شده است.**
- شعاع اتمی عناصر  $X_{\text{۲۲}}$  و  $Z_{\text{۲۲}}$ ، از شعاع اتمی عنصر مایع گروه ۱۷ چدول تناوبی، بزرگ‌تر است.**
- اگر فلز A از تناوب چهارم با کلر، دو ترکیب  $\text{ACl}_4$  و  $\text{ACl}_6$  را تشکیل بدهد، عنصر بعد از این فلز نیز قطعاً یک فلز واسطه است.**



- ۱۷۵** همه لایه‌ها و زیرلایه‌های اشغال شده در یون پایدار حاصل از عناصر  $X_{\text{۲}} \text{ و } Z_{\text{۳}}$  از الکترون پر شده است.
- ۱۷۶** طلا، همانند گرافیت رسانایی الکتریکی بالایی داشته و این رسانایی را حتی در دماهای بالا هم حفظ می‌کند.
- ۱۷۷** سرخ‌بودن یاقوت و سبزبودن زمرد، به دلیل وجود اتم‌های خنثی برخی از فلزهای واسطه در این سنگ‌ها است.
- ۱۷۸** در اکسیدی از اولین عنصر گروه هشتم که ۵ اتم در واحد فرمولی آن وجود دارد، آرایش الکترونی کاتیون به  $3d^6$  ختم می‌شود.
- ۱۷۹** در گروههای ۱ تا ۱۳ جدول دوره‌ای، همانند گروه ۱۸، تمام عناصر موجود در یک گروه، حالت فیزیکی یکسانی دارند.
- ۱۸۰** اسکاندیم، عنصری واسطه و رسانای جریان الکتریکی بوده و قابلیت مفتول شدن دارد.
- ۱۸۱** واکنش ندادن طلا با گازهای موجود در هوایکره و مواد موجود در بدن انسان، از جمله ویژگی‌های خاص این فلز هستند.
- ۱۸۲** نیکل ( $Ni_{\text{۲۸}}$ ) عنصری واسطه و تیتانیم ( $Ti_{\text{۲۲}}$ )، عنصری اصلی است.
- ۱۸۳** اعماق اقیانوس‌ها و کف دریا محل مناسبی برای استخراج فلزهایی است که در هسته هر اتم خود  $25 \text{ و } 29$  پروتون دارند.
- ۱۸۴** بین عناصر دسته  $d$  در دوره چهارم، واکنش پذیری فلزها با افزایش عدد اتمی آن‌ها مرتبًا کاهش پیدا می‌کند.
- ۱۸۵** دوره چهارم و پنجم جدول تناوبی، در مجموع ۳۶ عنصر واسطه را دربردارند.
- ۱۸۶** تعداد عناصر موجود در دسته  $p$  جدول دوره‌ای امروزی، ۹ برابر تعداد الکترون‌های موجود در زیرلایه  $d$  در اتم کروم است.
- ۱۸۷** شعاع اتمی نیکل ( $Ni_{\text{۲۸}}$ ) از شعاع اتمی تیتانیم ( $Ti_{\text{۲۲}}$ ) کوچک‌تر است.
- ۱۸۸** آخرین فلز از تناب سوم، همانند اولین فلز اصلی که یک زیرلایه پر با  $= 1$  دارد، یون پایداری با بار  $+3$  ایجاد می‌کند.
- ۱۸۹** فلز واسطه‌ای از دوره چهارم با بیشترین شعاع اتمی، در واکنش با اکسیژن، ترکیبی با نسبت آئیون به کاتیون  $1/5$  تولید می‌کند.
- ۱۹۰** همه فلزهای اصلی، برخلاف اغلب فلزهای واسطه، پس از تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دوره قبل از خود می‌رسند.
- ۱۹۱** فلز واسطه‌ای که شمار الکترون‌های زیرلایه  $3d$  آن  $= 4$  برابر زیرلایه  $4s$  است، با عنصر  $X_{\text{۲۸}}$  در یک گروه قرار می‌گیرد.
- ۱۹۲** از نخستین عنصری که دارای الکترونی  $= 5 + n + 1$  است، در ساخت برخی از انواع شیشه‌ها استفاده می‌شود.
- ۱۹۳** روی، آخرین فلز واسطه از دوره چهارم بوده و آرایش الکترونی کاتیون پایدار آن مشابه به یون  $Cu^{+}$  است.
- ۱۹۴** مجموع مقدار  $1 + n$  الکترون‌هایی که اتم آهن برای تبدیل شدن به یون  $Fe^{3+}$  از دست می‌دهد، برابر با  $15$  است.
- ۱۹۵** در آرایش الکtron کاتیون موجود در بلور  $Cr(OH)_2$ ، تعداد الکترون‌های لایه سوم،  $5/1$  برابر لایه دوم خواهد بود.
- ۱۹۶** در هفت مورد از عناصر تناب سوم، شمار الکترون‌های زیرلایه  $3d$ ، پنج برابر زیرلایه  $4s$  است.
- ۱۹۷** طلا در طبیعت به شکل فلزی و عنصری خود یافت شده و مقدار آن در معادن این فلز بسیار زیاد است.
- ۱۹۸** استخراج طلا، مقدار زیادی پسماند تولید کرده و همانند دیگر فعالیت‌های صنعتی، آثار زیانبار زیست‌محیطی ایجاد می‌کند.
- ۱۹۹** کاتالیزگر فلزی استفاده شده در فرایند هابر، متعلق به تناب چهارم بوده و دارای دو اکسید طبیعی است.
- ۲۰۰** آرایش الکترونی عنصر تولید شده در کاتد سلول مربوط به برقکافت مس (II) کلرید، به  $3d^{10} 4s^1$  ختم می‌شود.

## پایه پاردهم. فصل ۱

- ۱۵.** نادرست؛ زغال سنگ یکی از سوختهای فسیلی است و در حال حاضر، میزان استخراج این سوختها نسبت به فلزها بیشتر است.
- ۱۶.** درست؛ مطابق جدول ژانت، عنصرها به پنج دسته<sup>۵</sup>  $p$ ,  $d$ ,  $f$  و  $g$  تقسیم می‌شوند.
- ۱۷.** درست؛ یون سولفات با کاتیون  $Ba^{2+}$  رسوب باریم سولفات تشکیل می‌دهد.
- ۱۸.** درست؛ حاشیه صفحه ۲ کتاب درسی رو ببین!
- ۱۹.** درست؛ شکل صفحه ۳ کتاب درسی رو ببین!
- ۲۰.** نادرست؛ رسانایی الکتریکی جزء خواص فیزیکی عناصر به شمار می‌رود.
- ۲۱.** نادرست؛ گنجایش الکترونی زیرلایه  $g$  برابر  $18 + 2 = 20$  است، بنابراین دسته  $g$  جدول ژانت، شامل گروه خواهد بود.
- ۲۲.** درست؛ اولین لایه الکترونی که شامل زیرلایه  $g$  می‌شود، لایه پنجم با گنجایش  $5 = 5 + 18 + 10 + 14 + 6 + 2 = 50$  است.
- ۲۳.** درست؛ صفحه ۶ کتاب درسی رو ببین!
- ۲۴.** درست؛ در ساختار شن و ماسه که مواد اولیه تولید شیشه هستند، عنصر سیلیسیم وجود دارد.
- ۲۵.** درست؛ آرایش الکترونی آخرین عنصر جدول تناوبی به زیرلایه  $7p$  ختم می‌شود و آرایش الکترونی عنصر بعدی به زیرلایه  $8s$  ختم خواهد شد.
- ۲۶.** نادرست؛ عدد کوانتموی فرعی الکترون‌هایی که در زیرلایه‌های  $g$  و  $p$  قرار می‌گیرند به ترتیب برابر ۴ و ۱ است.
- ۲۷.** نادرست؛ در مورد عنصرهای دسته<sup>۵</sup>  $p$ ، عنصر هلیم در سمت راست و در گروه ۱۸ قرار دارد.
- ۲۸.** نادرست؛ دو استثنای مهم هیدروژن و هلیم هستند که نارسانا بوده و عدد کوانتموی فرعی آخرین زیرلایه الکترونی آنها برابر صفر است.
- ۲۹.** درست؛ با توجه به عدد اتمی  $Ar$ ، دو عنصر  $Ni_{28}$  و  $Ti_{22}$  به ترتیب در گروههای ۱۰ =  $18 - 28$  و ۴ =  $22 - 18$  قرار دارند.
- ۳۰.** درست؛ جدول ژانت با مدل کوانتموی همخوانی دارد.
- ۳۱.** درست؛ در جدول ژانت، عناصر دسته<sup>۵</sup>  $p$  در مجاورت عناصر  $f$  قرار دارند.

- ۱.** نادرست؛ سفال و فلزها جزء مواد طبیعی نیستند و گذشت زمان انسان‌های پیشین توانستند سفال را تولید و برخی فلزها را استخراج کنند.
- ۲.** درست؛ صفحه ۲ کتاب درسی رو ببین!
- ۳.** نادرست؛ بنیادی ترین ویژگی عناصر جدول تناوبی، عدد اتمی است که با نماد  $Z$  مشخص می‌شود.
- ۴.** درست؛ نیتروژن و فسفر با آرایش الکترون - نقطه‌ای  $\ddot{N}$ ، همانند پتاسیم در کودهای شیمیایی وجود دارند.
- ۵.** نادرست؛ گرمادان به مواد و افروزن آن‌ها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهمود خواص آن‌ها می‌شود.
- ۶.** درست؛ با استفاده از جدول ژانت که با مدل کوانتموی همخوانی دارد، می‌توان عناصری با عدد اتمی بزرگ‌تر از ۱۱۸ را طبقه‌بندی کرد.
- ۷.** درست؛ صفحه ۱ کتاب درسی رو ببین!
- ۸.** درست؛ همه مواد طبیعی و ساختگی از کره زمین به دست آمده و نهایتاً به آن برمنی گردند، بنابراین جرم کل مواد در کره زمین به تقریب ثابت می‌ماند.
- ۹.** نادرست؛ منابع در زمین به طور غیریکنواخت توزیع شده‌اند.
- ۱۰.** نادرست؛ پیشرفت صنعت الکترونیک مبتنی بر نیمه‌رساناهای است که از عناصر سمت چپ جدول که فلز و رسانا هستند، رسانایی الکتریکی کمتری دارند.
- ۱۱.** درست؛ گروه هالوژن‌ها (گروه ۱۷)، تنها گروه گروه تناوبی است که در آن هر سه حالت فیزیکی گاز (فلوئور و کلر)، مایع (برم) و جامد (ید) وجود دارد.
- ۱۲.** درست؛  $X_{25}$  و  $Y_9$  به ترتیب هالوژن‌های دوره‌های ۴ و ۲ جدول تناوبی و اسکاندیم اولین فلز واسطه دوره چهارم است.
- ۱۳.** درست؛ با توجه به نمودار صفحه ۴ کتاب درسی، در ۱۰ سال آینده میزان رشد مصرف فلزها در جهان بیشتر از سوختهای فسیلی خواهد بود.
- ۱۴.** درست؛ در هر یک از دوره‌های ۲ تا ۷، شش عنصر و در مجموع ۳۶ عنصر در دسته  $p$  قرار دارند. عناصر شبه‌فلز در دوره‌های ۲ تا ۶ و در دسته  $p$  جای دارند.
- ۱۵.** عنصر نافلزی هیدروژن هم در سمت چپ جدول قرار دارد و مانند سایر نافلزها، نارسانا است.
- ۱۶.** نیاز نیست بدونید تا چه دوره‌ای، عنصر شبکه‌فلز در جدول دوره‌ای وجود دارد.



**۴۴** نادرست؛ در یک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی کاهاش پیدا می‌کند؛ پس  $X_{25}$  بعد از  $Kr_{36}$ ، کوچک‌ترین شعاع اتمی را در میان عنصرهای همدوره خود دارد.

**۴۵** نادرست؛  $Ge_{32}$  با  $Se_{34}$  همدوره و با  $Si_{14}$ ، هم‌گروه است. ژرمانیم در حالت جامد سطحی صیقلی دارد، ولی بر اثر ضربه خرد می‌شود.

**۴۶** نادرست؛ در دوره ۳ جدول تناوی، تنها یک عنصر شبه‌فلزی با ۴ الکترون در لایه ظرفیت اتم وجود دارد (عنصر Si).

**۴۷** درست، پیاسیم با ۷ الکترون در زیرلایه‌های ۵، هفت‌تین عنصر دسته S جدول دوره‌ای است که بر اثر واکنش با کلر (دومین عضو خانواده هالوژن‌ها) نور بنفسرنگ تولید می‌کند (شکل صفحه ۱۲ کتاب درسی).

**۴۸** درست؛ با افزایش عدد اتمی عنصر موجود در یک گروه، تعداد لایه‌های الکترونی افزایش یافته و با وجود افزایش پروتون‌های هسته اتم، شعاع اتمی عنصر افزایش می‌یابد.

**۴۹** درست؛ عنصر  $X_{25}$  می‌تواند با گرفتن الکترون در تشکیل ترکیب‌های یونی و با اشتراک الکترون در تشکیل ترکیب‌های کوالانسی شرکت کند.

**۵۰** درست؛ از میان فلزهای قلیایی K و از میان هالوژن‌ها F و I با نماد تک‌حرفی نشان داده می‌شوند.

**۵۱** درست؛ از بین دگرگشلک‌های فسفر، فسفر سفید به دليل واکنش پذیری بالا درون آب نگهداری می‌شود.

**۵۲** درست؛  $Si_{14}$  و  $Ge_{32}$  دو شبه‌فلز گروه ۱۴ هستند و در واکنش‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارند.

**۵۳** نادرست؛ از بین نافلزهای، عنصر کربن و گازهای نجیب، توانایی تشکیل آنیون پایدار ندارند.

**۳۲** نادرست؛ جدول ژانت با مدل کوانتمی همخوانی دارد که توانایی توجیه طیف نشری - خطی تمام عنصرها را دارد.

**۳۳** درست؛ در عنصر  $X_{121}$ ، الکترون‌ها برای نخستین بار وارد زیرلایه ۵g می‌شوند که حداقل ۱۸ گنجایش الکترون دارد.

**۳۴** نادرست؛ الکترون‌ها در هر لایه‌ای باشند، در همه نقاط پیرامون هسته حضور می‌یابند اما در محدوده یادشده احتمال حضور بیشتری دارند.

**۳۵** نادرست؛ آرایش الکترونی لایه ظرفیت He با سایر گازهای نجیب متفاوت است، ولی طیف نشری خطی آن با مدل بور قابل توجیه نیست.

**۳۶** درست؛ فراوان ترین عنصر موجود در هوکریه گاز نیتروژن است و دسته‌های از کودهای شیمیایی، کودهای نیتروژن دار هستند.

**۳۷** درست؛ میزان استخراج مواد معدنی (مانند سیلیس) در سالیان اخیر، از مجموع میزان استخراج سوختهای فسیلی و فلزها بیشتر است.

**۳۸** نادرست؛ بنیادی‌ترین ویژگی عنصر، عدد اتمی یا تعداد پروتون‌های آن‌ها است که با نماد  $p^{\pm}$  نشان داده می‌شوند.

**۳۹** نادرست؛ گسترش صنعت خودرو مدبون فولاد است که مقاومت کششی آن ۱۰٪ برابر تکلایه‌ای از گرافیت (گرافن) است.

**۴۰** درست؛  $Sn_{50}$  با یکد، هم‌دوره و با کربن، هم‌گروه بوده و با آرایش الکترونی  $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{10}4s^{2}4p^{6}4d^{10}5s^{2}5p^{2}$  شش زیرلایه‌ای الکترونی دارد.

**۴۱** درست؛ نافلزها در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک گذاشته یا می‌گیرند، و همگی در سمت راست و بالای جدول قرار دارند (بهجز هیدروژن که در سمت چپ جدول قرار گرفته‌است).

**۴۲** درست؛  $Ge_{32}$  و  $Ti_{22}$  به ترتیب فلز و شبه‌فلزند، اما هر دو دارای ۴ الکترون ظرفیتی در هر اتم خود بوده و سطح صیقلی و درخشان دارند.

**۴۳** درست؛ همه نافلزها (به غیر H و He) و شبه‌فلزها در دسته p با ۳۶ عنصر قرار دارند، پس بیش از ۸۲ عنصر از ۱۱۸ عنصر فلزند.

### کربن

سومین عنصر فراوان موجود در سیاره مشتری است.

در روند تشکیل عناصر، پس از هلیم تولید شده است.

یکی از ابیوتوبهای آن در ایجاد مقیاس amu کاربرد داشته است.

در ساختار سوختهای سیز و پلاستیک‌های سبز یافت می‌شود.

الماس و گرافیت، از جمله آلتوبوپهای آن هستند.

اتم آن، توانایی تشکیل یون تکاتمی را ندارد.

در ساختار جامد‌های یونی، کوالانسی و مولکولی یافت می‌شود.

عنصر اصلی سازنده نفت خام است.

در ساختار همه هیدروکربن‌ها و سایر مواد آلی یافت می‌شود.

در مقایسه با سیلیسیم، آهن و مس واکنش‌پذیری بیشتری دارد.

اکسیدهای آن، از آگزو خودروهای در حال حرکت خارج می‌شود.

**۱**- حواستون باشه که فسفر سفید با فرمول شیمیایی  $P_4$  ناقطبی بوده و در آب نامحلول است.

۵۰. درست؛ سرب مداد یا گرافیت، آلوتروبی از کربن با چینش دو بعدی اتمها و بسیار نرم است.

۵۱. درست؛ در دوره سوم جدول تناوبی زیر لایه های ۳S و ۳P شروع به پرشدن می کنند و عنصر اول این دوره سطح درخشان دارند.

۵۲. نادرست؛ با افزایش شعاع اتمی فلزهای قلیایی، این فلزها آسان تر الکترون از دست داده و واکنش پذیری آنها افزایش می یابند.

۵۳. نادرست؛ مقایسه واکنش پذیری ۴ عنصر اول دوره دوم جدول تناوبی به صورت  $C > Be > B > Li$  است (نمودار صفحه ۴۷ کتاب درسی).

۵۴. درست؛ با افزایش عدد اتمی هالوژن ها، شعاع اتمی و نقطه جوش آنها افزایش، ولی واکنش پذیری آنها کاهش می یابد.

۵۵. درست؛ هر چه فعالیت شیمیایی یا واکنش پذیری یک عنصر بیشتر باشد، واکنش شیمیایی سریع تر و شدیدتر انجام می شود.

۵۶. نادرست؛ عنصر نافلزی کربن تمایلی به گرفتن الکترون ندارد!

۵۷. درست؛ در جدول تناوبی، تعداد نافلزها که تمایل به گرفتن الکترون دارند، از تعداد فلزهای چکش خوار کمتر است.

۵۸. درست؛ فلزهای دوره سوم، در اثر ضربه تغییر شکل داده ولی خرد نمی شوند و در حالت جامد سطحی درخشان دارند.

۵۹. نادرست؛ در تمامی دوره ها، کمترین واکنش پذیری مربوط به گازهای نجیب است که در دوره دوم آرایش الکترونی آن به  $2s^2 2p^6$  ختم می شود.

۶۰. نادرست؛ جلای نقره ای فلز سدیم در مجاورت هوا به سرعت از بین رفته و کدر می شود.

۶۱. نادرست؛ ژرمانیم رسانایی الکتریکی کمتری از قلع داشته و در آرایش الکترونی آن ( $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ )،  $14$  الکترون با  $= 1$  وجود دارد.

۶۲. درست؛ نمودار صفحه ۱۳ کتاب درسی رو دریاب!

۶۳. درست؛ از ۶ عنصر گروه ۱۴ جدول دوره ای، تکلیف های اول معلومه (۱ نافلز، ۲ شبیه فلز و ۲ فلز). عنصر ششم هم به خاطر افزایش خصلت فلزی از بالا به پایین گروه، فلزه!

۶۴. درست؛ ۶ عنصر اول دوره سوم در دمای اتاق، جامدند و عنصر اول این دوره سطح درخشان دارند.

۶۵. نادرست؛ برخلاف گاز فلئور، گاز نیتروژن (معروف به جو) بی اثر) با سدیم واکنش نمی دهد.

۶۶. نادرست؛ علاوه بر شبیه فلزها (نیمه رسانایها)، کربن نیز تنها تمایل به اشتراک گذاشتن الکترون با سایر اتمها دارد.

۶۷. نادرست؛ برای نافلزها، بیشترین واکنش پذیری در یک دوره مربوط به عنصر گروه ۱۷ و در یک گروه مربوط به عنصر دوره ۲ است.

۶۸. نادرست؛ دومین عنصر فلزی گروه  $14 Pb$  و پنجمین فلز واسطه  $Mn$  است.

۶۹. درست؛ حاشیه صفحه ۱۲ کتاب درسی رو ببین! بیشتر است.

۷۰. درست؛ تنها نافلز این گروه (کربن) و دو شبیه فلز  $Si$  و  $Ge$  یون تکاتمی پایدار تشکیل نمی دهند و کاتیون دو فلز  $Pb$  و  $Sn$  هم آرایش گاز نجیب ندارند.

۷۱. درست؛ نمودار صفحه ۱۳ کتاب درسی رو دریاب!

۷۲. نادرست؛ با افزایش عدد اتمی، خصلت فلزی در گروه های جدول تناوبی افزایش و در دوره های جدول تناوبی کاهش می یابد.

۷۳. نادرست؛ در ساخت لامپ های رشته ای، از گاز  $Ar$  با واکنش پذیری ناچیز، ولی در چراغ جلوی خودروها، از هالوژن های واکنش پذیر استفاده می شود.

۷۴. نادرست؛ گالیم در گروه ۱۳ جدول تناوبی، پایین  $Al$  قرار داشته و یک فلز است.

۷۵. نادرست؛ مطابق این قانون، خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دوره ای تکرار می شود.

۷۶. نادرست؛ تنها عنصر از گروه ۱۴ که رسانایی گرمایی ندارد، کربن است که در واکنش با سایر اتمها فقط الکترون به اشتراک می گذارد.

۷۷. درست؛ تنها عنصر مایع در گروه ۱۷ و دوره ۴، برم با عدد اتمی ۳۵ است.

۷۸. درست؛ در همه دوره ها همین طوره!

۷۹. درست؛  $Cl_{17}$  در دمای اتاق با گاز هیدروژن به آرامی واکنش می دهد و هر اتم آن در مقایسه با اتم  $S^{16}$  شاعر کوچکتری دارد.

۸۰- حتی می شه فلز سدیم رو در گاز نیتروژن نگه داری کردا!

۸۱- هلیم، پایین ترین نقطه جوش را در بین عناصر جدول تناوبی دارد.



۹۹. درست؛ از ۶ عنصر گروه ۱۴، ۵ عنصر سطح صیقلی دارند و ۳ عنصر پایین گروه فلزند (سطح صیقلی داشته و چکش خوارند).  
۱۰۰. نادرست؛ واکنش  $\text{FeO}(s)$  با  $\text{Na}(s)$ ، به طور خودبهخودی انجام می‌شود؛ پس در آن واکنش پذیری فراورده‌ها از واکنش‌دهنده‌ها کمتر است.

۱۰۱. نادرست؛ عنصر  $X_{55}$  یک فلز قلیایی بوده و متعلق به دسته ۵ جدول دوره‌ای است و دومین عنصر این دسته یعنی هلیم ( $\text{He}$ )، دو الکترون جفت شده در آرایش الکترون - نقطه‌ای خود دارد ( $\text{He}: \bullet\bullet$ ).

۱۰۲. نادرست؛ آلوتروپ سفیدرنگ فسفر، به خاطر واکنش پذیری بالا در زیر آب نگهداری می‌شود، اما سومین عضو خانواده هالوژن‌ها قرمزرنگ است.

۱۰۳. درست؛ برای گروههای ۱ تا ۱۳، بهجز H و B (که مجموع شماره دوره و گروه آنها غیر ۱۶ است) بقیه فلزند، برای سایر گروه‌ها، مجموع شماره دوره و گروه فقط برای کربن که رسانا است، برابر ۱۶ می‌شود.

۱۰۴. درست؛ استخراج فلزهای فعال‌تر که تمایل به از دست دادن الکترون بیشتری دارند، از سنگ معدن دشوارتر خواهد بود.

۱۰۵. درست؛ عنصر A یک فلز قلیایی خاکی است و خصلت فلزی در جدول تناوبی از راست به چپ و از بالا به پایین (مشابه حرکت از A به E) افزایش می‌یابد.

۱۰۶. نادرست؛ در یک گروه جدول تناوبی، خصلت نافلزی از بالا به پایین کاهش می‌یابد.

۱۰۷. درست؛ عنصر X، دو زیرلایه ۶ الکترونی  $2p^6$  و  $3p^6$  دارد. شعاع اتم عنصر G از شعاع اتم عنصر پایینی آن در گروه ۱۶ کمتر است، و شعاع اتم عنصر پایینی G از شعاع اتمی X کمتر است.

۱۰۸. نادرست؛ شعاع اتمی X از Z بزرگ‌تر است. (در یک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی کاهش می‌یابد).

۱۰۹. نادرست؛ دمای جوش کلر و واکنش‌پذیری فلور از گاز دیگر بالاتر است.

۱۱۰. درست؛ فلز Al، کمترین واکنش‌پذیری را در بین فلزهای تناوب سوم داشته و در واکنش آن با فلور ترکیب  $\text{AlF}_3$  ایجاد می‌شود.

۱۱۱. نادرست؛ تمایل گاز زردرنگ کلر برای تبدیل شدن به یون هالید، کمتر از گاز فلور است.

۱۱۲. نادرست؛ اتم سه عنصر اول گروه چهاردهم (شامل  $\text{Ge}_{32}$ )، در واکنش‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارند؛ اما اتم سه عنصر بعدی در واکنش‌ها الکترون از دست می‌دهند.

۱۱۳. درست؛ از ۱۷ عنصری که بین دو عنصر  $\text{Si}_{14}$  و  $\text{Ge}_{32}$  قرار می‌گیرند، ۱۳ عنصر دوره چهارم فلز بوده و رسانای الکتروسیسته هستند.

۱۱۴. درست؛ هالوژن‌ها، نافلز بوده و در هر دوره بیشترین واکنش‌پذیری را دارند.

۱۱۵. درست؛ شعاع  $\text{Cl}$  از  $\text{Br}$  کوچک‌تر است؛ پس اگر آئیون  $\text{Cl}^-$  همان  $\text{Cl}$  باشد، عنصر A می‌تواند آرایش الکترونی  $2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^4 p^5$  داشته باشد.

۱۱۶. درست؛ F، نافلز‌ترین عنصر جدول دوره‌ای است و بین آن و عنصر  $X_{22} = 22 - 9 - 1 = 22$  عنصر دیگر در جدول دوره‌ای وجود ندارد.

۱۱۷. نادرست؛ در بین هالیدهای هیدروژن، تنها  $\text{HF}$  اسید ضعیف بوده و معادله یونش آن برگشت‌پذیر است. از آن جا که F کمترین شعاع را در بین هالوژن‌ها دارد،  $\text{HA}$  اسیدی غیر از HF است.

۱۱۸. نادرست؛ مقایسه واکنش‌پذیری و قدرت نیروهای بین مولکولی به ترتیب به صورت  $B_6 < A_6 < B_7$  و  $A_7 > B_7$  است.

۱۱۹. درست؛ به این ۴ مورد، شکل‌پذیری (مانند قابلیت ورقه و مقتول شدن) هم اضافه کنید!

۱۲۰. درست؛ بر اثر واکنش گاز کلر و فلز سدیم (که آرایش الکترونی آن به  $1s^2$  ختم می‌شود)، نور زردرنگ گسیل خواهد شد.

۱۲۱. درست؛ در شرایط معین، هر چه اتم فلزی آسان‌تر الکترون از دست دهد، با سرعت و شدت بیشتری با نافلزها واکنش داده و خصلت فلزی بیشتری دارد.

۱۲۲. درست؛ عنصر E همان فلور است که در دمای اتاق به حالت گاز بوده و در بین عناصر، بیشترین تمایل به گرفتن الکترون را دارد.

۱۲۳. درست؛ عنصر X، همان گالیم بوده و همانند فلز قلیایی خاکی A (یا همان کلسیم)، یک فلز است.

۱۲۴. نادرست؛ عنصر E با بیشترین خاصیت نافلزی بین این ۳ عنصر، دارای ۷ الکترون ظرفیتی است.

۱۲۵. نادرست؛ آرایش الکترونی لایه ظرفیت عنصرهای Y و X به ترتیب به صورت  $3s^2 3p^6$  و  $4s^2 4p^6$  و نسبت مجموع  $n+1$  الکترون‌های ظرفیتی آنها برابر  $\frac{22}{13}$  است.



۱۳۳. نادرست؛ واکنش پذیری  $\text{Cl}_2$  از  $\text{F}_2$  و واکنش پذیری  $\text{Cl}_2$  از  $\text{Rb}$  کمتر است؛ پس سرعت واکنش میان  $\text{Sr}$  با  $\text{Cl}_2$  کمتر از واکنش دیگر است.

۱۳۴. نادرست؛ در گروه ۱۴ جدول دوره‌ای، همگی عناصری که سطحی درخشان دارند، رسانای گرمای هستند.

۱۳۵. درست؛ در دوره سوم، آلومنیم و سیلیسیم بیشترین تفاوت در شاعع اتمی را دارند و هر دوی آن‌ها،  $6e^-$  با  $=$  دارد.

۱۳۶. درست؛  $\text{Si}$ ، دومین عنصر گروه ۱۴ با سطحی درخشان است و در ساختار مواد کووالانسی سیلیسیم، سیلیسیم دی‌اکسید و سیلیسیم کاربید وجود دارد.

۱۳۷. نادرست؛ لیکوپن فعالیت رادیکال‌های آزاد را کاهش داده و آب مانع رسیدن اکسیژن به فسفر و انجام واکنش می‌شود؛ اما هیچ کدام از این دو ماده باعث تغییر انرژی فعلی‌سازی ( $E_a$ ) واکنش نمی‌شوند.

۱۳۸. درست؛ لیتیم فلز قلیایی با کمترین واکنش پذیری و با ۲ ایزوتوپ پایدار  $^6\text{Li}$  و  $^7\text{Li}$  است.

۱۳۹. درست؛ کلر در دمای اتاق به آرامی با  $\text{H}_2$  واکنش می‌دهد و نسبت به فلورور به کاررفته در ساختار تلفون، شاعع اتمی بزرگ‌تری دارد.

۱۴۰. درست؛ فلورور حتی در دمای  $200^\circ\text{C}$  (دمایی که هوای مایع ایجاد می‌شود)، به سرعت با  $\text{H}_2$  واکنش می‌دهد.

۱۴۱. درست؛ کمترین واکنش پذیری در دوره سوم جدول تناوبی مربوط به  $\text{Ar}$  است که در پتروشیمی شیراز با خلوص بالا تهیه می‌شود.

۱۴۲. نادرست؛ با انحلال ید در هگزان، محلول بنفسرنگ ایجاد می‌شود.

۱۴۳. نادرست؛  $\text{Xe}$ ، گاز نجیب دوره ۵ و عنصر مورد نظر  $\text{Pb}$  است؛ اما جنس لایه محافظ در حلی از فلز  $\text{Sn}$  است.

۱۴۴. نادرست؛ شعله سوختن آبی رنگ گوگرد از شعله زرد رنگ سوختن ناقص متان، دمای بیشتری دارد.

۱۴۵. درست؛ با افزایش عدد اتمی، خصلت نافلزی هالوژن‌ها و آنتالپی پیوند در مولکول آن‌ها کاهش ولی قدرت نیروی وان در والسی در این مواد افزایش می‌باید.

۱۴۶. درست؛ محلول دهان‌شوبه استریل، همان محلول رقیق  $\text{NaCl}$  است.

۱۱۲. درست؛ از بین نافلزهای تناوب دوم، کربن بزرگ‌ترین شاعع اتمی را دارد و ترکیب هیدروژن‌دار آن ( $\text{CH}_4$ ) در دمای  $0^\circ\text{C}$  به حالت گاز است.

۱۱۳. درست؛ فراوان‌ترین شبکه فلز سیاره زمین،  $\text{Si}$  است که رسانای ضعیف جریان الکتریسیته بوده و در ساخت سلول‌های خورشیدی نقش دارد.

۱۱۴. درست؛ واکنش پذیری  $\text{Cl}_2$  از  $\text{Br}_2$  و واکنش پذیری  $\text{K}$  از  $\text{Na}$  بیشتر است؛ پس سرعت واکنش میان  $\text{Cl}_2$  با  $\text{K}$  بیشتر از واکنش دیگر است.

۱۱۵. نادرست؛ هرچند اتم‌های  $\text{C}$  و  $\text{Si}$ ، یون تکاتمی تشکیل نمی‌دهند؛ اما در ساختار ترکیب‌های یونی حاوی آئیون‌هایی مانند کربنات، سیلیکات و ... یافت می‌شوند.

۱۱۶. نادرست؛ رنگ نور حاصل از واکنش فلزهای قلیایی  $\text{Na}$  و  $\text{K}$  با گاز کلر، به ترتیب قرمز، زرد و بنفش است؛ پس طول موج رنگ نور با افزایش عدد اتمی عنصر فلزی کاهش می‌یابد.<sup>۱</sup>

۱۱۷. درست؛ آرایش الکترونی  $\text{Si}$  به  $5s^2 5p^2$  ختم می‌شود، پس  $10e^-$  با  $=$  دارد و در مقایسه با عنصر بالایی خود ( $\text{Ca}$ )، خصلت فلزی بیشتری دارد.

۱۱۸. درست؛ پتانسیم و کلسیم هر دو در دوره ۴ قرار دارند. در هر دوره، واکنش پذیری فلز قلیایی (این جا  $\text{K}$ ) از فلز قلیایی خاکی بیشتر است.

۱۱۹. درست؛ عناصر  $\text{Z}_{22}\text{X}$  و  $\text{Z}_{22}\text{Z}$ ، هر دو در ای طرفیتی هستند، در نتیجه در واکنش با  $\text{O}_2$ ، دی‌اکسید تشکیل می‌دهند (هر اتم  $2e^-$  می‌گیرد).

۱۲۰. درست؛ از ۶ عنصر گروه ۱۴، ۵ عنصر رسانایی گرمایی دارند (همه به غیر از  $\text{C}$ ، و ۳ عنصر آخری فلز و چکش خوارند).

۱۲۱. درست؛ دمای جوش آب از آمونیاک بالاتر بوده و اکسیژن از نیتروژن واکنش پذیرتر است.

۱۲۲. درست؛ اکسید اغلب عناصر نافلزی در آب خاصیت اسیدی دارند و با انحلال در آب، غلظت یون هیدروکسید را کاهش می‌دهند.<sup>۲</sup>

۱- یه جور دیگه! با افزایش عدد اتمی، فعالیت شیمیایی فلزهای قلیایی بیشتر شده، در نتیجه نور آزادشده در واکنش با گاز کلر، انرژی بالاتری (طول موج کمتری) دارد.

۲- برخی اکسیدهای نافلزی مانند  $\text{CO}$  و  $\text{NO}$  بر اثر حل شدن در آب واکنش نمی‌دهند و خصلت اسیدی ندارند.



- ۱۵۱.** درست؛ صفحه ۱۷ کتاب درسی رو ببین!
- ۱۵۲.** درست؛ در عنصرهای Cr<sub>۲۴</sub> و Mn<sub>۲۵</sub>، زیرلایه ۳d به صورت نیمه‌پر است.
- ۱۵۳.** درست؛ یون پایدار نخستین فلز واسطه، آرایش الکترونی  $\text{Ar}^{\infty} 3s^2 3p^6 3d^{۱۸}$  دارد.
- ۱۵۴.** نادرست؛ در فلزهای اصلی دسته p جدول دوره‌ای، آخرین زیرلایه اشغال شده از الکترون، np است که بخشی از لایه طرفیت اتم است؛ اما در مورد فلزات اصلی دسته s، آخرین زیرلایه اشغال شده از الکترون یعنی ns همان لایه طرفیت است (نه بخشی از آن!).
- ۱۵۵.** درست؛ برخی فلزها مانند طلا، نقره، مس و پلاتین به شکل آزاد هم در طبیعت وجود دارند.
- ۱۵۶.** نادرست؛ آرایش الکترونی کاتیون  $\text{Ni}^{۳+} [Ar]^{۳d}^7$  به صورت  $[Ar]^{۳d}^7$  است.
- ۱۵۷.** نادرست؛ زمرد سبزرنگ است.
- ۱۵۸.** درست؛ عنصر مایع گروه ۱۷ جدول تناوبی Br<sub>۲۵</sub> است و مقایسه شاعع اتمی این ۳ عنصر دوره ۴ به صورت  $Br < X_{۲۲} < Z_{۲۵}$  است.
- ۱۵۹.** درست؛ زیرا آخرین عنصر واسطه دوره چهارم (Zn<sub>۳۰</sub>) و آخرین فلز این دوره (Ga<sub>۳۱</sub>)، تنها یک ترکیب کلردار تشکیل می‌دهند.
- ۱۶۰.** نادرست؛ در یون‌های ۲+ این عناصر، همه زیرلایه‌ها از e اشغال شده ولی در یون  $X^{۲+}$  زیرلایه ۳d در لایه سوم خالی است.
- ۱۶۱.** درست؛ طلا رسانای الکتریکی بالای خود را در شرایط دمایی مختلف حفظ می‌کند.
- ۱۶۲.** نادرست؛ به خاطر وجود کاتیون‌های برخی از فلزهای واسطه است.
- ۱۶۳.** نادرست؛ آرایش الکترونی  $\text{Fe}^{۳+} [Ar]^{\infty}$  در Fe<sub>۲</sub>O<sub>۳</sub> به ختم می‌شود.
- ۱۶۴.** نادرست؛ در گروه اول جدول تناوبی، هیدروژن برخلاف فلزهای قلایی در دمای اتاق در حالت گاز است.
- ۱۶۵.** درست؛ اسکاندیم اولین عنصر واسطه و یک فلز است با خواص فیزیکی فلزها!
- اسکاندیم**
- اوین فلز واسطه موجود در جدول تناوبی است.
- در وسائل خانه مثل تلویزیون رنگی و برخی شیشه‌ها وجود دارد.
- با از دست دادن ۳ الکترون، کاتیون Sc<sup>۳+</sup> را تشکیل می‌دهد.
- کاتیون حاصل از آن به آرایش الکترونی  $\text{[Ar]}^{۱} 3s^۲ 3p^۶ 3d^۲ 4s^۲$ ، ۶ الکترون ظرفیتی دارد.
- ۱۳۷.** درست؛ لیتیم و کلر هر دو، ۲ ایزوتوپ طبیعی دارند.
- ۱۳۸.** نادرست؛ از واکنش پاتاسیم با کلر، علاوه بر انرژی، نمک محلول در آب KCl تولید می‌شود.
- ۱۳۹.** نادرست؛ شیشه از شن و ماسه حاوی SiO<sub>۲</sub> ناخالص ساخته می‌شود. Si تنها e به اشتراک می‌گذارد، ولی O علاوه بر اشتراک ۶، می‌تواند e هم بگیرد.
- ۱۴۰.** نادرست؛ برم در دمای ۲۰۰°C و ید در دمای بالاتر از ۴۰۰°C با H<sub>۲</sub> واکنش می‌دهد.
- ۱۴۱.** درست؛ عنصر X<sub>۲</sub> در گروه ۲۰-۱۸ = ۲۰۰-۱۸ و دوره ۴ قرار دارد و ۱۰ عنصر بعدی آن (آخریش Z<sub>۳۰</sub>)، عنصر واسطه هستند.
- ۱۴۲.** نادرست؛ اگر کاتیونی با بار بیشتر از +۲ تشکیل دهنده، علاوه بر زیرلایه ns از زیرلایه d(1) (n-1) هم الکترون از دست می‌دهند.
- ۱۴۳.** درست؛ فلزها عمدتاً در سمت چپ یا مرکز جدول قرار دارند و اغلب به صورت ترکیب یونی در طبیعت یافت می‌شوند.
- ۱۴۴.** درست؛ به غیر از H و He سایر عناصری که آرایش الکترونی آن‌ها به زیرلایه‌ای با = ۱ ختم می‌شود، در شرایط استاندارد جامد و فلزنده.
- ۱۴۵.** نادرست؛ دلیل استفاده از طلا در ساخت لباس فضانوردی، بازتاب زیاد پرتوهای خورشیدی است.
- ۱۴۶.** نادرست؛ نه الزاماً از ۱۲ عنصر ابتدایی دوره چهارم جدول تناوبی، بیرونی‌ترین زیرلایه ۳ عنصر ۴S<sup>۲</sup> و ۹ عنصر ۴S<sup>۲</sup> است.
- ۱۴۷.** درست؛ عنصر X<sub>۲۶</sub> یا همان آهن یک عنصر واسطه است که حضور ترکیب‌های آن در شیشه و ... می‌تواند سبب ایجاد رنگ در این مواد شود.
- ۱۴۸.** درست؛ یون پایدار اسکاندیم، Sc<sup>۳+</sup> با آرایش الکترونی Ar است.
- ۱۴۹.** نادرست؛ در زنگ آهن یون Fe<sup>۳+</sup> وجود دارد.
- ۱۵۰.** نادرست؛ تیتانیم با آرایش الکترونی  $\text{[Ar]}^{۱} 3s^۲ 3p^۶ 3d^۲ 4s^۲$ ، ۶ الکترون ظرفیتی و لی

- ۱- فلزهای کروم و مس با تشکیل کاتیون با بار ۲+، از زیرلایه‌ای ns و (n-1)d الکترون از دست می‌دهند.
- ۲- برخی فلزها مانند طلا، نقره، مس و پلاتین به شکل آزاد هم در طبیعت وجود دارند.



- ۱۸۱.** نادرست؛ این شرط در مورد هفت عنصر  $Zn^{۲+}$ ،  $Kr^{۳+}$  و  $Cr^{۴+}$  با آرایش الکترونی  $[Ar]^{۳d^۵} ۱s^۱$  برقرار است.
- ۱۸۲.** نادرست؛ مقدار طلا در معادن این فلز بسیار کم است.
- ۱۸۳.** درست؛ صفحه ۱۷ کتاب درسی رو ببین!
- ۱۸۴.** درست؛ در فرایند هابر، از آهن به عنوان کاتالیزگر استفاده می‌شود. آهن دو اکسید طبیعی  $Fe_۲O_۳$  و  $FeO$  دارد.
- ۱۸۵.** درست؛ در کاتد این سلول، اتم مس با آرایش الکترونی  $[Ar]^{۳d^۱} ۴s^۱$  تولید می‌شود.
- ۱۸۶.** نادرست؛ تنها آرایش الکترونی فلزهایی که به حالت آزاد در طبیعت یافت می‌شوند، به یک زیرلایه  $d = 1$  ختم می‌شود.
- ۱۸۷.** درست؛ واکنش‌پذیری آهن از مس بیشتر است، پس غلظت یون  $Cu^{۲+}$  محلول و شدت رنگ آن با گذشت زمان کاهش می‌یابد.
- ۱۸۸.** نادرست؛ در هر دو واکنش، گاز  $CO_۲$  تولید شده و ردیابی زیست‌محیطی ایجاد می‌شود.
- ۱۸۹.** درست؛ اتم‌ها با واکنش‌پذیری کمتر، پایداری بیشتری دارند، بنابراین تمایل آن‌ها برای تبدیل شدن به ترکیب در شرایط یکسان کمتر است.
- ۱۹۰.** درست؛ در تمام واکنش‌هایی که به طور خودبهخودی انجام می‌شوند از جمله واکنش ترمیت، سطح انرژی فراورده‌ها پایین‌تر از واکنش‌دهنده‌ها است.
- ۱۹۱.** درست؛ واکنش‌پذیری تیتانیم از آهن بیشتر است.
- ۱۹۲.** درست؛ تیتانیم در ساخت بدنه دوچرخه و آلومینیم در واکنش ترمیت کاربرد دارند و هیچ کدام خوده نمی‌شوند.
- ۱۹۳.** درست؛ در واکنش  $Fe_۲O_۳$  با  $CO$ ، گاز  $CO_۲$  و در واکنش سوختن گاز  $H_۲$ ،  $H_۲O$  تولید می‌شود که هر دو فراورده، گاز گلخانه‌ای هستند.
- ۱۹۴.** نادرست؛ ترکیب یونی حاصل، آهن (II) سولفات با نسبت شمار آنیون به کاتیون برابر یک است.
- ۱۹۵.** نادرست؛ فلزها از جمله منابع تجدیدناپذیرند.
- ۱۹۶.** نادرست؛ مقدار عملی فراورده تولیدشده در هر واکنش، معادل با مقدار فراورده‌ای است که در عمل به دست می‌آید.
- ۱۶۶.** درست؛ صفحه ۱۷ کتاب درسی رو ببین!
- ۱۶۷.** نادرست؛ هر دو عنصر واسطه‌اند.
- ۱۶۸.** درست؛ فلزهای  $Mn^{۲+}$  و  $Cu^{۲+}$  در اعمق اقیانوس‌ها و کف دریا یافته می‌شوند.
- ۱۶۹.** نادرست؛ تغییر واکنش‌پذیری این فلزها با عدد اتمی منظم نیست. مثلاً واکنش‌پذیری  $Cu^{۲+}$  کمتر از  $Zn^{۲+}$  است.
- ۱۷۰.** نادرست؛ در این ۲ دوره، در مجموع ۲۰ عنصر واسطه وجود دارند.
- ۱۷۱.** نادرست؛ در دسته p جدول دوره‌ای ۳۶ عنصر و در زیرلایه  $d$  اتم کروم، ۵ الکترون وجود دارد.
- ۱۷۲.** درست؛ در یک دوره، با افزایش عدد اتمی، اندازه شعاع اتمی کاهش می‌یابد.
- ۱۷۳.** درست؛ Al، آخرین فلز از تناوب سوم و Ga، اولین فلز اصلی با یک زیرلایه پر با  $d = 1$  است و هر دو یون پایدار  $3+$  ایجاد می‌کنند.
- ۱۷۴.** درست؛ در دوره ۴، فلز واسطه با کمترین عدد اتمی (Sc)، بیشترین شعاع اتمی را داشته و فرمول شیمیایی اکسید آن  $Sc_۲O_۳$  است.
- ۱۷۵.** نادرست؛ فلزهای اصلی بعد از گروه ۱۳، مانند Sn و Pb، پس از تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دوره قبل از خود نمی‌رسند.
- ۱۷۶.** درست؛ عنصر  $X_{۷۸}$  در گروه  $10 = (86 - 78)$  با عنصر Ni با آرایش الکترونی لایه ظرفیت  $3d^۸ 4s^۲$  هم‌گروه است.
- ۱۷۷.** درست؛ رابطه  $n+1 = ۵$  به ازای  $n > 2$  درست است و اولین عنصر با  $n = 3$  و  $d = 1$ ، اسکاندیم است.
- ۱۷۸.** درست؛ آرایش الکترونی یون‌های  $Zn^{۲+}$  و  $Cu^{+}$  به  $3d^۱$  ختم می‌شود.
- ۱۷۹.** نادرست؛ اتم آهن برای تبدیل شدن به یون  $Fe^{۳+}$ ، از  $2e^{-}$  و  $4s^۲$  از  $1e^{-}$  با مجموع مقدار  $n+1 = 13$  از دست می‌دهد.
- ۱۸۰.** درست؛ آرایش الکترونی  $Cr^{۲+}$  به صورت  $1s^۲ 2s^۲ 2p^۶ 3s^۲ 3p^۶ 3d^۴$  و نسبت مورد نظر برابر  $\frac{12}{8} = 1.5$  است.

پایه نهم  
دانشگاهی