

فهرست مطالب

فصل اول: راهبردهای حل مسئله

۱۸	راهبرد زیرمسئله	۶
۲۰	راهبرد حل مسئله ساده‌تر	۷
۲۲	راهبرد روش‌های نمادین	۸
۲۳	آزمون جمع‌بندی فصل	*
۱۷۸	پاسخ‌های تشریحی فصل اول	✓
۱۰	راهبرد رسم شکل	۱
۱۲	راهبرد الگو‌سازی (تفکر نظامدار)	۲
۱۳	راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب	۳
۱۵	راهبرد الگویابی	۴
۱۷	راهبرد حدس و آزمایش	۵

فصل دوم: عددهای صحیح

۳۵	ضرب و تقسیم عددهای صحیح	۱
۳۹	آزمون جمع‌بندی فصل	*
۱۹۰	پاسخ‌های تشریحی فصل دوم	✓
۲۵	معرفی عددهای علامت‌دار	۱
۳۰	جمع و تفریق عددهای صحیح (۱)	۲
۳۴	جمع و تفریق عددهای صحیح (۲)	۳

فصل سوم: جبر و معادله

۵۰	معادله	۱
۵۳	آزمون جمع‌بندی فصل	*
۱۹۷	پاسخ‌های تشریحی فصل سوم	✓
۴۱	الگوهای عددی	۱
۴۵	عبارت‌های جبری	۲
۱۴۸	مقدار عددی یک عبارت جبری	۳

فصل چهارم: هندسه و استدلال

۶۸	شکل‌های مساوی (هم‌نهشت)	۱
۷۲	آزمون جمع‌بندی فصل	*
۲۰۴	پاسخ‌های تشریحی فصل چهارم	✓
۵۵	روابط بین پاره خط‌ها	۱
۶۰	روابط بین زاویه‌ها	۲
۶۴	تبديلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)	۳

فصل پنجم: شمارندها و اعداد اول

۸۷	کوچک‌ترین مضرب مشترک	۱
۹۲	آزمون جمع‌بندی فصل	*
۲۱۲	پاسخ‌های تشریحی فصل پنجم	✓
۷۴	عددهای اول	۱
۷۷	شمارنده‌های اول	۲
۸۳	بزرگ‌ترین شمارنده مشترک	۳

۹۶

آزمون پایان نوبت اول (۲)



۹۴

آزمون پایان نوبت اول (۱)



۲۲۰

پاسخ‌های تشریحی آزمون‌های پایان نوبت اول



فصل ششم: سطح و حجم

حجم و سطح

۱۱۰



آزمون جمع‌بندی فصل

۱۱۵



پاسخ‌های تشریحی فصل ششم

۲۲۲



حجم‌های هندسی

۹۸



محاسبه حجم‌های منشوری

۱۰۳



مساحت جانبی و مساحت کل

۱۰۶



فصل هفتم: توان و جذر

جذرو ریشه

۱۱۹



آزمون جمع‌بندی فصل

۱۳۴



پاسخ‌های تشریحی فصل هفتم

۲۲۹



تعریف توان

۱۱۷



محاسبه عبارت‌های توان دار

۱۲۱



ساده کردن عبارت‌های توان دار

۱۲۵



فصل هشتم: بردار و مختصات

بردار انتقال

۱۴۸



آزمون جمع‌بندی فصل

۱۵۳



پاسخ‌های تشریحی فصل هشتم

۲۳۷



پاره خط جهتدار

۱۳۶



بردارهای مساوی و قرینه

۱۳۹



مختصات

۱۴۳



فصل نهم: آمار و احتمال

احتمال و تجربه

۱۶۶



آزمون جمع‌بندی فصل

۱۶۹



پاسخ‌های تشریحی فصل هشتم

۲۴۳



جمع آوری و نمایش داده‌ها

۱۵۵



نمودارها و تفسیر نتیجه‌ها

۱۵۹



احتمال یا اندازه‌گیری شانس

۱۶۳



آزمون پایان نوبت دوم (۲)

۱۷۳



آزمون پایان نوبت دوم (۱)

۱۷۱



۲۴۸

پاسخ‌های تشریحی آزمون‌های پایان نوبت دوم

۲۴۸



درست‌نامه ۹ پرسش‌ها

www.gajmarket.com

فصل سوم:
جبر و معادله

۱۶۱

فصل ششم:
سطح و حجم

۹۸

فصل نهم:
آمار و احتمال

۱۵۵

فصل دوم:
عددهای صحیح

۲۵

فصل پنجم:
شمارندها و اعداد اول

۷۱۴

فصل هشتم:
بردار و مختصات

۱۳۶

فصل اول:
راهنمای حل مسئله

۱۰

فصل چهارم:
هندسه و استدلال

۵۵

فصل هفتم:
توان و جذر

۱۱۷

فصل اول


راهبردهای حل مسئله

درس اول: راهبرد رسم شکل



گاهی رسم یک شکل مناسب می‌تواند به حل مسئله کمک کند یا به طور کامل آن را حل کند؛ به طوری که نیازی به نوشتن عملیات و محاسبه نباشد. گاهی ممکن است شکل را فقط تصور کنید و آن را رسم نکنید. منظور از رسم شکل، نقاشی نیست؛ بلکه می‌توانید برای این کار شکل‌های ساده بکشید.

مثال درون یک باگچه مستطیل شکل به طول ۸ و عرض ۶ متر، یک حوض دایره‌ای می‌سازیم. بیشترین مساحت ممکن برای این حوض تقریباً چقدر است؟
 $(3 = \text{عدد پی})$



شکل باگچه و حوض را به صورت مقابل رسم می‌کنیم:

باتوجه به شکل، مشاهده می‌شود برای اینکه مساحت حوض بیشترین مقدار ممکن شود، باید اندازه قطر دایره، برابر با عرض مستطیل باشد. پس:
 $\text{مساحت دایره} = \pi \times (\text{شعاع})^2 = \pi \times 3^2 = 27$ مترمربع

گاهی صورت مسئله به طور مستقیم به هیچ شکلی اشاره ندارد، اما خودمان می‌توانیم برای حل مسئله، شرایط داده شده را بایک شکل مناسب شبیه‌سازی کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

مثال ثلث یک مخزن، پراز آب است. ۱۵ لیتر آب به آن اضافه می‌کیم و مخزن تا نیمه پر می‌شود. گنجایش مخزن چقدر است؟

روش اول: (بدون استفاده از رسم شکل) ابتدا مشخص می‌کنیم اختلاف ثلث و نصف گنجایش مخزن، چه کسری از گنجایش است:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

حال با استفاده از تناسب، داریم:

$$\frac{1}{6} = \frac{15^\circ}{\square} \Rightarrow \square = 6 \times 15^\circ = 90^\circ$$


روش دوم: (با استفاده از رسم شکل)



$$15^\circ = 90^\circ = 6 \times 15^\circ = \text{گنجایش کل}$$

مشاهده می‌شود، یک مسئله می‌تواند از روش‌های مختلف حل شود، اما در اینجا با استفاده از راهبرد رسم شکل، مسئله راحت‌تر و ساده‌تر حل شده است.

۱) قدر $\frac{1}{3}$ دانشآموزان کلاسی بیشتر از ۱۶۰ سانتی‌متر و قدر $\frac{1}{7}$ دانشآموزان آن کلاس بین ۱۵۰ و ۱۶۰ سانتی‌متر است. اگر تعداد دانشآموزان با قدر کمتر از ۱۵۰ سانتی‌متر ۴ نفر باشد، تعداد کل دانشآموزان این کلاس، چند نفر است؟

با توجه به شرایط مسئله، یک مستطیل به صورت مقابله درنظر می‌گیریم و تقسیم‌بندی‌های مورد نظر را به صورت مرحله به مرحله در آن انجام می‌دهیم:


$$\text{تعداد کل دانشآموزان} = 6 \times 4 = 24$$

پرسش‌های درس اول

درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

۱) در راهبرد رسم شکل، باید یک شکل کاملاً دقیق همراه با جزئیات رسم شود.

۲) راهبرد رسم شکل، برای حل برخی مسئله‌ها، نه همهٔ مسئله‌ها، نامناسب است.

جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید.

۳) گاهی می‌تواند مسئله را به طور کامل حل کند و نیازی به نوشتن راه حل طولانی و پیچیده نباشد.

۴) در راهبرد رسم شکل، همیشه نیاز به رسم شکل روی کاغذ نیست و گاهی ممکن است فقط شکل را کنیم.

گزینهٔ درست را مشخص کنید.

۵) درون یک باغچهٔ مربع شکل به ضلع ۵ متر، به فاصلهٔ ۱ متر از کناره‌ها، یک ردیف گل بنفسهٔ می‌کاریم. محیط مربعی که اضلاع آن گل‌کاری شده، چند متر است؟

۸

۱۲

۱۶

۲۰

۶) اگر نصف یک منبع ۶۰۰ لیتری را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم، گنجایش هر قسمت چند سی سی است؟

۲۰۰

۱۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۷) یک باغچهٔ مستطیل شکل به طول ۸ و عرض ۶ متر داریم. می‌خواهیم به فاصلهٔ $\frac{1}{5}$ متر از اضلاع باغچه، دور تا دور آن را نرده بکشیم. برای این کار، به چند متر نرده نیاز داریم؟

۸) توپ از ارتفاع ۳۲ متری سطح زمین رها می‌شود و هر بار که به زمین می‌خورد، تا نصف ارتفاع قبلی بالا می‌رود. این توپ از لحظه‌رها شدن تا لحظه‌ای که برای سومین بار به زمین می‌خورد، چند متر حرکت می‌کند؟

۹) مطابق شکل، قورباغه‌ای می‌خواهد از یک سطح شبیدار به طول $\frac{8}{5}$ متر بالا برود. او با هر بار جهش ۳ متر بالا می‌رود و سپس ۲ متر سر می‌خورد و به پایین می‌آید. این قورباغه، با چند جهش می‌تواند به بالای سطح شبیدار برسد؟

۱۰) آقای رستمی برای انجام یک کار اداری، به یک اداره رفت. ابتدا نگهبان اداره او را به طبقهٔ پنجم او را برای دریافت یک امضا به دو طبقهٔ پایین تر فرستاد. سپس او برای دریافت امضا دیگر به ۴ طبقه بالاتر رفت؛ اما کارمند مورد نظر به مرخصی رفته بود، بنابراین او به اتاق رئیس اداره، در یک طبقه بالاتر رفت. اگر اتاق رئیس در طبقه آخر این ساختمان بوده باشد، این ساختمان چند طبقه بالای همکف دارد؟

۱۱) شخصی در روز اول، ثلث، در روز دوم، نصف باقی‌مانده و در روز سوم، ربع باقی‌مانده باگش را آبیاری می‌کند. چه کسری از باغ او هنوز آبیاری نشده است؟

۱۲) علی با $\frac{1}{3}$ پولش، یک دفتر و با $\frac{1}{3}$ بقیهٔ پولش، دو خودکار خرید و در نهایت ۱۸۰۰ تومان برایش باقی ماند. پول او لیلهٔ او چند تومان بوده است؟

۱۳) در یک مهمانی، ۶ نفر به‌طور همزمان وارد می‌شوند و باهم دست می‌دهند. اگر دونفر، فقط یک بار باهم دست بدھند، عمل دست دادن چند بار انجام می‌شود؟

درس دوم: راهبرد الگوسازی (تفکر نظام‌دار)



برای حل بعضی از مسئله‌ها باید همه حالت‌های ممکن را بنویسیم. برای اینکه هیچ حالتی از قلم نیفتد، لازم است آن‌ها را با نظم، الگو و ترتیبی مشخص بنویسیم. الگوسازی به ما کمک می‌کند تا مطمئن شویم همه حالت‌ها را نوشته‌ایم. بنابراین در مسئله‌هایی که لازم است همه جواب‌ها و پاسخ‌های ممکن را بنویسیم، می‌توانیم از این راهبرد استفاده کنیم. با توجه به نظم و ترتیبی که می‌سازیم، به این راهبرد، تفکر نظام‌دار نیز می‌گوییم.


مثال دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آن‌ها 3 و حاصل جمع آن‌ها کمترین مقدار ممکن باشد.

اولین عدد	دومین عدد	حاصل جمع
۱	۳۰	۳۱
۲	۱۵	۱۷
۳	۱۰	۱۳
۵	۶	۱۱

برای حل این سؤال، یک جدول به شکل مقابل رسم می‌کنیم و به صورت کاملاً منظم (نظام‌دار) عدد‌هایی که حاصل ضرب آن‌ها 3 می‌شود را در آن می‌نویسیم و برای هر مورد، حاصل جمع دو عدد را می‌نویسیم و این کار را تا زمانی ادامه می‌دهیم که به حاصل جمع تکراری نرسیده باشیم. وقتی تمام حالت‌ها نوشته شد، دو عدد را پیدا می‌کنیم. با توجه به جدول، مشاهده می‌شود دو عدد مورد نظر ۵ و ۶ هستند. ← کمترین حاصل جمع

مثال به چند روش می‌توان یک گروه ۲ نفره، از میان ۵ نفر انتخاب کرد؟

۵ نفر اولیه را با شماره‌های ۱ تا ۵ نام‌گذاری می‌کنیم. حال کافی است به ترتیب و به صورت منظم (نظام‌دار) همه حالت‌هایی را که می‌توان دو شماره از بین شماره‌های ۱ تا ۵ انتخاب کرد، بنویسیم:



پرسش‌های درس دوم



درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

۱۴ اگر تعداد حالت‌هایی که باید در نظر بگیریم، زیاد باشد، از راهبرد الگوسازی استفاده می‌کنیم.

۱۵ الگوسازی کمک می‌کند تا مطمئن شویم هیچ حالتی از قلم نیفتاده است.

جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید.

۱۶ به دلیل اینکه در راهبرد الگوسازی، با نظم و ترتیب خاص به حل مسئله می‌پردازیم، به این راهبرد، راهبرد نیز گفته می‌شود.

۱۷ در راهبرد الگوسازی باید الگویی برای نوشتن به دست آوریم تا هیچ حالتی از قلم نیفتند.

گزینه درست را مشخص کنید.

۱۸ به چند حالت می‌توان از میان دو رنگ خودکار و سه نوع دفتر، یک خودکار و یک دفتر را انتخاب کرد؟

۱۲

۶

۵

۴

به چند حالت حاصل ضرب دو عدد طبیعی، برابر 36 می‌شود؟

۳

۴

۵

۶

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۲۰ با سه رقم ۵۰۳ و ۷ چند عدد سه رقمی می‌توان نوشت؟ (در نوشتن عددها می‌توان از رقم تکراری هم استفاده کرد).

۲۱ تعداد زیادی سکه ۱۰۰ و ۵۰۰ تومانی داریم. به چند حالت مختلف می‌توانیم با این سکه‌ها، کرایه ۳۷۰۰ تومانی یک تاکسی را پرداخت کنیم؟

۲۲ به چند طریق می‌توان دو پیراهن سبز و زرد را همراه با سه شلوار مشکی، سورمه‌ای و طوسی به تن کرد؟

۲۳ دو عدد طبیعی داریم که حاصل ضرب آن‌ها ۴۸ است. کمترین مقدار ممکن برای حاصل جمع آن‌ها چند است؟

۲۴ دو عدد طبیعی داریم که حاصل جمع آن‌ها ۱۵ است. بیشترین مقدار ممکن برای حاصل ضرب آن‌ها چند است؟

درس سوم: راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب



در بعضی مسائل، برای پیدا کردن جواب، نیاز است همهٔ حالت‌ها را بنویسیم و از میان آن‌ها، جواب‌های ممکن را به دست آوریم. در این موارد، بعد از اینکه همهٔ حالت‌ها را با استفاده از راهبرد الگوسازی (یا به هر روش دیگر) نوشته‌یم، حالت‌های نامطلوب را حذف می‌کنیم تا فقط حالت (یا حالت‌های) مطلوب مورد نظرِ مسئله باقی بماند.

مثال مجموع سن سه نفر ۱۴ و حاصل ضرب سن آن‌ها ۷ است. بزرگ‌ترین فرد چند ساله است؟ (سن افراد، عددی طبیعی است).

ابتدا به صورت نظامدار، همهٔ حالت‌هایی را که حاصل ضرب ۳ عدد برابر ۷ می‌شود، می‌نویسیم. سپس در ستون آخر، حالت‌های نامطلوب، یعنی حالت‌هایی را که مجموع سه عدد برابر ۱۴ نیست، حذف می‌کنیم تا فقط حالت (یا حالت‌های) مطلوب باقی بماند.

با توجه به جدول مشاهده می‌شود که در حالت مطلوب، سن افراد ۵، ۲ و ۷ است که بیشترین آن‌ها ۷ است.

در این مثال، می‌توانستیم ابتدا همهٔ حالت‌هایی را که جمع سه عدد برابر ۱۴ می‌شود، بنویسیم؛ سپس در ستون آخر، بررسی کنیم که حاصل ضرب آن‌ها برابر ۷ می‌شود یا خیر. اما این کار بسیار طولانی می‌شود! زیرا تعداد حالت‌هایی که جمع چند عدد، مقدار ثابتی شود، خیلی بیشتر از تعداد حالت‌هایی است که ضرب همان تعداد عدد، مقدار ثابتی شود!

مثال در بازی‌هایی مثل «بیست‌سؤالی»، که یک نفر باید با پرسیدن تعدادی سؤال که فقط جواب‌های «بله» یا «خیر» دارد، آنچه را که مدنظر فرد مقابل است تشخیص دهد، برای اینکه فرد سؤال کننده، با کمترین تعداد سؤال ممکن، مطمئن شود که به جواب می‌رسد، باید سؤالاتش را به‌گونه‌ای طرح کند که با هر سؤال، نصف (یا حدود نصف) حالت‌های ممکن (که همان حالت‌های نامطلوب هستند) را حذف کند.

مثال علی یک عدد از میان اعداد طبیعی ۱ تا ۱۰ در ذهن خود انتخاب می‌کند. حامد می‌خواهد با تعدادی سؤال از علی، عدد مورد نظر او را پیدا کند. اگر علی در پاسخ سوالات، فقط جواب «بله» یا «خیر» بدهد، حامد با پرسیدن حداقل چند سؤال، مطمئناً عدد مورد نظر را پیدا خواهد کرد؟

با توجه به نکته فوق، سؤال کننده باید به‌گونه‌ای سوالات خود را پرسد که با هر سؤال، نصف (یا حدود نصف) حالت‌ها (که حالت‌های نامطلوب هستند) حذف شوند. مثلاً سؤال و جواب‌ها در این مثال، می‌تواند به صورت زیر باشد:

۱ آیا عدد مورد نظر، زوج است؟ بله (پنج عدد ۱، ۳، ۵، ۷ و ۹ حذف می‌شوند).

۲ آیا عدد مورد نظر، کوچک‌تر از ۶ است؟ خیر (دو عدد ۲ و ۴ حذف و سه عدد ۶، ۸ و ۱۰ باقی می‌مانند).

۳ آیا عدد مورد نظر، ضرب ۳ است؟ خیر (عدد ۶ حذف و دو عدد ۸ و ۱۰ باقی می‌مانند).

۴ آیا عدد مورد نظر، ۱۰ است؟ خیر (به جواب رسیدیم! عدد مورد نظر ۸ است).

بنابراین حامد با پرسیدن حداقل چهار سؤال، مطمئناً به جواب خواهد رسید.

توجه کنید که ممکن است حامد یکی که همهٔ اعداد را پرسد و در اولین سؤال به جواب برسد؛ ولی با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم با چند سؤال به جواب می‌رسد. ممکن است جواب در نهمین سؤال مشخص شود!

نحوه ۱ یکی از کاربردهای مهم راهبرد «حذف حالت‌های نامطلوب» در پاسخ دادن به سؤالات تستی است. در واقع در یک سؤال تستی، با چهار حالت مواجهیم که سه‌تای آن‌ها نامطلوب‌اند و می‌توانیم با حذف آن‌ها به جواب برسیم.

نحوه ۲ سن پدر علی ۵ برابر سن علی است. اگر ۶ سال بعد، سن پدر علی سه برابر سن علی شود، در حال حاضر علی چند سال دارد؟

۷

۶

۵

۴

چهار حالت داریم که با حذف سه‌تای آن‌ها (حذف حالت‌های نامطلوب) به جواب می‌رسیم. پس یکی گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

$$\text{۱} \quad \begin{array}{l} \text{۶ سال بعد} \\ ۶ + ۶ = ۱۲ \\ \text{سن علی} \end{array} \rightarrow \boxed{x}$$

$$\text{۲} \quad \begin{array}{l} \text{۶ سال بعد} \\ ۲۰ + ۶ = ۲۶ \\ \text{سن پدر علی} \end{array} \rightarrow \boxed{x}$$

$$\text{۳} \quad \begin{array}{l} \text{۶ سال بعد} \\ ۲۵ + ۶ = ۳۱ \\ \text{سن پدر علی} \end{array} \rightarrow \boxed{x}$$

$$\text{۴} \quad \begin{array}{l} \text{۶ سال بعد} \\ ۳۰ + ۶ = ۳۶ \\ \text{سن پدر علی} \end{array} \rightarrow \boxed{\checkmark}$$

حالت مطلوب، گزینه «۴» است. بررسی گزینه «۳» به عهده شما.

پرسش‌های درس سوم



درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

۲۵ گاهی بعد از استفاده از راهبرد الگوسازی، از راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب استفاده می‌کنیم تا فقط حالت‌های مطلوب باقی بمانند.

۲۶ در بازی‌هایی مثل «بیست‌سؤالی» برای طرح هر سؤال، از راهبرد الگوسازی یا تفکر نظام دار استفاده می‌کنیم تا هرچه زودتر به جواب برسیم.

جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید.

۲۷ برای استفاده از راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب، ابتدا باید با استفاده از راهبرد همه حالت‌ها را بنویسیم.

۲۸ یکی از کاربردهای راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب، پیدا کردن پاسخ برخی سؤالات معروف است.

گزینه درست را مشخص کنید.

۲۹ حاصل ضرب سن دو نفر ۳۰ است. کمترین مقدار حاصل جمع سن آن‌ها کدام است؟ (سن افراد، عددی طبیعی است).

۱۳

۱۲

۱۱

۱۰

۳۰ اگر دو برابر عددی را با عدد پنج جمع کنیم، حاصل، سه تا کمتر از عدد ۲۰ می‌شود. آن عدد کدام است؟

۵

۶

۷

۸

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۳۱ حاصل جمع دو عدد صحیح مثبت، برابر ۱۲ است. اگر یکی ۳ برابر دیگری باشد، آن دو عدد را پیدا کنید.

۳۲ حاصل ضرب سه عدد طبیعی ۶ است. اگر حاصل جمع آن‌ها ۱۷ باشد، بزرگ‌ترین عدد درین آن‌ها چند است؟

۳۳ بزرگ‌ترین عدد چهار رقمی را که بر ۲، ۳ و ۵ بخش‌پذیر نباشد، پیدا کنید.

۳۴ من خواهیم با پرسیدن سؤال‌هایی که فقط جواب «بله» یا «خیر» دارند، ماه تولد یک فرد را بیاییم. حداقل تعداد پرسش‌های لازم برای اینکه مطمئن باشیم به جواب می‌رسیم، چند تاست؟

۳۵ حداقل چند پرسش با جواب «بله» یا «خیر» باید از یک فرد پرسیده شود، تا مطمئن باشیم روز تولد او (که در فروردین ماه است) مشخص می‌شود؟

۳۶ پول امیر سه برابر پول رضا است. اگر امیر نصف پولش را به رضا بدهد، پول رضا از دو برابر پول امیر ۱۰ هزار تومان کمتر خواهد شد. پول رضا کدامیک

از مقادیر ۱۰، ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان است؟



۳۷ از میان عده‌های طبیعی، علی یک عدد بزرگ‌تر از ۱۰ انتخاب می‌کند؛ به طوری که سه برابر این عدد، بزرگ‌تر از ۲۵ نیست. اگر نصف این

عدد بزرگ‌تر از $\frac{3}{5}$ باشد، این عدد چند است؟






1

آزمون جمع‌بندی



ردیف	آزمون فصل ۱	راهبردهای حل مسئله	مدت زمان: ۷۵ دقیقه	پاره
۱	درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.	در راهبرد الگوسازی، سعی می‌کنیم با یک الگو منظم، همهٔ حالت‌ها را در نظر بگیریم تا هیچ حالتی از قلم نیافتد.	۰/۵	۰/۵
۲	در راهبرد الگویابی، به دنبال پیدا کردن نظم خاصی بین داده‌های مسئله هستیم.	در راهبرد الگویابی، به دنبال پیدا کردن نظم خاصی بین داده‌های مسئله هستیم.	۰/۵	۰/۵
۳	در راهبرد رسم شکل، می‌توانیم از شکل‌هایی برای تبدیل مسئله به یک معادله استفاده کنیم.	در راهبرد رسم شکل، می‌توانیم از شکل‌هایی برای تبدیل مسئله به یک معادله استفاده کنیم.	۰/۵	۰/۵
۴	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید.	در راهبرد نیز به دنبال پیدا کردن یک الگو هستیم؛ سپس این الگو را به مسئله اصلی مرتبط می‌کنیم و جواب را به دست می‌آوریم.	۰/۵	۰/۵
۵	در راهبرد ابتدا به صورت نظام دار، همهٔ حالت‌های ممکن را می‌نویسیم؛ سپس حالت‌های نامطلوب را حذف می‌کنیم تا فقط حالت (حالت‌های) مطلوب باقی بماند.	در راهبرد ابتدا به صورت نظام دار، همهٔ حالت‌های ممکن را می‌نویسیم؛ سپس حالت‌های نامطلوب را حذف می‌کنیم تا فقط حالت (حالت‌های) مطلوب باقی بماند.	۰/۵	۰/۵
۶	در راهبرد به صورت منظم و منطقی، یک جواب برای مسئله پیشنهاد می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که آیا جوابمان درست است یا نیاز به اصلاح دارد.	در راهبرد به صورت منظم و منطقی، یک جواب برای مسئله پیشنهاد می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که آیا جوابمان درست است یا نیاز به اصلاح دارد.	۰/۵	۰/۵
۷	گزینهٔ درست را مشخص کنید.	در کدام گزینه، کسر کوچک‌تری از شکل، رنگی است؟	۰/۵	۱
۸	در یک صفحهٔ شطرنج (شبکهٔ مربعی 8×8)، چند مربع وجود دارد؟	۲۰۴ ۱۲۸ ۶۴ ۲۵۶	۰/۵	۰/۵
۹	در یک پارکینگ، ۳۰ دوچرخه و سه‌چرخه وجود دارد. اگر تعداد کل چرخ‌های آن‌ها ۴۳ تا بیشتر از تعداد زین‌های آن‌ها باشد، اختلاف تعداد دوچرخه‌ها و سه‌چرخه‌ها چندتا است؟ (زین، به صندلی دوچرخه یا سه‌چرخه گفته می‌شود).	۶ ۵ ۴ ۳	۰/۵	۰/۵
۱۰	یک خودرو از حالت سکون شروع به حرکت می‌کند و در هر دقیقه، ۵۰۰ متر از دقیقه قبل بیشتر حرکت می‌کند. اگر این خودرو در هفت دقیقه اول حرکتش ۱۷۵۰۰ متر حرکت کرده باشد، در دقیقه دوم و سوم، مجموعاً چند متر حرکت کرده است؟	۴۵۰۰ ۳۵۰۰ ۲۵۰۰ ۱۵۰۰	۰/۵	۰/۵

ردیف	آزمون فصل ا	راهبردهای حل مسئله	مدت زمان: ۷۵ دقیقه	بارم
۱۱	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. طول ضلع مربعی ۲۰۰ سانتی متر است. اگر اضلاع آن $\frac{1}{5}$ برابر کنیم، به مساحتش چند متر مربع اضافه می‌شود؟ (راهبرد رسم شکل)			۱/۵
۱۲	در یک کلاس، ۱۵ نفر عضو تیم فوتبال، ۱۲ نفر عضو تیم والیبال و ۳ نفر در هر دو تیم عضو باشند، چند نفر فقط عضو تیم فوتبال هستند؟ (راهبرد رسم شکل)			۱
۱۳	پنج نفر به نام‌های رضا، بابک، علی، همایون و صدرا در یک مسابقه علمی شرکت کرده‌اند. علی در رتبه‌ای قرار گرفت که تعداد افراد بالاتر از او با تعداد افراد پایین‌تر از او برابر است. اگر بابک نفر آخر (پایین‌ترین رتبه) بوده باشد و همایون سه رتبه بالاتر از رضا بوده باشد، صدرا چندمین نفر است؟ (راهبرد رسم شکل)			۱/۵
۱۴	یک قطعه زمین مستطیل شکل به مساحت 144 متر مربع در کنار یک رودخانه قرار دارد. می‌خواهیم سه طرف این زمین را که در مجاورت رودخانه نیست، حصارکشی کنیم. اگر طول اضلاع زمین عددهای صحیح باشند، حداقل به چند متر حصار نیاز داریم؟ (راهبرد الگوسازی)			۱
۱۵	شخصی ۵ تیر به طرف یک هدف به شکل مقابل شلیک می‌کند و هر پنج تیر به هدف برخورد می‌کند. امتیازهای مربوط به هر ناحیه، داخل آن ناحیه نوشته شده است. چه تعداد از عددهای ۵۲ ، ۴۷ ، ۴۲ ، ۳۸ و ۲۸ می‌تواند مجموع امتیازهای این شخص باشد؟ (راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب)			۱/۵
۱۶	مریم، مهسا، مینا و مهری می‌خواهند در یک ردیف در کنار هم بایستند. آن‌ها به چند حالت مختلف می‌توانند بایستند؟ (راهبرد الگوسازی)			۱/۵
۱۷	اگر مساحت شکل مقابل 99 باشد، محیط آن کدام است؟ (راهبرد زیرمسئله)			۱
۱۸	در یک کارخانه 7983 لامپ در یک روز تولید شده است. اگر $\frac{7}{16}$ لامپ‌ها آفتابی و بقیه مهتابی باشند، و قیمت هر لامپ آفتابی و مهتابی به ترتیب 10 و 15 هزار تومان باشد، قیمت کل لامپ‌ها تقریباً چند میلیون تومان است؟ (راهبرد حل مسئله ساده‌تر و زیرمسئله)			۱/۵
۱۹	محسن به اندازه خرید 24 خودکار یا 16 روان‌نویس پول دارد. اگر او تصمیم به خرید 19 خودکار بگیرد، حداقل چند روان‌نویس می‌تواند بخرد؟ (راهبرد زیرمسئله)			۱/۵
۲۰	اگر از سه برابر عددی 7 واحد کم کنیم، حاصل، برابر با ثلث عدد 96 خواهد بود. آن عدد چند است؟ (راهبرد روش‌های نمادین)			۱

پاسخ‌نامه تشریحی

www.gajmarket.com

فصل سوم:
جبر و معادله

۱۹۷

فصل ششم:
سطح و حجم

۲۲۲

فصل نهم:
آمار و احتمال

۲۴۳

فصل دوم:
عددهای صحیح

۱۹۰

فصل پنجم:
شمارندها و اعداد اول

۲۱۲

فصل هشتم:
بردار و مختصات

۲۳۷

فصل اول:
راهنمای حل مسئله

۱۷۸

فصل چهارم:
هندسه و استدلال


۲۰۴

فصل هفتم:
توان و جذر

۲۲۹

۹


باتوجه به اینکه قورباغه در هر مرحله سه متر به بالا و سپس دو متر به پایین می‌رود، شکل را به صورت مرحله به مرحله رسم می‌کنیم.



بنابراین در مرحله هفتم، قورباغه به بالای سطح شیب دار می‌رسد.


۱۰

با استفاده از راهبرد رسم شکل داریم:



بنابراین این ساختمان ۸ طبقه بالای همکف دارد.

۱۱



۱۲

کل پول علی را بایک مستطیل نشان می‌دهیم. او با $\frac{1}{4}$ پولش یک دفتر خرید، پس:



باتوجه به شکل، مشخص می‌شود که باقی مانده پول علی، ۳ قسمت از ۸ قسمت مساوی است، پس:

$$1800 \div 3 = 600 \text{ هر قسمت}$$

$$8 \times 600 = 4800 \text{ کل پول علی} \Rightarrow$$

درس اول: راهبرد رسم شکل

فصل اول



۱

در راهبرد رسم شکل، نیازی به رسم جزئیات نیست و شکل می‌تواند به صورت کلی رسم شود.

۲

۳

رسم یک شکل مناسب

۴

تصور

۵




۶



ناحیه مورد نظر $\frac{1}{6}$ کل شکل است، پس:
سی سی $= 100000 \times \frac{1}{6} = 16666.66$ لیتر

۷

با استفاده از راهبرد رسم شکل داریم:




متر $= 9 \times 5 = 45$ طول
متر $= 5 \times 5 = 25$ عرض

حال به اندازه محیط ناحیه نزدیکشی شده، نزدیکی داریم که برابر است با:
۷+۹+۷+۹ = 32

۸

از راهبرد رسم شکل استفاده می‌کنیم:



متر $= 32 + 16 + 16 + 8 + 8 = 88$ مقدار مسافت طی شده تا سومین برخورد به زمین

	رقم ۳	رقم ۵	رقم ۷
بدون رقم یکسان	۳۵۷	۵۳۷	۷۳۵
(همه ارقام متفاوت)	۳۷۵	۵۷۳	۷۵۳

⇒ ۶ عدد

بنابراین می‌توان $27 = 6 + 18 + 3$ عدد ساخت.

۲۱


از راهبرد الگو‌سازی (تفکر نظام دار) استفاده می‌کنیم. توجه کنید که بیشترین تعداد ممکن برای ۵۰۰ تومانی، ۷ تا است و هر بار که یکی از ۵۰۰ تومانی‌ها کم می‌کنیم، باید ۵ تا به ۱۰۰ تومانی‌ها اضافه کنیم:

۸ حالت	مجموع	
	تعداد ۵۰۰ تومانی	تعداد ۱۰۰ تومانی
۷	۲	$7 \times 500 + 2 \times 100 = 3500 + 200 = 3700$
۶	۷	$6 \times 500 + 7 \times 100 = 3000 + 700 = 3700$
۵	۱۲	$5 \times 500 + 12 \times 100 = 2500 + 1200 = 3700$
⋮	⋮	⋮
۰	۳۷	$0 \times 500 + 37 \times 100 = 0 + 3700 = 3700$

۲۲

پیراهن	سبز	زرد
شلوار	طوسی سورمه‌ای مشکی	طوسی سورمه‌ای مشکی

نکته برای چنین سوالاتی، می‌توان از نمودار درختی نیز استفاده کرد:




۲۳

یک جدول نظام دار رسم می‌کنیم و به صورت منظم، یکی‌یکی، همه حالت‌هایی را که حاصل ضرب دو عدد طبیعی ۴۸ می‌شود، در آن می‌نویسیم.

اولین عدد	دومن عددها	حاصل جمع
۱	۴۸	۴۹
۲	۲۴	۲۶
۳	۱۶	۱۹
۴	۱۲	۱۶
۶	۸	۱۴

کمترین مقدار حاصل جمع

هر نفر را با یک دایرة کوچک نشان می‌دهیم. سپس همه دایره‌ها را به هم وصل می‌کنیم. در این صورت هر پاره خط نشان دهنده یک عمل دست دادن خواهد بود.

 \Rightarrow ۱۵ = تعداد «دست دادن‌ها» = تعداد پاره خط‌ها

درس دوم: راهبرد الگو‌سازی (تفکر نظام دار)

فصل اول



۱۵

۱۶


تفکر نظام دار



۱۷ همه حالت‌های ممکن

۱۸

ابتدا همه حالت‌ها را با نظم و ترتیب می‌نویسیم:



حال با شمردن همه حالت‌های ممکن، مشخص می‌شود که به ۶ حالت می‌توان این کار را انجام داد.

۱۹

یک جدول نظام دار رسم می‌کنیم و به ترتیب، همه حالت‌هایی را که حاصل ضرب دو عدد طبیعی ۳۶ می‌شود، در آن درج می‌کنیم:

حالت اول	$1 \times 36 = 36$
حالت دوم	$2 \times 18 = 36$
حالت سوم	$3 \times 12 = 36$
حالت چهارم	$4 \times 9 = 36$
حالت پنجم	$6 \times 6 = 36$

⇒ ۵ حالت



از راهبرد الگو‌سازی (تفکر نظام دار) استفاده می‌کنیم.

۳ عدد $\Rightarrow 777, 555, 333$: هر سه رقم یکسان

رقم ۳	رقم ۵	رقم ۷
۳۴۵	۵۵۳	۷۷۳
۳۵۳	۵۳۵	۷۲۷
۵۳۳	۳۵۵	۳۷۷
۳۳۷	۵۵۷	۷۷۵
۳۷۳	۵۷۵	۷۵۷
۷۳۳	۷۵۵	۵۷۷

⇒ ۱۸ عدد

دورقم یکسان

۲۴

۳۱

ابدا به صورت نظامدار، همهٔ حالت‌هایی را که حاصل جمع دو عدد طبیعی برابر ۱۲ می‌شود، می‌نویسیم. سپس درستون آخر، حالت‌های نامطلوب (یعنی حالت‌هایی که یک عدد سه برابر دیگری نیست) را حذف می‌کنیم:

اولین عدد	دومین عدد	دویمن عدد	یکی سه برابر دیگری
۱	۱۱		✗
۲	۱۰		✗
۳	۹		✓
۴	۸		✗
۵	۷		✗
۶	۶		✗

۳۲

یک جدول نظامدار رسم می‌کنیم و همهٔ حالت‌هایی را که حاصل ضرب سه عدد طبیعی ۶ می‌شود، در آن می‌نویسیم. برای نظم دادن به عملیات، به ترتیب، ابدا فرض می‌کنیم کوچک‌ترین عدد ۱ باشد. سپس فرض می‌کنیم ۲ باشد و

اولین عدد	دومین عدد	دویمن عدد	سومین عدد	حاصل جمع
۱	۱	۶		۶۲ ✗
۱	۲	۳		۳۳ ✗
۱	۳	۲		۲۴ ✗
۱	۴	۱		۲۰ ✗
۱	۵	۱		۱۸ ✗
۱	۶	۱		۱۷ ✓
۲	۲	۱	۵	۱۹ ✗
۲	۳	۱	۵	۱۵ ✗
۲	۵	۱	۶	۱۳ ✗
۳	۴	۱	۵	۱۲ ✗

۳۳

حال با توجه به جدول، مشاهده می‌شود در حالتی که حاصل ضرب سه عدد طبیعی ۶ و حاصل جمع آنها ۱۷ می‌شود، بزرگ‌ترین عدد ۱۰ است.

درس سوم: راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

فصل اول



۲۵

۲۶

در بازی‌هایی مثل «بیست‌سؤالی» برای طرح هر سؤال، هر بار با پرسیدن یک سؤال، بخشی از حالت‌های نامطلوب را حذف می‌کنیم و این کار را ادامه می‌دهیم تا به جواب نهایی برسیم. پس عملأً برای هر سؤال، از راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب استفاده می‌کنیم.

۲۷

الگوسازی (تفکر نظامدار)

۲۸

تسنی، ردگزینه

۲۹

ابدا همهٔ حالت‌هایی را که حاصل ضرب دو عدد ۳۰ می‌شود، می‌نویسیم:

اولین عدد	دومین عدد	حاصل ضرب	حاصل جمع	اولین عدد
۱	۳۰	۳۰	۳۱	✗
۲	۱۵	۳۰	۱۷	✗
۳	۱۰	۳۰	۱۳	✗
۵	۶	۳۰	۱۱	✓

حالت‌های نامطلوب

حالت مطلوب

۳۰

یکی یکی عده‌ها را بررسی می‌کنیم و عده‌های نامطلوب را حذف می‌کنیم:

$$\text{کمی} 1 \Rightarrow 2 \times 8 + 5 = 16 + 5 = 21 \quad \text{x}$$

$$\text{کمی} 2 \Rightarrow 2 \times 7 + 5 = 14 + 5 = 19 \quad \text{x}$$

$$\text{کمی} 3 \Rightarrow 2 \times 6 + 5 = 12 + 5 = 17 \quad \text{✓} \quad (\text{سه تا کمتر از ۲۰ است})$$

$$\text{کمی} 4 \Rightarrow 2 \times 5 + 5 = 10 + 5 = 15 \quad \text{x}$$

بزرگ‌ترین عدد چهار رقمی ۹۹۹۹ است. از این عدد شروع می‌کنیم و یکی یکی پایین می‌آییم. عده‌هایی را که بر هر یک از عده‌های ۲ یا ۳ یا ۵ بخش بدیر باشند حذف می‌کنیم. اولین عددی که باقی می‌ماند، همان حالت مطلوب ما است.

بنابراین در تساوی بالا، به جای نماد \square باید $5,000$ را قرار دهیم:

$$\Rightarrow 2 \times \square = 10 \times 5,000 = 50,000$$

حدس و آزمایش $\square = 25,000$ متر مربع

بنابراین مساحت اولیه کل زمین آفای اسدی که شامل سه تا \square بوده برابر است با:

$$3 \times 25,000 = 75,000$$

آزمون جمع‌بندی فصل

فصل اول



۱

۲

۳

۴

حل مسئله ساده‌تر

۵


حذف حالت‌های نامطلوب

۶


حدس و آزمایش


۷

بررسی گزینه‌ها:

۱ گزینه  $\Rightarrow \frac{1}{16}$ شکل رنگی است.

۲ گزینه  $\Rightarrow \frac{1}{18}$ شکل رنگی است.

۳ گزینه  $\Rightarrow \frac{1}{36}$ شکل رنگی است.

۴ گزینه  $\Rightarrow \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$ شکل رنگی است.

۸۵

حدس و آزمایش

۸۶

از نماد \square برای نشان دادن آن عدد استفاده می‌کنیم. در این صورت با توجه به شرایط مسئله داریم:

$$3 \times \square - 8 = 2 \times 23 - 3 \Rightarrow 3 \times \square - 8 = 43 \quad \text{حدس و آزمایش} \quad \square = 17$$

۸۷

عدد مورد نظر را با نماد \circ نشان می‌دهیم؛ در این صورت:

$$3 \times \circ + 2 < 15 \quad \text{حدس و آزمایش} \quad \circ = 1, 2, 3, 4$$

۸۸

اگر عدد مورد نظر را با \square نشان دهیم، آنگاه:

$$7 \times \square = \square + 9 \quad \text{حدس و آزمایش} \quad \square = 15$$

بنابراین عدد مورد نظر ۱۵ است و ثلث آن برابر است با:

۸۹

اگر آن عدد را با \circ نشان دهیم، آنگاه:

$$\frac{1}{2} \times \circ = \circ - 9 \quad \text{حدس و آزمایش} \quad \circ = 18$$

۹۰

اگر متوسط تعداد صفحات مطالعه شده توسط این فرد در هر ساعت را با نماد

نشان دهیم، آنگاه با توجه به شرایط مسئله داریم: $\square = 155$

حال با حدس و آزمایش مقدار \square را پیدا می‌کنیم:

حدس	آزمایش
$\square = 15$	$7 \times 15 + 15 = 120 \times$
$\square = 18$	$7 \times 18 + 15 = 141 \times$
$\square = 20$	$7 \times 20 + 15 = 155 \checkmark$

۹۱

اگر عدد موردنظر را با نماد \triangle نشان دهیم، آنگاه:

$$5 \times \triangle = 3 \times 14 + 8 = 5 \cdot \triangle = 50 \quad \text{حدس و آزمایش} \quad \triangle = 10$$

پس عدد موردنظر ۱۰ بوده و نصف آن، برابر $5 = 10 \div 2$ است.

۹۲

فرض می‌کنیم مستطیل زیر نشان دهنده زمین آفای اسدی باشد؛ در این صورت:



از طرفی: $50 \times 100 = 5000$ متر مربع = مساحت زمین فوتبال


$$7 \times \boxed{\square} + 10,500 = 17,500 \quad \text{حدس و آزمایش}$$

بنابراین: در نتیجه مسافتی که خودرو در دقیقه دوم و سوم طی می‌کند، برابر است با:

$$(\boxed{\square} + 500) + (\boxed{\square} + 10,000)$$

$$= (10,000 + 500) + (10,000 + 10,000) = 35,000 \text{ متر}$$

از راهبرد رسم شکل به صورت زیر استفاده می‌کنیم:




$$5 \times (1 \times 1) = 5 \text{ متر مربع}$$

مساحت افزوده شده برابر است با:

۱۲

با رسم دو دایره مطابق شکل زیر، از راهبرد «رسم شکل» استفاده می‌کنیم. ۳ نفر در قسمت مشترک دو دایره قرار می‌گیرند. در نتیجه بقیه افراد هر تیم مشخص می‌شوند!



بنابراین ۱۲ نفر فقط عضو تیم فوتبال هستند.

۱۳

باتوجه به شرایط مسئله علی در رتبه سوم و بابک در رتبه آخر قرار دارد.

پس شکل را به صورت مقابل درنظر می‌گیریم:



حالا سه خانه خالی داریم. تنها حالتی که همایون می‌تواند

۳ رتبه بالاتر از رضا قرار بگیرد، حالتی است که همایون اول و رضا چهارم باشد:

بنابراین صدرًا فقط می‌تواند دوم باشد.

۱۴ ۸

از راهبرد حل مسئله ساده‌تر استفاده می‌کنیم:

(۱) در یک شبکه 1×1 ، فقط یک مربع 1×1 وجود دارد.

(۲) در یک شبکه 2×2 ، یک مربع 2×2 و چهار مربع 1×1 وجود دارد.

(۳) در یک شبکه 3×3 ، یک مربع 3×3 ، چهار مربع 2×2 و نه مربع 1×1 وجود دارد.

بنابراین الگوی تعداد کل مربع‌ها در یک شبکه مربعی به صورت زیر است:

شبکه	1×1	2×2	3×3	...
تعداد مربع‌ها	1×1	$(1 \times 1) + (2 \times 2)$	$(1 \times 1) + (2 \times 2) + (3 \times 3)$...

در نتیجه تعداد مربع‌های شبکه $n \times n$ (صفحه شطرنج) برابر است با:

$$(1 \times 1) + (2 \times 2) + (3 \times 3) + (4 \times 4) + (5 \times 5) + (6 \times 6) + (7 \times 7) + (8 \times 8)$$

$$= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 = 204$$

۱۵ ۹

می‌دانیم هر دوچرخه یا سه‌چرخه فقط یک زین دارد. پس تعداد زین‌ها n^2 است:

نتیجه: $3^2 + 4^2 = 73$ تعداد چرخها

پس تعداد کل چرخها باید ۷۳ تا باشد. حال با استفاده از راهبرد حدس و

آزمایش، تعداد دوچرخه‌ها و سه‌چرخه‌ها را می‌یابیم:

حدس	بررسی و آزمایش (تعداد چرخها)	
	دوچرخه	سه‌چرخه
۱۵	۱۵	$(15 \times 2) + (15 + 3) = 30 + 45 = 75$ ✗
۱۶	۱۴	$(16 \times 2) + (14 \times 3) = 32 + 42 = 74$ ✗
۱۷	۱۳	$(17 \times 2) + (13 \times 3) = 34 + 39 = 73$ ✓

پس تعداد دوچرخه‌ها ۱۷ و تعداد سه‌چرخه‌ها ۱۳ تا است و اختلاف تعداد

آنها ۴ تا است.

۱۶ ۱۰

مسافتی را که خودرو در دقیقه اول طی می‌کند با $\boxed{\square}$ نشان می‌دهیم:

دقیقه	اول	دوم	سوم	چهارم
مسافت	$\boxed{\square}$	$\boxed{\square} + 500$	$\boxed{\square} + 1000$	$\boxed{\square} + 1500$
دقیقه	پنجم	ششم	هفتم	هشتم
مسافت	$\boxed{\square} + 2000$	$\boxed{\square} + 2500$	$\boxed{\square} + 3000$	

مسافتی که خودرو در ۷ دقیقه اول طی می‌کند، برابر است با:

$$(\boxed{\square}) + (\boxed{\square} + 500) + (\boxed{\square} + 1000) + (\boxed{\square} + 1500) + (\boxed{\square} + 2000)$$

$$+ (\boxed{\square} + 2500) + (\boxed{\square} + 3000) = 7 \times \boxed{\square} + 10,500$$

زیرمسئله ۱: شکل از چند مریع کوچک یکسان تشکیل شده است؟ با شمارش مریع‌ها، مشخص می‌شود که شکل از ۱۱ مریع یکسان تشکیل شده است.

زیرمسئله ۲: مساحت هر مریع کوچک چقدر است؟

$$= ۹ \times ۱۱ = ۹۹ \text{ مساحت هر مریع کوچک}$$

زیرمسئله ۳: طول ضلع مریعی به مساحت ۹، چقدر است؟

$$= (\text{خودش}) \times (\text{طول ضلع}) = \text{مساحت مریع} \\ \text{حدس آزمایش} \rightarrow \text{طول ضلع} = ۳$$

زیرمسئله ۴: محیط کل شکل، شامل چند پاره خط به طول ۳ است؟ با شمارش، مشخص می‌شود در اطراف شکل، مجموعاً ۲۴ پاره خط به طول ۳ وجود دارد.

زیرمسئله ۵: مجموع طول های ۲۴ پاره خط به طول ۳ (محیط کل شکل) چقدر است؟

تعداد لامپ‌های راه به صورت تقریبی، برابر 8000 عدد در نظر می‌گیریم. در این صورت:

$$\frac{۷}{۱۶} = \text{تعداد لامپ‌های آفتابی} = ۳۵۰$$

$$= ۳۵۰ \times ۱۰,۰۰۰ = \text{قیمت کل لامپ‌های آفتابی} \Rightarrow$$

$$= ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ \text{ میلیون تومان} = ۳۵ \text{ تومان}$$

$$= ۸۰۰,۰ - ۳۵۰ = ۴۵۰ \text{ تعداد لامپ‌های مهتابی}$$

$$= ۴۵,۰ \times ۱۵,۰ = \text{قیمت کل لامپ‌های مهتابی} \Rightarrow$$

$$= ۶۷,۵ \text{ میلیون تومان} = ۶۷,۵ \text{ تومان}$$

$$= ۱۰,۰ \text{ میلیون تومان} = ۱۰ \text{ تومان} = \text{قیمت کل لامپ‌ها} \Rightarrow$$

زیرمسئله ۱: قیمت هر خودکار، معادل قیمت چند روان‌نویس است؟

قیمت ۲۴ خودکار، معادل قیمت ۱۶ روان‌نویس است، پس:

$$\text{قیمت روان‌نویس} \times ۱۶ = \text{قیمت خودکار} = ۲۴ \times$$

$$\frac{\text{قیمت روان‌نویس} \times ۱۶}{۲۴} = \text{قیمت خودکار} \rightarrow$$

$$= \text{قیمت روان‌نویس} \times \frac{۲}{۳} = \text{قیمت خودکار} \Rightarrow$$

زیرمسئله ۲: اگر محسن ۱۹ خودکار بخرد، به اندازه خرید چند خودکار دیگر پول خواهد داشت؟

زیرمسئله ۳: پول خرید ۵ خودکار، معادل پول خرید چند روان‌نویس است؟

$$= \text{قیمت روان‌نویس} \times \frac{۵}{۳} = \text{قیمت خودکار} \times ۵$$

$$= \text{قیمت روان‌نویس} \times \frac{۱}{۳} = \text{قیمت روان‌نویس} \times \frac{۱}{۳}$$

یعنی او با باقی مانده پولش می‌تواند حداقل ۳ روان‌نویس بخرد. (و به اندازه $\frac{۱}{۳}$

قیمت روان‌نویس، پول اضافه می‌آورد که حتی خودکار هم نمی‌شود با آن خرید).

از راهبرد الگوسازی (تفکر نظامدار) استفاده می‌کنیم. با توجه به اینکه مساحت مستطیل 144 است، باید بینیم در چه حالت‌هایی، حاصل ضرب دو عدد طبیعی 144 می‌شود؛ سپس مشخص کنیم در هر حالت به چند متر حصار نیاز داریم:

عرض	طول	حداقل حصار مورد نیاز
۱	۱۴۴	$1 + 144 + 1 = 146$
۲	۷۲	$2 + 72 + 2 = 76$
۳	۴۸	$3 + 48 + 3 = 54$
۴	۳۶	$4 + 36 + 4 = 44$
۶	۲۴	$6 + 24 + 6 = 36$
۸	۱۸	$8 + 18 + 8 = 34$
۹	۱۶	$9 + 16 + 9 = 34$
۱۲	۱۲	$12 + 12 + 12 = 36$

حداقل به 34 متر
حصار نیاز داریم.

توجه کنید که طول حصار، نمی‌تواند صفر یا منفی باشد، پس فقط اعداد صحیح مثبت را بررسی کردیم که همان اعداد طبیعی هستند.

ابتدا حالت‌های نامطلوبی را که به سادگی حذف می‌شوند، حذف می‌کنیم:
سپس اگر عددی باقی ماند، آن را بررسی می‌کنیم.
اولاً حداکثر امتیازات با پنج تیر، می‌تواند $5 = 5 \times 1 = 5$ باشد، پس 52 حذف می‌شود.
ثانیاً حداقل امتیازات (با توجه به اینکه همه تیرها به هدف خوردند) می‌تواند $3 = 5 \times 6 = 30$ باشد، پس 28 نیز حذف می‌شود.

حال تنها سه عدد $42, 47$ و 38 باقی می‌ماند. اما همه عده‌های روی هدف، زوج هستند و مجموع آن‌ها نمی‌تواند فرد شود. پس 47 نیز حذف می‌شود و فقط 38 و 42 ماند. حال باید بینیم آیا می‌توانیم این عده‌ها را به صورت حاصل جمع 5 عدد بنویسیم که هر کدامشان $6, 8, 10$ باشند، یا خیر:

$$38 = \underbrace{10 + 10}_{20} + \underbrace{8 + 8}_{16} + \underbrace{6 + 6}_{12} + 6 \quad \checkmark$$

بنابراین تنها دو عدد 38 و 42 می‌توانند نشان‌دهنده مجموع امتیازات این فرد باشند.

از تفکر نظامدار به این صورت استفاده می‌کنیم که ابتدا فرض می‌کنیم مثلاً مريم

نفر اول باشد:

مهری-مینا-مهسا-مریم

مینا-مهری-مهسا-مریم

مهری-مهسا-مینا-مریم

مهسا-مهری-مینا-مریم

مینا-مهری-مهسا-مریم

مینا-مهسا-مهری-مریم

مهسا-مینا-مهری-مریم

مینا-مهسا-مهرا-مریم

مهرا-مهسا-مینا-مریم

مینا-مهرا-مهسا-مریم

مهرا-مهرا-مهسا-مریم

مهرا-مهرا-مهرا-مریم

مهرا-مهرا-مهرا-مهرا

مهرا-مهرا-مهرا-مهرا

به طور مشابه اگر مینا نفر اول باشد هم 6 حالت داریم. همچنین اگر مهسا یا مهری


نفر اول باشند نیز برای هر کدام 6 حالت داریم. بنابراین:

$4 \times 6 = 24$ تعداد کل حالت‌ها



1

آزمون پایان نوبت دوم



ردیف	آزمون پایان نوبت دوم	خرداد ماه (۱)	مدت زمان: ۹۰ دقیقه	بارم
۱	درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. الف) $k \cdot m$ دو عدد متولی برابر با حاصل ضرب آن دو عدد است. ب) اگر از بالا به یک استوانه نگاه کنیم یک دایره می‌بینیم. پ) حاصل عبارت $16 - 25 \sqrt{2}$ برابر با یک است. ت) $b \cdot m$ دو عدد اول برابر با عدد بزرگتر است.			۱
۲	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. الف) هر عدد طبیعی بزرگ‌تر از یک که فقط دو شمارنده داشته باشد، عدد نامیده می‌شود. ب) حاصل ضرب دو عدد منفی عددی با علامت _____ است. پ) از دوران مستطیل حول طول آن شکل _____ به وجود می‌آید. ت) مکمل زاویه ۱۵ درجه زاویه _____ است.			۲
۳	گزینه درست را مشخص کنید. الف) جمله a^m الگوی ... , ۱, ۳, ۵, ۷, ۹, ... کدام گزینه است? گزینه‌های «۲» و «۳» F $2n-1$ ۳ $2n+1$ ۲ $2n$ ۱ ب) حاصل عبارت $4 - 2 \times 3 + 12 \div 4 - 2$ کدام است? 15 F -5 ۳ 5 ۲ صفر -68 F -67 ۳ -66 ۲ -65 ۱ ت) تعداد رأس‌های یک منشور که تعداد ضلع‌های قاعده آن ۲۰ است، کدام است? 80 F 6 ۳ 40 ۲ 20 ۱			
۴	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) مقدار عبارت $2 - 3x - 2 = x + 8$ را به ازای $x = -4$ به دست آورید. ب) معادله مقابل را حل کنید. پ) از سه برابر عددی دو واحد کم کرده‌ایم حاصل برابر هفت شده است. با تشکیل معادله، آن عدد را به دست آورید.			۱/۵
۵	الف) جاهای خالی را پر کنید. ب) اگر بر روی یک خط سه نقطه قرار دهیم، چند پاره خط ایجاد می‌شود؟	$\overline{AB} < \overline{AC}$ $\overline{AC} < \overline{EF}$	$\overline{AB} = \overline{AC}$ $\overline{AC} < \overline{DE}$	۱/۵
۶	با نوشتن شمارنده‌ها $b \cdot m = ?$ دو عدد مقابل را به دست آورید.			۰/۵

ردیف	آزمون پایان‌نوبت دوم	خرداد ماه (۱)	مدت زمان: ۹۰ دقیقه	بارم
۷	بازوچه به دو شکل زیر، حجم استوانه و مساحت جانبی مکعب مستطیل را به دست آورید. (نوشتن فرمول حجم و مساحت جانبی الزامی است.) ($\pi = 3$)		۲/۵	
۸	حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. الف) $\sqrt{64} = ?$ ب) $\sqrt{\frac{9}{16}} = ?$		۱	
۹	حاصل عبارت‌های زیر را به صورت عدد توان دار بنویسید. $7^3 \times 7^1 \times 9^5 = ?$ $7^8 \div 7^5 = ?$		۱/۵	
۱۰	در دستگاه مختصات مقابله: الف) نقطه A = $\begin{bmatrix} +3 \\ -2 \end{bmatrix}$ را در دستگاه مشخص کنید. ب) این نقطه را با بردار $\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} -6 \\ +4 \end{bmatrix}$ به نقطه B منتقال دهید. پ) مختصات نقطه B را بنویسید.		۲	
۱۱	با توجه به تصویر مقابل، به سوال‌های زیر پاسخ دهید: الف) مختصات چه بنایی $\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ است? ب) مختصات مسجد چیست? پ) مدرسه در نقطه $\begin{bmatrix} -5 \\ 4 \end{bmatrix}$ واقع است. جای آن را در دستگاه مختصات مشخص کنید. ت) پارک در کدام نقطه واقع است؟ (مختصات پارک)		۱/۵	
۱۲	با توجه به چرخنده مقابل، به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) احتمال قرار گرفتن عقره روی A و احتمال قرار گرفتن عقره روی B را به دست آورید. ب) اگر چرخنده را ۱۰۰ بار بچرخانیم انتظار دارید چند بار عقره روی حرف A باشد.		۱/۵	
۱۳	اگر هر نشان دهنده ۱۰۰۰۰ تن گندم باشد، نمودار تصویری مربوط به جدول داده‌های مقابل رارسم کنید.	نام استان	میزان تولید گندم	۱/۵
		فارس	۵۰۰۰۰	
		اصفهان	۴۰۰۰۰	
		یزد	۲۰۰۰۰	
		اردبیل	۲۵۰۰۰	