

مبانی که امروز باست خرید این کتاب می پردازید! در مقابل هزینه‌های که در  
آیند باست خواندن آن پرداخت خواهید کرد. بسیار ناچیز است ...



# [ Geometry ]

10+11+12

این نسل از کتاب‌های ریاضی میکرو که با وسواس خاصی تهیه شده، ترکیبی است از ۳ کتاب با ۳ استراتژی مختلف:

کتاب اول: نکته‌های واجب و ضروری

کتاب دوم: نکته‌های ویژه تسلط و تثبیت و مرور

کتاب سوم: نکته‌های IQ و چالشی ویژه دانش آموزان مدارس برتر

## مقدمه مؤلف



A. Monsef Shokri

به جای نوشتن مقدمه طول و دراز و تشکر از فک و فامیل و ایل و تبار خودمان و دست‌اندرکاران کتاب بهتر است توضیحاتی کوتاه و مهم درباره ساخت و بافت این کتاب ارائه کنم:

### این کتاب دارای سه تیب نکته است

**نکته‌های سبز** این نکته‌ها که با مشخص شده است برای همه دانش‌آموزان واجب و ضروری است.

**نکته‌های زرد** این نکته‌ها که با مشخص شده است ویژه تسلط بر ریزه‌کاری‌ها و نکات فرعی است.

**نکته‌های بنفش** این نکته‌ها که با مشخص شده است ویژه دانش‌آموزان مدارس برتر و همچنین دانش‌آموزانی است که به دنبال نکته‌های چالشی و سطح بالاتر از کنکور سراسری هستند.

### ویژگی‌های خاص این کتاب نسبت به سایر کتاب‌های موجود در بازار

- 1 طراحی و معماری داخلی بسیار زیبا جذاب و مورد پسند دانش‌آموزان و معلمان و مشاوران
- 2 استفاده مناسب و حرفه‌ای از رنگ در ساختار درسنامه که فرآیند یادگیری را بسیار ساده‌تر، جذاب‌تر و سریع‌تر می‌کند.
- 3 تیب بندی بسیاری از مباحث برای سهولت در یادگیری
- 4 تطابق کامل و کامل و نقطه به نقطه با کتاب بانک تست هندسه جامع میکرو [نسل جدید]
- 5 بررسی کامل تمام تمرینات و متن کتاب درسی و همچنین اشکال، نمودارها و کلید واژه‌ها
- 6 بررسی تست‌ها کنکور چند دهه اخیر به خصوص نظام جدید آموزش و استخراج نکات کلیدی مطرح شده در آن‌ها.
- 7 بررسی کامل کتاب راهنمای معلم و استخراج نکات کلیدی آن.
- 8 آموزش راه‌ها و شیوه‌های میان‌بر در حل تست که بسیاری از کتاب‌های کمک‌آموزشی از بیان آن‌ها [به دلایل متعدد] پرهیز می‌کنند.
- 9 *user friendly* بودن کتاب برای دانش‌آموزان با هر سطحی از معلومات.
- 10 کتاب یک ویژگی دیگر هم دارد که ربطی به ۹ ویژگی اول ندارد و در گوشه‌ای از کتاب پنهان است و امکان کشف آن تا قبل از ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ وجود ندارد و حداکثر ۸ نفر ممکن است این راز را کشف کنند، اگر شما یکی از این ۸ نفر هستید در اینستاگرام این ویژگی را در دایرکت برای من بفرستید و ۸ جلد از کتاب‌های **دور دنیا در نیم ساعت** ویژه کنکور ۱۴۰۱ را هدیه بگیرید.

علی منصف شکری - سجاد عظمتی

alimonsef\_shokri

نظرات خود را درباره ویژگی دهم با ما در اینستاگرام در میان بگذارید.





Bertrand Russell  
1872-1970



# M[atrix] m × n CHAPTER 1

Lesson . 1 صفحه ۱۰ (کتاب درسی) ماتریس و اعمال روی ماتریس ها درس اول

## M[atrix] تعریف ماتریس و مفاهیم اولیه آن

هر آرایش مستطیلی از اعداد حقیقی، شامل تعدادی سطر و تعدادی ستون، یک ماتریس نامیده می شود. هر عدد حقیقی واقع در این ماتریس، یک درایه یا عنصر نامیده می شود. ماتریس ها را معمولاً با حروف بزرگ مانند A، B، C و ... نشان می دهند.

ماتریس دارای ۲ سطر و ۳ ستون	ماتریس دارای ۲ سطر و ۲ ستون	ماتریس دارای ۲ سطر و ۳ ستون
$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ <p>ستون سوم A درایه مداریه</p>	$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ <p>سطر دوم B</p>	$C = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ <p>سطر اول C</p>

اگر ماتریسی مانند A دارای m سطر و n ستون باشد، به صورت  $A_{m \times n}$  یا  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  نوشته می شود. A را ماتریسی از مرتبه  $m \times n$  (یا به طور خلاصه m در n) می گویند.

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$  → ماتریس ۲ در ۳ →  $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$  → ماتریس ۲ در ۲ →  $C = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  → ماتریس ۲ در ۳

هر درایه ماتریس را با دو اندیس نشان می دهیم. اندیس اول شماره سطر و اندیس دوم شماره ستون را نشان می دهد. یعنی درایه سطر i ام و ستون j ام است.

درایه سطر اول و ستون سوم:  $a_{13}$   
 درایه سطر اول و ستون دوم:  $a_{12}$   
 درایه سطر اول و ستون اول:  $a_{11}$

### Test تعداد درایه های کدام ماتریس از بقیه بیشتر است؟

- ۱)  $[a_{ij}]_{2 \times 4}$     ۲)  $[a_{ij}]_{2 \times 2}$     ۳)  $[a_{ij}]_{6 \times 2}$     ۴) هر سه گزینه برابر است.

۴) تعداد درایه ها در یک ماتریس  $m \times n$  برابر با  $m \times n$  است، بنابراین همه ماتریس های داده شده در گزینه ها ۱۲ درایه دارند.

## M[atrix] بیان درایه ها بر حسب i و j

در بعضی از ماتریس ها، درایه ها را به طور مستقیم معرفی نمی کنند و آن ها را بر حسب تابعی از اندیس های سمت چپ و سمت راست درایه بیان می کنند. در این موارد ممکن است تابع چندضابطه ای نیز باشد که برای پیدا کردن درایه ها باید به شرط های گفته شده دقت کنید.

در ماتریس  $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$  اگر به ازای هر  $i, j$  که  $i, j$  داشته باشیم  $a_{ij} = 5$  آنگاه مجموع درایه های ماتریس A کدام است؟

$A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}$  → جمع درایه ها = ۲۰

فصل ۱ دوازدهم | ماتریس و کاربرد ها | اعمال روی ماتریس ها

خرید آنلاین در [gajmarket.com](http://gajmarket.com)

در ماتریس  $B = [b_{ij}]_{3 \times 3}$  اگر عناصری هر  $b_{ij}$  که  $i$  و هر  $j$  که  $i < j$  داشته باشیم  $b_{ij} = i + j$  نگاه. مجموع درایه‌های مثلثی  $B$  کدام است؟

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

جمع درایه‌ها = ۲۱

در ماتریس  $C = [c_{ij}]_{3 \times 3}$  اگر  $c_{ij} = \begin{cases} i \times j & ; i \geq j \\ 1 & ; i < j \end{cases}$  نگاه. مجموع درایه‌های مثلثی  $C$  کدام است؟

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 & 1 & 1 \\ 2 \times 1 & 2 \times 2 & 2 \\ 3 \times 1 & 3 \times 2 & 3 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

جمع درایه‌ها = ۱۴

**Test** در ماتریس  $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$  اگر  $a_{ij} = \begin{cases} i^2 - 2j & ; i \neq j \\ i + j & ; i = j \end{cases}$  باشد، مجموع درایه‌های ستون دوم  $A$  کدام است؟

$$\begin{matrix} 2 & 4 & -3 & 1 & -2 \end{matrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+1 & 1^2-2 \times 2 \\ 2^2-2 \times 1 & 2+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{جمع درایه‌های ستون دوم} = -3+4=1$$

## Matrix

معرفی ماتریس مربعی



اگر در ماتریس  $A$ ، تعداد سطرها با تعداد ستون‌ها برابر و مساوی  $n$  باشد،  $A$  را یک **ماتریس مربعی** از مرتبه  $n$  (یا  $n \times n$ ) می‌نامیم.


$i+j = n+1 \Rightarrow$  روی قطر فرعی

$$C = \begin{bmatrix} 9 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 4 \\ 7 & 5 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

$i=j \Rightarrow$  روی قطر اصلی

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0/2 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

اگر  $A = [a_{ij}]_{n \times n}$  یک ماتریس مربعی باشد، نگاه بر اساس رابطه بین  $i$  و  $j$  می‌توان موقعیت درایه را نسبت به قطر اصلی تشخیص داد:



**Test** در ماتریس  $A = [2i + j]_{3 \times 3}$  اگر  $i$  شماره سطر و  $j$  شماره ستون باشد، مجموع درایه‌های زیر قطر اصلی کدام است؟

$$\begin{matrix} 15 & 24 & 12 & 28 & 25 \end{matrix}$$

لازم نیست همه درایه‌های  $A$  را پیدا کنید یافتن درایه‌های زیر قطر اصلی کافیهست (در ضمن  $a_{ij} = 2i + j$ ):

$$A = \begin{bmatrix} \text{red} & \text{green} & \text{blue} \\ a_{21} & \text{orange} & \text{cyan} \\ a_{31} & a_{32} & \text{pink} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{جمع درایه‌های زیر قطر اصلی} = 7+1+1=28$$





ساختن یک ماتریس (زروی زیر ماتریس ها)



گاهی اوقات یک ماتریس از ماتریس های کوچکتر [زیر ماتریس] تشکیل شده است، که چندین بار در کنکور مورد سؤال قرار گرفته است. نمونه ای از این ماتریس ها به صورت زیر است:

$$M_p = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \quad M_p = [A : B] \quad M_p = \begin{bmatrix} a & b & c \\ A & d & e \end{bmatrix} \quad M_p = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

در چنین مواردی یا موارد مشابه آن ها باید درایه های هر زیر ماتریس را مطابق نظمی که در ماتریس اصلی قرار گرفته در آن قرار دهیم، مخصوصاً اگر زیر ماتریس ها بر حسب تابعی از  $x$  و  $y$  داده شوند، ابتدا باید هر زیر ماتریس را تشکیل دهیم و سپس آن را در ماتریس اصلی قرار دهیم.

اگر  $A = [1 \ 2 \ 3]$ ،  $B = \begin{bmatrix} p & 1 & 4 \\ 5 & 0 & y \end{bmatrix}$ ،  $C = \begin{bmatrix} B \\ A \end{bmatrix}$  باشد، ماتریس  $C$  را بنویسید. جمع درایه های قطر اصلی  $C$  کدام است؟

$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & y \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 
 جمع درایه های قطر اصلی  $C = 2 + 0 + 3 = 5$

در مثال فوق اگر ماتریس  $C$  را به صورت  $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & y \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$  نشان دهیم، مجموع درایه های قطر فرعی  $C$  کدام است؟

$D = \begin{bmatrix} 0 & y \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 
 جمع درایه های قطر فرعی  $C = 0 + y + 2 + 3 = y + 5$

اگر  $A = [1 \ 2 \ 3]$ ،  $B = [1 \ 2 \ 3]$  و  $C$  شماره ستون  $B$  و شماره سطر  $A$  باشد، ماتریس  $C = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$  را بنویسید.

$A = [1+1 \ 1+2 \ 1+3]$   $\Rightarrow$   $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

بعضی ها ممکن است ماتریس  $C$  را به صورت  $C = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+1 & 1+2 & 1+3 \\ 2 \times 1 & 2 \times 2 & 2 \times 3 \end{bmatrix}$  تشکیل دهند که کاملاً اشتباه است. اشتباه آن در درایه های سطر دوم است.

**Test** اگر  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ ،  $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ ،  $C = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$  باشد و ماتریس  $C$  را به صورت  $C = \begin{bmatrix} 3 \\ E \end{bmatrix}$  نشان دهیم، مجموع درایه های قطر اصلی  $E$  کدام است؟

$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow E = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$  جمع درایه های قطر اصلی  $E = 3$




انواع ماتریس



اگر در یک ماتریس مربعی درایه های زیر قطر اصلی صفر باشد، ماتریس را **بالا مثلثی** و اگر درایه های بالای قطر اصلی صفر باشد، ماتریس را **پایین مثلثی** می نامند.

$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$  بالا مثلثی  $\Rightarrow$   $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$  پایین مثلثی

مقادیر  $a$  و  $b$  را طوری تعیین کنید که ماتریس  $A = \begin{bmatrix} p & a+1 & a+b \\ a & 3 & b=1 \\ b & a & 4 \end{bmatrix}$  پایین مثلثی باشد.



فصل 1 دوازدهم | ماتریس و کاربرد آن | مسائل روی ماتریس ها

خرید آنلاین در [gajmarket.com](http://gajmarket.com)

باید درایه‌های بالایی قطر اصلی صفر باشد بنابراین  $a+1=0 \Rightarrow a=-1$  و  $b-1=0 \Rightarrow b=1$  بنابراین  $a+b=0$  است.

اگر در یک ماتریس مربعی تمام درایه‌های غیرواقع بر قطر اصلی صفر باشند این ماتریس را **ماتریس قطری** می‌نامند.

درایه‌های قطر اصلی در ماتریس‌های قطری می‌تواند صفر هم باشد.

اگر ماتریس  $A = \begin{bmatrix} a-1 & b+2 \\ a+1 & b-1 \end{bmatrix}$  یک ماتریس قطری باشد مقادیر  $a$  و  $b$  را بدست آورید.

برای این که یک ماتریس قطری باشد درایه‌های خارج از قطر اصلی صفر باشند.

اگر در یک ماتریس مربعی درایه‌های زیر قطر فرعی یا بالایی قطر فرعی صفر باشد ماتریس را **شبه مثلثی** می‌نامند و اگر تمام درایه‌های غیرواقع بر قطر فرعی صفر شود ماتریس را **شبه قطری** می‌نامند.

به ازای کدام مقادیر  $a$  و  $b$  ماتریس  $A = \begin{bmatrix} a-2 & a+1 \\ b+2 & b+1 \end{bmatrix}$  یک ماتریس شبه قطری است؟

باید درایه‌های خارج از قطر فرعی صفر باشد بنابراین  $a-2=0 \Rightarrow a=2$  و  $b+1=0 \Rightarrow b=-1$ .

اگر در یک ماتریس قطری تمام درایه‌های قطر اصلی با هم برابر باشند آن ماتریس را **یک ماتریس اسکالر** می‌نامند.

اگر ماتریس  $A = \begin{bmatrix} a & a-2 \\ 0 & b \end{bmatrix}$  یک ماتریس اسکالر باشد مقادیر  $a$  و  $b$  را بدست آورید.

باید درایه‌های خارج از قطر اصلی صفر باشد و درایه‌های روی قطر اصلی با هم برابر باشند.

اگر در یک ماتریس اسکالر تمام درایه‌های قطر اصلی برابر  $(1)$  باشند آن را **ماتریس واحد** (ماتریس همانی) می‌نامند و با  $I$  نشان می‌دهند.

اگر ماتریس  $A = \begin{bmatrix} a-1 & c+1 \\ d-2 & b-2 \end{bmatrix}$  یک ماتریس واحد باشد مقادیر  $a, b, c, d$  را بدست آورید.

باید درایه‌های خارج از قطر اصلی صفر باشد و درایه‌های روی قطر اصلی برابر  $1$  باشد.

اگر ماتریسی فقط دارای یک سطر باشد آن را **ماتریس سطری** می‌نامند.

مجموع درایه‌های  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  و  $B = [b_{ij}]_{n \times p}$  را  $A \cdot B$  می‌نامند.


اگر ماتریس  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  و  $B = [b_{ij}]_{n \times m}$  باشد مجموع درایه‌های  $A \cdot B$  را پیدا کنید.

باید ماتریس  $A$  دارای یک سطر باشد بنابراین  $A = [a_{1j}]_{1 \times n}$ .

مجموع درایه‌های  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  را  $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}$  می‌نامند.

فصل ۱ دوازدهم | ماتریس و کاربرد آن | اعمال روی ماتریس‌ها





اگر ماتریسی فقط دارای یک ستون باشد، آن را **ماتریس** ستونی می‌نامند. به‌شمار کلیه ماتریس‌هایی که تعداد سطرهاى آن‌ها بیشتر از تعداد ستون‌های آن‌ها باشد **ماتریس قائم نامیده می‌شوند** و ماتریس‌ها ستونی یک پایه را از ماتریس‌های پایه متبوعه می‌شود.

اگر ماتریس  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  و  $B = [b_{ij}]_{m \times n}$  و  $C = [c_{ij}]_{m \times n}$  باشند، آن‌ها را **ماتریس** ستونی می‌نامند. به‌شمار کلیه ماتریس‌هایی که تعداد سطرهاى آن‌ها بیشتر از تعداد ستون‌های آن‌ها باشد **ماتریس قائم نامیده می‌شوند** و ماتریس‌ها ستونی یک پایه را از ماتریس‌های پایه متبوعه می‌شود.

اگر ماتریس  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  و  $B = [b_{ij}]_{m \times n}$  و  $C = [c_{ij}]_{m \times n}$  باشند، آن‌ها را **ماتریس** ستونی می‌نامند. به‌شمار کلیه ماتریس‌هایی که تعداد سطرهاى آن‌ها بیشتر از تعداد ستون‌های آن‌ها باشد **ماتریس قائم نامیده می‌شوند** و ماتریس‌ها ستونی یک پایه را از ماتریس‌های پایه متبوعه می‌شود.

مجموع درایه‌های  $A$  برابر ۱۲ است.  $A = [a_{ij}]_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 3 \times 1 & 5 \\ 2 \times 2 + 3 \times 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 7 & 7 \end{bmatrix}$

ماتریسی که همه درایه‌های آن صفر باشد را **ماتریس صفر** می‌نامند و با  $\vec{0}$  نشان می‌دهند.

اگر ماتریس  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  و  $B = [b_{ij}]_{m \times n}$  و  $C = [c_{ij}]_{m \times n}$  باشند، آن‌ها را **ماتریس** ستونی می‌نامند. به‌شمار کلیه ماتریس‌هایی که تعداد سطرهاى آن‌ها بیشتر از تعداد ستون‌های آن‌ها باشد **ماتریس قائم نامیده می‌شوند** و ماتریس‌ها ستونی یک پایه را از ماتریس‌های پایه متبوعه می‌شود.

اگر ماتریس  $A = \begin{bmatrix} a-1 & b^2-1 \\ b+1 & a^2-1 \end{bmatrix}$  یک ماتریس صفر باشد،  $a+b$  را به دست آورید.

تکامل درایه‌های ماتریس‌ها را بر صفر باشد:

$$\begin{cases} a-1=0 \Rightarrow a=1 \\ a^2-1=0 \\ b+1=0 \Rightarrow b=-1 \\ b^2-1=0 \end{cases} \Rightarrow a+b=0$$

**Test** اگر ماتریس  $A = \begin{bmatrix} a-1 & a-2 \\ b+2 & b-2 \end{bmatrix}$  قطری باشد،  $a+b$  کدام است؟

- ۱) ۱  
۲) ۳  
۳) ۵  
۴) ۲

برای این که  $A$  یک ماتریس قطری باشد، باید تمام درایه‌های خارج از قطر اصلی آن صفر باشند، یعنی:

$$\begin{cases} a-2=0 \Rightarrow a=2 \\ b+2=0 \Rightarrow b=-2 \end{cases} \Rightarrow a+b=-1$$

## Matrix

### ماتریس متقارن و یا متقارن (ویژه استعداد های درخشان)

ماتریس‌هایی به شکل مقابل که درایه‌های طرفین قطری اصلی آن‌ها با هم برابر است را **ماتریس‌های متقارن** می‌نامند. هر چند که نام این ماتریس به طور مستقیم در کتاب درسی نیامده است، اما می‌توان آن‌ها را به صورت  $A = \begin{bmatrix} a & x & y \\ x & b & z \\ y & z & c \end{bmatrix}$  تعریف کرد. بدون این که اشاره مستقیم به نام این ماتریس شود.

ماتریس‌هایی به شکل مقابل که درایه‌های قطری اصلی آن‌ها صفر و درایه‌های طرفین قطری اصلی آن‌ها قرینه است را **ماتریس‌های متقارن** می‌نامند. هر چند که نام این ماتریس به طور مستقیم در کتاب درسی نیامده است، اما می‌توان آن‌ها را به صورت  $A = \begin{bmatrix} 0 & -x & y \\ x & 0 & z \\ -y & z & 0 \end{bmatrix}$  تعریف کرد. بدون این که اشاره مستقیم به نام این ماتریس شود.

**Test** در ماتریس  $A = \begin{bmatrix} 2 & x-1 \\ 5 & 3+x \end{bmatrix}$  اگر  $i$  شماره سطر و  $j$  شماره ستون باشد و به ازای هر  $1 \leq i, j \leq 2$  رابطه  $a_{ji} = a_{ij}$  برقرار باشد،  $x$  کدام است؟

- ۱) ۶  
۲) ۴  
۳) -۶  
۴) -۴

$$a_{12} = a_{21} \Rightarrow x-1=5 \Rightarrow x=6$$

برای این که  $a_{ij} = a_{ji}$  درایه‌های طرفین قطری اصلی هستند، بنابراین باید:


# Matrix

## تساوی دو ماتریس



دو ماتریس هم مرتبه  $A = [a_{ij}]_{m \times n}$  و  $B = [b_{ij}]_{m \times n}$  را **تساوی** می‌گوییم، هرگاه درایه‌های آن‌ها نظیر به نظیر با هم برابر باشد. یعنی داشته باشیم:

$$\forall i, j, a_{ij} = b_{ij} \Leftrightarrow [a_{ij}] = [b_{ij}]$$



اگر دو ماتریس  $A = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$  و  $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  برابر باشند، آنگاه داریم:  $x=1, y=2, z=3, t=4$

**Test** اگر دو ماتریس  $A = [i + m | j]$  و  $B = \begin{bmatrix} m+1 & 2 \\ 3 & x \end{bmatrix}$  برابر باشند،  $m+x$  کدام است؟

ابتدا ماتریس  $A$  را با درایه‌ها مشخص می‌کنیم، سپس درایه‌های نظیر در دو ماتریس را برابر قرار می‌دهیم:

$$\begin{bmatrix} 1+m & 1+2m \\ 2+m & 2+2m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m+1 & 2 \\ 3 & x \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 1+2m=2 \Rightarrow m=1 \\ 2+2m=x \Rightarrow x=4 \end{cases} \Rightarrow m+x=5$$

# Matrix

## جمع و تفریق دو ماتریس



برای محاسبه **جمع** یا **تفریق** دو ماتریس، کافی است درایه‌های نظیر دو ماتریس را با هم جمع یا تفریق کنیم:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, B = [b_{ij}]_{m \times n} \Rightarrow A \pm B = [a_{ij} \pm b_{ij}]_{m \times n}$$

فقط دو ماتریس هم مرتبه را می‌توان با هم جمع یا از هم تفریق کرد.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow A+B = \begin{bmatrix} 2+4 & 1+2 \\ 3+6 & 5+7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

**Test** اگر  $A = [i+j]_{2 \times 2}$  و  $B = [2i-j]_{2 \times 2}$  باشد، در ماتریس  $A+B$  مجموع درایه‌های سطر اول کدام است؟

$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow A+B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$   $\Rightarrow$  جمع درایه‌های سطر اول = 5

راه کوتاه‌تر این است که به جای تشکیل  $A$  و  $B$  ماتریس  $A+B = [(i+j) + (2i-j)] = [3i] = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 6 \end{bmatrix}$  را تشکیل دهیم.

# Matrix

## ضرب عدد در ماتریس



برای ضرب یک عدد در یک ماتریس، کافیست آن عدد را در تمام درایه‌های آن ماتریس ضرب کنیم:


$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, r \in \mathbb{R} \Rightarrow rA = [ra_{ij}]_{m \times n}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow 2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 4 & 10 \end{bmatrix}$$

در حالت خاصی که عدد  $-1$  را در ماتریس  $A$  ضرب کنیم، ماتریس  $-A$  به دست می‌آید که آن را **قرینه** ماتریس  $A$  می‌نامند و همواره داریم:

$$A + (-A) = \vec{0}$$





**Test** اگر  $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$  و  $B = [b_{ij}]_{r \times r}$  به طوری که  $b_{ij} = i^2 + j^2$  حاصل  $2A - B + I$  کدام است؟

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -7 \end{bmatrix}$  (۱)      $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$  (۲)      $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$  (۳)      $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$  (۴)

**۱** ابتدا ماتریس B را با درایه ها مشخص می کنیم:

$$B = \begin{bmatrix} 1^2+1^2 & 1^2+2^2 \\ 2^2+1^2 & 2^2+2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow 2A - B + I = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$$

## Matrix

اعمال روی ماتریس ها



اگر  $A, B, C$  ماتریس هایی  $m \times n$  (هم مرتبه) و  $r$  و  $s$  اعداد حقیقی باشند، آنگاه خواص زیر همواره برقرار است:

ماتریس صفر عضو بی اثر جمع در ماتریس ها است.	جمع ماتریس ها شرکت پذیر است.	جمع ماتریس ها خاصیت جابه جایی دارد.
$A + \vec{0} = \vec{0} + A = A$	$A + (B + C) = (A + B) + C$	$A + B = B + A$
توزیع پذیری ماتریس روی جمع اعداد	توزیع پذیری عدد روی جمع ماتریس ها	وجود عضو قرینه
$(r + s)A = rA + sA$	$r(A + B) = rA + rB$	$A + (-A) = (-A) + A = \vec{0}$
قابلیت ضرب عدد در طرفین تساوی ماتریسی	قابلیت حذف عدد غیر صفر از طرفین تساوی	جابه جایی عدد و ماتریس
$A = B \Rightarrow rA = rB$	$rA = rB \xrightarrow{r \neq 0} A = B$	$(r)(A) = (A)(r)$

**Test** اگر  $A, B, C$  سه ماتریس هم مرتبه باشند، کدام درست است؟

$A + (B + C) = (A + B) + C$  (۱)      $A - (B - C) = (A - B) - C$  (۲)

$A + (B - C) = (A - B) + C$  (۳)      $A - (B + C) = (A - B) + C$  (۴)

**۲** تنها گزینه **۱** درست است که معرف خاصیت شرکت پذیری جمع در ماتریس هاست. [تفاضل ماتریس ها شرکت پذیر نیست]

## Matrix

ضرب ماتریس سطری در ماتریس ستونی



اگر  $A = [a_{ij}]_{r \times m}$  یک ماتریس سطری و  $B = [b_{ij}]_{m \times n}$  یک ماتریس ستونی به صورت های زیر باشند، آنگاه ضرب دو ماتریس A و B یعنی  $A \times B$  یک عدد حقیقی است که به صورت زیر به دست می آید:

$$AB = [a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1m}] \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{bmatrix} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1m}b_{m1}$$

اگر  $A = [2 \ \dots \ 4 \ \dots \ 5]$  و  $B = [7 \ \dots \ 5]$  باشد، آنگاه  $AB = [2 \ \dots \ 4 \ \dots \ 5] \begin{bmatrix} 7 \\ \vdots \\ 5 \end{bmatrix} = (2 \times 7) + (4 \times 5) + (5 \times 5) = 14 + 20 + 25 = 59$

Euclid  
Mid-4 century BC



# Conic sections

## CHAPTER 2



Lesson . 1

صفحه ۳۹ تا ۴۳ کتاب درسی

آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی


درس اول



مقاطع مخروطی



دو خط  $d$  و  $\Delta$  را که در نقطه  $A$  مانند شکل، متقاطع (غیر عمود) هستند، در نظر می‌گیریم. اگر خط  $\Delta$  ثابت باشد و خط  $d$  را حول خط  $\Delta$  دوران دهیم، سطح حاصل از دوران را **رویه مخروطی** (سطح مخروطی) می‌نامیم. در این حالت خط  $\Delta$  را **محور**، خط  $d$  را **مولد** و نقطه  $A$  را **رأس** سطح مخروطی می‌نامیم. فصل مشترک یک صفحه و سطح مخروطی، **مقطع مخروطی** نامیده می‌شود و انواع مختلفی دارد که عبارتند از **دایره**، **بیضی**، **سه‌می** و **هذلولی**. که البته در حالت‌های خاص ممکن است **نقطه**، **یک خط** یا **دو خط متقاطع** باشند. نوع مقطع ایجاد شده بستگی به وضعیت صفحه نسبت به دو خط  $d$  و  $\Delta$  دارد که در جدول زیر این حالات بررسی شده است.



فصل ۲ دوازدهم | مقاطع مخروطی | آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی

دایره	بیضی	سه‌می	هذلولی
صفحه $P$ بر محور سطح مخروطی عمود است و از رأس آن عبور نمی‌کند.	صفحه $P$ بر محور $\Delta$ عمود نبوده و غیر موازی با مولد $d$ است.	صفحه $P$ با مولد $d$ موازی است و از رأس مخروط عبور نمی‌کند.	صفحه $P$ از رأس مخروط عبور نمی‌کند و هر دو نیمه سطح مخروطی را قطع می‌کند.
حالات خاص			
در این حالت اگر صفحه $P$ از رأس سطح مخروطی عبور کند، فصل مشترک فقط <b>رأس</b> خواهد بود.	در این حالت اگر صفحه $P$ از رأس سطح مخروطی عبور کند، فصل مشترک فقط <b>نقطه رأس</b> خواهد بود.	در این حالت اگر صفحه $P$ از رأس سطح مخروطی عبور کند، فصل مشترک فقط <b>یک خط</b> خواهد بود.	در این حالت اگر صفحه $P$ از رأس سطح مخروطی عبور کرده و هر دو نیمه سطح مخروطی را قطع کند، فصل مشترک <b>دو خط</b> متقاطع خواهد بود.

اگر دو صفحه موازی، یک رویه مخروطی را قطع کنند، سطح مقطع ایجاد شده به غیر از دایره، بیضی، دو سه‌می، دو هذلولی، می‌تواند **سه‌می** و **خط** یا دایره و نقطه یا بیضی و نقطه یا هذلولی و دو خط متقاطع نیز باشد.

**Test** مقطع یک سطح مخروطی با یک صفحه، یک سه‌می است. این صفحه با مولد یا محور سطح مخروطی کدام وضع را دارد؟

(۱) موازی یک مولد (۲) موازی محور (۳) عمود بر یک مولد (۴) گذرا از نقطه تلاقی محور و مولد

**I** اگر صفحه موازی با مولد مخروط، رویه مخروطی را قطع کند، سه‌می به وجود می‌آید.



خرید آفلاین در [gajmarket.com](http://gajmarket.com)





هرگاه دو خط  $d_1$  و  $d_2$  موازی باشند و فاصله آن‌ها برابر  $r$  باشد، از دوران  $d_1$  حول  $d_2$  سطحی ایجاد می‌شود که آن را یک سطح استوانه‌ای می‌نامیم. حال اگر یک صفحه مانند  $P$  سطح استوانه‌ای را قطع کند، سطح مقطع پدید آمده مقطع استوانه‌ای نامیده می‌شود که به یکی از چهار حالت زیر است:

یک خط	دو خط موازی	بیضی	دایره
صفحه $P$ موازی $d_1$ و به فاصله $r$ از $d_2$	صفحه $P$ موازی $d_1$ و به فاصله کمتر از $r$ از $d_2$	صفحه $P$ غیر عمود و غیر موازی با $d_1$	صفحه $P$ عمود بر $d_1$

اگر یک کره به مرکز  $O$  و شعاع  $P$  داشته باشیم، سطح مقطع صفحه  $P$  با سطح این کره همواره و در تمام حالات یک دایره است. اگر از تقاطع صفحه  $P$  و یک سطح استوانه‌ای یک بیضی ایجاد شده باشد وضعیت صفحه نسبت به محور سطح استوانه‌ای چیست؟ صفحه باید غیر موازی با محور سطح استوانه‌ای و همچنین غیر عمود بر آن باشد، چون در صورت عمود شدن سطح مقطع به صورت دایره‌ای خواهد بود و در صورت موازی شدن با محور سطح استوانه‌ای به صورت دو خط موازی یا یک خط خواهد بود.

**Test** اگر  $d_1$  و  $d_2$  دو خط موازی باشند، از دوران خط  $d_1$  حول خط  $d_2$  یک سطح ایجاد می‌شود. از برخورد صفحه  $P$  با این سطح یک بیضی حاصل شده است وضعیت صفحه  $P$  نسبت به خطوط  $d_1$  و  $d_2$  کدام است؟

۱) موازی  $d_1$       ۲) عمود بر  $d_2$       ۳) غیر موازی  $d_1$       ۴) غیر موازی با  $d_1$  و غیر عمود بر  $d_2$

**F** صفحه  $P$  با هر دو خط  $d_1$  و  $d_2$  غیر موازی و غیر عمود است بنابراین می‌توان گفت غیر موازی با  $d_1$  و غیر عمود بر  $d_2$  است دقت کنید که گزینه ۳ گزینه کاملی نیست چون غیر موازی بودن کافی نیست و حتماً باید صفحه غیر عمود بر  $d_1$  و  $d_2$  نیز باشد.



بسیاری از اشکالی که رسم می‌کنیم مجموعه نقاطی هستند که ویژگی مشترکی دارند، این مجموعه نقاط را مکان هندسی می‌نامیم. گاهی به آن مکان نقطه نیز گفته می‌شود. از طرفی مهم‌ترین اشکال هندسی نقطه، خط و صفحه هستند بنابراین مکان هندسی نقاطی از صفحه که از یک نقطه و یک خط به فاصله ثابتی هستند اهمیت ویژه‌ای دارند.

	۱) مکان هندسی نقاطی از صفحه که به فاصله $k$ واحد از نقطه $A$ قرار دارند، دایره‌ای به مرکز $A$ و به شعاع $k$ است.
	۲) مکان هندسی نقاطی از صفحه که به فاصله $k$ واحد از خط $d$ قرار دارند، دو خط به موازات خط $d$ و به فاصله $k$ واحد از آن هستند.



**Test** همه نقاطی از صفحه که فاصله آن‌ها از نقطه ثابت O در این صفحه بیشتر از ۲ و کمتر از ۳ واحداست، تشکیل یک شکل هندسی می‌دهند.

مساحت این شکل چقدر است؟

- ۱)  $5\pi$       ۲)  $9\pi$       ۳)  $4\pi$       ۴)  $7\pi$



**۱** نقاطی که فاصله آن‌ها از O، بیشتر از ۲ واحد باشد بیرون دایره‌ای به مرکز O و شعاع ۲ واحد هستند، همچنین نقاطی که فاصله آن‌ها از O کمتر از ۳ واحد باشد، داخل دایره‌ای به مرکز O و شعاع ۳ واحد قرار می‌گیرند. پس شکل هندسی مورد نظر ناحیه بین دو دایره (قسمت رنگی) است و مساحت آن برابر است با:

$$\text{مساحت ناحیه رنگی} = \text{مساحت دایره کوچک} - \text{مساحت دایره بزرگ} = \pi(3)^2 - \pi(2)^2 = 9\pi - 4\pi = 5\pi$$




**اشتراک یک مکان هندسی و یک شکل هندسی**

در برخی از سوالات هندسه از ما می‌پرسند چند نقطه روی یک شکل وجود دارد که دارای ویژگی به خصوصی باشد. در این موارد ابتدا مکان هندسی نقاطی که آن ویژگی به خصوص دارند را پیدا می‌کنیم و سپس به بررسی تعداد نقاط تقاطع آن مکان هندسی و شکل گفته شده می‌پردازیم.

- ۱. نقطه A به فاصله ۴ واحد از خط l واقع است... چند نقطه روی خط l به فاصله ۷ واحد از نقطه A وجود دارد؟
- ۲. نقاطی که به فاصله ۷ واحد از نقطه A قرار دارند روی دایره‌ای به مرکز A و به شعاع ۷ قرار دارند و چون A در خط l است، پس این دایره l به عنوان یک مکان هندسی l را در ۲ نقطه قطع می‌کند و همین نقاط جواب‌های مورد نظر هستند.

**Test** در مربع ABCD به ضلع  $2\sqrt{2}$  چند نقطه روی محیط مربع وجود دارد که فاصله آن‌ها از قطر AC برابر ۱/۵ واحد باشد؟

- ۱) هیچ      ۲) ۲      ۳) ۴      ۴) بیشمار



**۳** نقاطی که به فاصله ۱/۵ واحد از قطر AC قرار دارند، روی دو خط به موازات AC و به فاصله ۱/۵ واحد از آن واقع اند. حال باید بررسی کنیم که آیا این دو خط نقطه تقاطعی با اضلاع مربع دارند یا نه؟ این نقاط در صورت وجود جواب‌های تست هستند:

$$\Rightarrow a = 2\sqrt{2} \Rightarrow BD = a\sqrt{2} = \sqrt{2} \times (2\sqrt{2}) = 4 \Rightarrow OB = OD = 2$$

چون  $OD < 1/5$ ، پس این دو خط، اضلاع مربع را در ۴ نقطه قطع می‌کنند.



**مکان‌های هم فاصله از دو چیز**

یکی از مهم‌ترین مکان‌های هندسی در صفحه، مکان هندسی نقاط هم فاصله از دو چیز است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

	<p><b>۱</b> مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو نقطه A و B به یک فاصله هستند، عمود منصف پاره خط AB است.</p>
	<p><b>۲</b> مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو خط موازی <math>d_1</math> و <math>d_2</math> به یک فاصله هستند، خطی موازی آن دو خط و بین آن‌هاست.</p>
	<p><b>۳</b> مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو خط متقاطع <math>d_1</math> و <math>d_2</math> به یک فاصله هستند، نیمسازهای آن دو خط متقاطع است [این نیمسازها همواره برهم عمودند].</p>


مکان هندسی نقاطی از صفحه که از نقطه A و خط l به یک فاصله هستند، یک سهمی است که نقطه A کانون آن و خط l هدای آن است. در ادامه فصل در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.





**Test** چند نقطه روی قطرهای دوزنقه ABCD وجود دارد که فاصله آن از دو قاعده یکسان باشد؟

- (۱) نامشخص (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) بیشتر




**۲** نقطه‌ای که به فاصله یکسان از دو قاعده دوزنقه قرار دارند، روی خطی موازی دو قاعده هستند که فاصله آن از هر کدام از قاعده‌ها نصف ارتفاع دوزنقه است. این خط قطعاً قطرهای دوزنقه را در دو نقطه P و Q قطع می‌کند. (این خط را خط میانه دوزنقه می‌نامند).

**Conic sections**

اشتراک دو مکان هندسی


در بعضی سؤال‌ها از ما می‌پرسند «چند نقطه وجود دارد که هم این ویژگی را داشته باشد و هم آن ویژگی را» در این موارد ابتدا مکان هندسی نقطه‌ای که این ویژگی و نیز مکان هندسی نقطه‌ای که آن ویژگی را دارند پیدا می‌کنیم، سپس به بررسی تعداد نقاط اشتراک (تقاطع) این دو مکان هندسی می‌پردازیم. ...  
 ۱. نقطه A به فاصله ۴ واحد از خط l واقع است. چند نقطه در صفحه وجود دارد که به فاصله ۳ واحد از نقطه A و به فاصله ۲ واحد از خط l باشد؟  
 ۲. نقطه‌ای که به فاصله ۲ واحد از نقطه A قرار دارند، روی دایره‌ای به شعاع ۳ و به مرکز A واقع اند (این ویژگی را هم چنین نقطه‌ای که به فاصله ۲ واحد از خط l قرار دارند، روی خط به موازات l و به فاصله ۲ واحد از آن قرار دارند) (این ویژگی را ... حاله یابد ...  
 تعداد نقاط اشتراک این دو مکان هندسی را بررسی کنیم. همین طور که در شکل مشخص است این دو مکان هندسی همدیگر را در ۲ نقطه قطع می‌کنند، بنابراین ۲ نقطه یا شرایط گفته شده وجود دارد.



**Test** نقاط A, B, C در صفحه مفروض اند. چند نقطه وجود دارد که از A و B یک فاصله و از C به فاصله ۳ سانتی متر باشد؟

- (۱) حداکثر یک نقطه (۲) حداکثر ۲ نقطه  
 (۳) دقیقاً ۲ نقطه (۴) هیچ نقطه‌ای وجود ندارد.

**۲** مکان هندسی نقطه‌ای که از A و B به یک فاصله اند، عمود منصف AB است. مکان هندسی نقطه‌ای که از C به فاصله ۳ سانتی متر هستند، دایره‌ای به مرکز C و به شعاع ۳ است. نقاط تلاقی عمود منصف AB با این دایره، جواب این مسئله است. با توجه به شکل‌های مقابل مسئله دو جواب یا یک جواب یا بدون جواب است. پس حداکثر ۲ نقطه وجود دارد. (عمود منصف پاره خط AB است.)



**Conic sections**

اشتراک دو مکان هندسی مشهور

یکی از مشهورترین حالتی که مربوط به تقاطع دو مکان هندسی است، حالتی است که پرسیده می‌شود «چند نقطه در صفحه وجود دارد ... که به فاصله ۲ از نقطه A و به فاصله ۳ از نقطه B باشد». در این حالت باید وضعیت دایره به مرکز A و به شعاع ۲ و دایره به مرکز B و به شعاع ۳ را بررسی کنیم. که سه حالت عمده رخ می‌دهد:

<p>۱) اگر این دو دایره متقاطع باشند، دو نقطه با شرایط فوق وجود دارد. (نقاط <math>M_1</math> و <math>M_2</math>)</p>	<p>۲) اگر این دو دایره مماس باشند، فقط یک نقطه یا شرایط فوق وجود دارد. (نقطه <math>M_1</math>)</p>	<p>۳) اگر این دو دایره همدیگر را قطع نکنند، هیچ نقطه‌ای با شرایط فوق وجود ندارد.</p>

**Test** اگر برای تبدیل دو خط  $d$  و  $d'$  به یکدیگر، دقیقاً دو خط بازتاب وجود داشته باشد وضعیت  $d$  و  $d'$  نسبت به هم کدام است؟

- ۱) موازی  
 ۲) عمود  
 ۳) متقاطع  
 ۴) چنین چیزی امکان پذیر نیست.

**۳** اگر دو خط متقاطع باشند، هر کدام از نیمسازهای زاویه های بین آن ها می تواند خط بازتاب باشد؛ پس دو محور بازتاب مختلف برای تبدیل آن ها وجود دارد.



مقایسه تبدیل ها



در جدول زیر، تمام ویژگی های مربوط به تبدیل های چهارگانه، برای مقایسه بهتر آمده است:

تبدیل	ویژگی ها	اندازه پاره خط	شیب خط	جهت شکل	اندازه زاویه	شکل و تصویر	نقطه ثابت
بازتاب		ثابت می ماند	ممکن است تغییر کند	تغییر می کند	ثابت می ماند	همنهشت اند	تمام نقاط خط بازتاب
انتقال		ثابت می ماند	ثابت می ماند	ثابت می ماند	ثابت می ماند	همنهشت اند	ندارد
دوران $18^\circ$		ثابت می ماند	ثابت می ماند	ثابت می ماند	ثابت می ماند	همنهشت اند	مرکز دوران
دوران $0^\circ < \theta < 18^\circ$		ثابت می ماند	تغییر می کند	ثابت می ماند	ثابت می ماند	همنهشت اند	مرکز دوران
تجانس		$k$ برابر می شود	ثابت می ماند	ثابت می ماند	ثابت می ماند	متشابه اند	مرکز تجانس

**Test** کدام ویژگی در تجانس و انتقال وجود دارد ولی در دوران و بازتاب لزوماً وجود ندارد؟

- ۱) شیب خط ثابت می ماند.  
 ۲) جهت شکل حفظ می شود.  
 ۳) اندازه زاویه حفظ می شود.  
 ۴) اندازه پاره خط ثابت می ماند.  
**1** در تجانس و انتقال شیب خط ثابت می ماند ولی در دوران و بازتاب، شیب خط لزوماً حفظ نمی شود.

Lesson . 2

فصل ۵۷ تا ۶۰ کتاب یازدهم

کاربرد تبدیل ها


درس دوم



مسئله هرون (تیپ اول)




دو نقطه  $A$  و  $B$  در یک طرف خط  $d$  مفروض اند، اگر نقطه  $M$  روی خط  $d$  بلغزد برای پیدا کردن کمترین طول خط شکسته  $AMB$ ، کافیست بازتاب نقطه  $A$  نسبت به خط  $d$ ، یعنی  $A'$  را پیدا کنیم و از  $A'$  به  $B$  وصل کنیم تا خط  $d$  را در  $M$  قطع کند. در این صورت:



این مسئله، به مسئله هرون مشهور است. در این تمییز، مسأله از مسأله ای که طول پاره خط های  $AM$  یا  $BM$  را بخواهیم، باید از تشابه دو مثلث  $AHM$  و  $BMH'$  استفاده کنیم.




در این حالت خط  $d$  نیمساز خارجی رأس  $M$  از مثلث  $AMB$  است و در ضمن زاویه های ساخته شده در طرفین نقطه  $M$  نیز باهم برابرند.





فصل ۲ یازدهم | تبدیل های هندسی و کاربرد ها | کاربرد تبدیل ها

خرید آنلاین در galmarket.com





**Test** نقاط  $A(2, 1)$  و  $B(5, 3)$  مفروض اند، نقطه  $M$  روی محور  $x$  ها می‌گذرد، کمترین اندازه خط شکسته  $AMB$  کدام است؟



کافیست بازتاب نقطه  $A$  نسبت به محور  $x$  ها یعنی  $A'$  را پیدا کنیم و اندازه  $A'B$  را به دست آوریم:

$$|A'B| = \sqrt{(5-2)^2 + (3-(-1))^2} = 10$$

- ۱۱ (۱)
- ۱۲ (۲)
- ۸ (۳)
- ۱۰ (۴)

**بازتاب یک نقطه نسبت به چهار خط مشهور صفحه**

1 تصویر نقطه  $A(a, b)$  تحت بازتاب نسبت به محور  $x$  ها نقطه  $A'(a, -b)$  است.

2 تصویر نقطه  $A(a, b)$  تحت بازتاب نسبت به محور  $y$  ها نقطه  $A'(-a, b)$  است.

3 تصویر نقطه  $A(a, b)$  تحت بازتاب نسبت به خط  $y=x$  [بیمسار ربع اول و سوم] نقطه  $A'(b, a)$  است.

4 تصویر نقطه  $A(a, b)$  تحت بازتاب نسبت به خط  $y=-x$  [بیمسار ربع دوم و چهارم] نقطه  $A'(-b, -a)$  است.



**G** کاربرد مسئله هرون [تیب دوم]


دو خط متقاطع  $d_1$  و  $d_2$  و نقاط ثابت  $A$  و  $B$  مطابق شکل مفروض اند، اگر نقطه  $M$  روی خط  $d_1$  و نقطه  $N$  روی خط  $d_2$  بلغزد، برای پیدا کردن کمترین طول خط شکسته  $AMNB$  کافیست قرینه  $A$  را نسبت به  $d_1$  پیدا کرده و  $A_1$  بنامیم، حال اگر قرینه  $A_1$  را نسبت به خط  $d_2$  پیدا کرده و  $A_2$  بنامیم، برابر با کمترین طول خط شکسته  $AMNB$  است.

$$\text{Min}(AMNB) = |A_2B|$$

**STOP** یک راه دیگر برای حل این مسئله این است که بازتاب  $A$  نسبت به  $d_1$  و بازتاب  $B$  نسبت به  $d_2$  یعنی نقاط  $A'$  و  $B'$  را پیدا کرده و از  $A'$  به  $B'$  وصل کنیم تا این دو خط را در  $M$  و  $N$  قطع کنند. در این صورت خط شکسته  $AMNB$  کوتاهترین طول را دارد و اندازه آن با  $|A'B'|$  برابر است.

در هر یک از دو روش فوق وقتی  $AMNB$  کوتاهترین طول را دارد زاویه‌های طریقین  $M$  و زاویه‌های طریقین  $N$  باید با هم برابر باشد و برعکس [هرگاه این زاویه‌ها با هم برابر باشد این کوتاهترین طول است. در ضمن در این حالت زاویه دو خط  $d_1$  و  $d_2$  برابر با میانگین زوایای داخلی خط شکسته  $AMNB$  است یعنی  $\frac{y+z}{x}$ .

قضیه فوق را برای بیش از دو خط  $d_1$  و  $d_2$  نیز می‌توان تعمیم داد.



**Test** نقاط  $A(11, 3)$  و  $B(9, 1)$  در صفحه محورهای مختصات مفروض اند، دو نقطه  $M$  و  $N$  همواره روی دو محور می‌گذرد.


(داخل - ۹۸)

کمترین اندازه خط شکسته  $AMNB$  کدام است؟

- ۱۹ (۲)
- ۱۸ (۱)
- ۲۰ (۳)
- ۲۱ (۴)

فصل ۲ یازدهم | تبدیل‌های هندسی و کاربردها | کاربرد تبدیل‌ها

خرید آنلاین در [gajmarket.com](http://gajmarket.com)



۳ اگر نقطه A را نسبت به محور y و نقطه B را نسبت به محور x قرینه کنیم و نقاط A' و B' را به هم وصل کنیم تا محور xها و yها را در N و M قطع کند، در این صورت خط شکسته AMNB کمترین اندازه را خواهد داشت چون برابر A'B' است.


$$\text{Min } |AMNB| = |A'B'| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

## Geometric


کاربرد مسئله هرون (نیم سوم)



نقاط A و B در یک طرف خط d مفروض اند، نقاط M و N روی خط d به فاصله L از هم قرار دارند، برای پیدا کردن کوتاهترین طول خط شکسته AMNB به صورت زیر عمل می کنیم:



۱ بازتاب نقطه A نسبت به خط d یعنی A' را پیدا می کنیم.




۲ نقطه B را به اندازه بردار MA به سمت A انتقال می دهیم تا نقطه B' به دست آید.



۳ از A' به B' وصل می کنیم تا خط d را در M قطع کند با معلوم شدن M به اندازه L به سمت راست می رویم و به نقطه N می رسم در این صورت حداقل طول خط شکسته AMNB برابر است با:

$$\text{Min}(AMNB) = |A'B'| + L$$




در این حالت زاویه M و زاویه N پایید با هم برابر باشند.

**Test** در شکل زیر قرار است جاده ای از A به B احداث شود به طوری که ۴ کیلومتر از این جاده باید در کنار ساحل باشد. برای پیدا کردن موقعیت محدوده جاده ساحلی به طوری که کل جاده کوتاهترین طول ممکن را داشته باشد، کدام



- ۱ بازتاب و دوران
- ۲ بازتاب و انتقال
- ۳ انتقال و تجانس
- ۴ دوران و تجانس

۲ باید نقطه B را به اندازه ۴ واحد به سمت A انتقال دهیم همچنین بازتاب A نسبت به خط ساحلی را پیدا کرده و از A' به B' وصل کنیم تا نقطه M به دست آید اگر به اندازه ۴ واحد از M به سمت راست حرکت کنیم به N می رسم و از N به B وصل می کنیم، مسیر AMNB کوتاهترین مسیر است.




## Geometric

کاربرد مسئله هرون (نیم چهارم)




دو خط d<sub>1</sub> و d<sub>2</sub> به فاصله L از هم قرار دارند، اگر نقاط A و B در طرفین d<sub>1</sub> و d<sub>2</sub> قرار گرفته باشند و پاره خط MN عمود بر هر دو خط d<sub>1</sub> و d<sub>2</sub> باشد برای پیدا کردن کوتاهترین طول خط شکسته AMNB کافیست B را به اندازه بردار MA به موازات بردار MA انتقال دهیم و از A' به B' وصل کنیم تا خط d<sub>1</sub> را در M قطع کند، حال اگر M عمودی بر d<sub>2</sub> رسم کنیم تا آن را در N قطع کند در این صورت AMNB کوتاهترین مسیر ممکن است و اندازه آن برابر است با:



$$\text{Min}(AMNB) = |A'B'| + L$$



Pythagoras  
570-495 bc



# Relations Logitudinal

## CHAPTER 3

Lesson . 1

صفحه ۶۲ تا ۶۵ کتاب یازدهم

قصیه سینوس ها

درس اول



### Logitudinal Relations

روابط طولی در مثلث قائم الزاویه


منظور از روابط طولی، رابطه‌هایی است که در مورد اندازه، پاره خط و زاویه‌ها در شکل‌های مختلف، بحث می‌کند. در هندسه دهم علاوه بر رابطه فیثاغورس  $a^2 = b^2 + c^2$ ، روابط طولی زیر را در مثلث قائم الزاویه دیدیم:

$$AH^2 = BH \times HC$$

$$AB^2 = BC \cdot BH$$

$$AH \times BC = AB \times AC$$

$$AC^2 = BC \cdot CH$$




در مثلث قائم الزاویه ABC مطابق شکل نسبت‌های مثلثاتی زاویه  $\alpha$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\sin \alpha = \frac{AB}{BC}$$

$$\tan \alpha = \frac{AB}{AC}$$

$$\cos \alpha = \frac{AC}{BC}$$


$$\cot \alpha = \frac{AC}{AB}$$



در جدول زیر نسبت‌های مثلثاتی زوایایی که معمولاً به آن‌ها نیاز داریم را می‌بینید:

زاویه	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$120^\circ$	$135^\circ$	$150^\circ$	$180^\circ$
سینوس	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
کسینوس	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
تانژانت	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

**Test** در مثلث قائم الزاویه شکل زیر، ارتفاع نظیر وتر است. مساحت مثلث ABC چقدر است؟



- ۲۸ (۱)
- ۳۹ (۲)
- ۳۶ (۳)
- ۲۶ (۴)


**۱** ابتدا طول AH را به دست می‌آوریم و سپس به سراغ مساحت می‌رویم:

$$AH^2 = BH \times HC \Rightarrow AH^2 = 4 \times 9 \Rightarrow AH^2 = 36 \Rightarrow AH = 6 \Rightarrow S_{ABC} = \frac{AH \times BC}{2} = \frac{6 \times 13}{2} = 39$$

فصل ۳ یازدهم | روابط طولی در مثلث | قصیه سینوس ها

خرید آنلاین در [gajmarket.com](http://gajmarket.com)

Logitudinal Relations



در هر مثلث نسبت طول هر ضلع به سینوس زاویه مقابل به آن مقداری ثابت است و این مقدار ثابت با قطر دایره محیطی مثلث برابر است. [این یافته به اثبات بسیاری از قضایای هندسی منتهی می شود.]

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

یکی از نتایج قضیه سینوس ها این است که در هر مثلث نسبت اضلاع یا نسبت سینوس زاویه مقابل به آن ها برابر است.


$$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B}$$



مثلاً، اگر در مثلثی دو ضلع برابر نباشند، ضلعی بزرگتر است که زاویه روبه رو به آن بزرگتر باشد و برعکس.

$$a > b \Leftrightarrow \frac{a}{b} > 1 \Leftrightarrow \frac{\sin A}{\sin B} > 1 \Leftrightarrow \sin A > \sin B \Leftrightarrow \hat{A} > \hat{B}$$

اگر یکی از زاویه های مثلثی،  $75^\circ$  یا  $15^\circ$  یا  $5^\circ$  باشد برای محاسبه اندازه ضلع روبه رو به آن از قضیه سینوس ها استفاده نمی کنیم. در این شرایط بهتر است که ارتفاع نظیر آن ضلع را رسم کنیم و سپس با استفاده از نسبت های مثلثاتی، زوایای  $45^\circ$  و  $60^\circ$  یا  $45^\circ$  و  $30^\circ$  اندازه ارتفاع و ضلع ها را به دست آوریم.



در شکل مقابل زاویه  $\hat{A} = 105^\circ$  را رسم ارتفاع AH به دو زاویه  $45^\circ$  و  $60^\circ$  تقسیم شده و اندازه اضلاع بیرونی ارتفاع را به دست آمده است.

اگر رابطه ای هم درجه بین اندازه اضلاع مثلث برقرار باشد می توان به جای اندازه هر ضلع در رابطه سینوس زاویه مقابل به آن ضلع را جایگذاری کرد و برعکس.

در مثلث قائم الزاویه که رابطه  $a^2 = b^2 + c^2$  را داریم، رابطه  $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C$  نیز برقرار است. طبق نامساوی مثلثی در هر مثلث  $a < b + c$  بنابراین در همه مثلث ها رابطه  $\sin A < \sin B + \sin C$  برقرار است.

اگر رابطه ای بر حسب سینوس ها و کسینوس های زوایای مثلث داشته باشیم ابتدا باید به کمک رابطه  $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$  تمام کسینوس ها را به سینوس تبدیل کنیم. سپس به جای سینوس هر زاویه اندازه ضلع مقابلش را جایگذاری کنیم.

**Test** در مثلث ABC با  $BC = 2$ ,  $\hat{B} = 75^\circ$ ,  $\hat{C} = 60^\circ$  طول ضلع AB چقدر است؟

$\sqrt{6}$  (1)       $2\sqrt{2}$  (2)       $2\sqrt{3}$  (3)      3 (4)

**1** ابتدا اندازه زاویه  $\hat{A}$  را به دست می آوریم:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \Rightarrow \hat{A} = 180^\circ - 60^\circ - 75^\circ = 45^\circ$$


حال طبق قضیه سینوس ها، ضلع  $c = AB$  را به دست می آوریم:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \frac{2}{\sin 45^\circ} = \frac{c}{\sin 60^\circ} \Rightarrow c = \frac{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{6}$$

فصل 3 یازدهم | روابط طولی در مثلث | قضیه سینوس ها

خرید آنلاین در [gajmarket.com](http://gajmarket.com)

Logitudinal Relations



برای محاسبه شعاع دایره محیطی در هر مثلث دو روش عمده وجود دارند. اگر اندازه یک ضلع و زاویه روبه رو به آن معلوم باشد، با توجه به قضیه سینوس ها از رابطه زیر استفاده می کنیم:

$$R = \frac{a}{2 \sin A}$$





اگر اندازه اضلاع معلوم باشد، ابتدا مساحت مثلث را به دست می آوریم و سپس از رابطه زیر استفاده می کنیم:

$$R = \frac{abc}{4S}$$

در مثلث قائم الزاویه، شعاع دایره محیطی نصف وتر است و در مثلث متساوی الاضلاع، شعاع دایره محیطی به اندازه  $\frac{2}{3}$  ارتفاع است.

در مثلث ABC، اگر شعاع دایره محیطی  $R$ ، شعاع های دایره های محاطی داخلی و خارجی باشند، رابطه زیر برقرار است:

$$r_a + r_b + r_c = r + 4R$$

اگر شعاع سه دایره از دایره محاطی داخلی و خارجی معلوم باشد، به کمک رابطه زیر می توان چهارمین شعاع را به دست آورد:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}$$

بنابراین با داشتن سه شعاع از دایره های محاطی، در دو مرحله می توان شعاع دایره محیطی را محاسبه کرد.

**Test** در مثلثی با اضلاع ۵، ۵، ۸ شعاع دایره محیطی کدام است؟

۴۱

۲۵/۸

۳

۲۵/۶


**F1** در مثلث متساوی الساقین ABC، ابتدا ارتفاع را رسم می کنیم و

به کمک رابطه فیثاغورس اندازه ارتفاع را به دست می آوریم:

$$AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

با معلوم بودن اندازه ارتفاع، مساحت مثلث قابل محاسبه است:

حال با در دست داشتن مساحت مثلث، می توانیم اندازه شعاع دایره محیطی را به دست آوریم:



$$S_{ABC} = \frac{AH \times BC}{2} = \frac{3 \times 8}{2} = 12$$

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{5 \times 5 \times 8}{4 \times 12} = \frac{25}{6}$$

Lesson . 2

مفهوم کتاب یازدهم

قضیه کسینوس ها


درس ۵۹



Logarithmic Relations

قضیه کسینوس ها و نتایج آن

در هر مثلث، طبق قضیه کسینوس ها مربع اندازه هر ضلع برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر منهای دو برابر حاصل ضرب آن ها در کسینوس زاویه بین آن ها. (به کمک قضیه کسینوس های قائم، بدست می آید.)



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

اگر اندازه سه ضلع از مثلثی معلوم باشد، کسینوس هر زاویه مثلث با توجه به قضیه کسینوس ها، به صورت زیر به دست می آید:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

اضلاع مثلثی با اعداد ۵، ۷، ۸ متناسب اند، کسینوس زاویه متوسط در این مثلث کدام است؟

۱)  $\frac{1}{2}$    ۲)  $\frac{4}{5}$    ۳)  $\frac{25+64-49}{2 \times 5 \times 8}$    ۴)  $\frac{5^2+7^2-8^2}{2 \times 5 \times 8}$    ۵)  $\frac{(\Delta k)^2 + (7k)^2 - (8k)^2}{2 \times (\Delta k) \times (7k)}$




در مسائلی که یک رابطه بین مربعات سه ضلع از مثلث برقرار باشد، رابطه داده شده را با قضیه کسینوس ها مقایسه می کنیم تا بتوانیم کسینوس یکی از زوایای مثلث را بیابیم.

فصل ۳ یازدهم | روابط طولی در مثلث | قضیه کسینوس ها

خرید آنلاین در [gajmarket.com](http://gajmarket.com)

اگر در مثلثی، رابطه  $b^2 = a^2 + c^2 + \sqrt{2}ac$  برقرار باشد، زاویه  $B$  چقدر است؟  
 می دانیم، در هر مثلث، رابطه  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$  برقرار است، بنابراین:

**تشخیص نوع زاویه‌ها در مثلث**

$a^2 > b^2 + c^2 \Leftrightarrow \hat{A} > 90^\circ$	$a^2 = b^2 + c^2 \Leftrightarrow \hat{A} = 90^\circ$	$a^2 < b^2 + c^2 \Leftrightarrow \hat{A} < 90^\circ$
		

بدیهی است اگر در مثلثی به دنبال یافتن زاویه منفرجه هستیم، فقط باید مربع بزرگ‌ترین ضلع را با مجموع مربعات دو ضلع دیگر مقایسه کنیم و نیازی نیست رابطه‌های بالا را برای اضلاع متوسط و کوچک بررسی کنیم؛ زیرا اگر بزرگ‌ترین زاویه یک مثلث منفرجه نباشد [یعنی زاویه یا قائمه باشد] قطعاً دو زاویه دیگر نیز حاده هستند.

**Test** در مثلث  $ABC$  با اضلاع  $\sqrt{5}$ ،  $3$ ،  $2\sqrt{2}$  اندازه کوچک‌ترین زاویه مثلث چقدر است؟

$45^\circ$  (۲)

$30^\circ$  (۱)

$\cos^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$  (۴)

$\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$  (۳)


می دانیم کوچک‌ترین زاویه مثلث، روبه‌رو به کوچک‌ترین ضلع است و در بین اعداد داده شده  $a = \sqrt{5}$  کوچک‌ترین ضلع مثلث است، پس داریم:

$$\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{3^2 + (2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2}{2 \times 3 \times 2\sqrt{2}} = \frac{12}{12\sqrt{2}} \Rightarrow \cos \hat{A} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \hat{A} = 45^\circ$$

### Logitudinal Relations

رابطه طول میانه

اگر نقطه  $M$  وسط ضلع  $BC$  از مثلث  $ABC$  باشد، رابطه زیر بین اندازه اضلاع مثلث و اندازه میانه  $AM$  برقرار است: [به این رابطه، قضیه میانه‌ها هم می‌گویند].



$$2m_a^2 + \frac{a^2}{2} = b^2 + c^2$$

در هر مثلث، میانه بزرگ‌تر به وسط ضلع کوچک‌تر وصل شده است، یعنی هرچه ضلع بزرگتر باشد، میانه نظیر آن کوچکتر است و برعکس.

اگر یکی از میانه‌های مثلث را به اندازه خودش امتداد دادیم و به دو رأس مجاور وصل کنیم، یک متوازی‌الاضلاع به دست می‌آید و رابطه طول میانه به رابطه  $\frac{BD}{2} + \frac{AC^2}{2} = AB^2 + BC^2$  تبدیل می‌شود، با ساده کردن این رابطه به رابطه زیر می‌رسیم که نشان می‌دهد در هر متوازی‌الاضلاع مجموع مربعات قطرهای آن مجموع مربعات اضلاع برابر است.



$$AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + BC^2)$$

در هر مثلث مجموع مربعات میانه‌ها یا  $\frac{3}{4}$  مجموع مربعات اضلاع برابر است، یعنی اگر میانه‌های مثلث  $ABC$  را با  $m_a, m_b, m_c$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$$

در مثلث قائم‌الزاویه‌ای به اضلاع  $a, b, c$  وتر آن  $a$  است، داریم:

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2) \Rightarrow m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}a^2 = \frac{3}{4}a^2$$